

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [MQ-1.TFN.UCAV.01](#) » [Examen final](#) » [Caso Clínico 1](#)

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | domingo, 23 de junio de 2024, 20:57 |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                          |
| <b>Finalizado en</b>   | domingo, 23 de junio de 2024, 20:58 |
| <b>Tiempo empleado</b> | 1 minutos 12 segundos               |
| <b>Puntos</b>          | 6,00/6,00                           |
| <b>Calificación</b>    | 10,00 de 10,00 (100%)               |
| <b>Comentario -</b>    | Apto                                |

#### Información

Nos ingresa en la urgencia un varón de 45 años y su hija de 5 años, tras sufrir quemaduras graves en determinadas partes de su cuerpo. Los servicios de emergencia nos cuentan, que acuden al aviso tras una llamada de una vecina del edificio tras observa salida de humo por las ventanas.

El varón, consciente, presenta quemaduras en ambos miembros superiores y miembro inferior izquierdo. Hemodinámicamente estable

La pequeña sufre quemaduras en miembro superior derecho y ambas piernas. Se observan varias lesiones ampollasas. Agitada, nerviosa y con llanto vigoroso.

#### Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según los datos obtenidos anteriormente, y utilizando la Regla de Wallace ¿qué SCQ presenta el paciente adulto?

Seleccione una:

- ☐ a. 27%
- ☒ b. 36% ✓
- ☐ c. 54%
- ☐ d. 15%

La respuesta correcta es: 36%

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para calcular la SCQ en la paciente pediátrica, ¿qué método es el más correcto de utilizar?

Seleccione una:

- ☐ a. Regla de Wallace
- ☐ b. Regla de los 9
- ☒ c. Nomograma de Lund y Browder ✓
- ☐ d. Regla de la Palma de la mano

La respuesta correcta es: Nomograma de Lund y Browder

---

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras una gran quemadura, hay riesgo de sufrir shock hipovolémico. ¿Qué tipo de sueroterapia es la indicada en estos pacientes?

Seleccione una:

- ☐ a. Coloides de origen natural
- ☐ b. Suero salino 0,9%
- ☒ c. Ringer lactato ✓
- ☐ d. A y C son correctas

La respuesta correcta es: Ringer lactato

---

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para calcular la cantidad de líquido a administrar en las primeras 24h se utiliza la Fórmula de Parkland. Señala la correcta

Seleccione una:

- ☐ a.  $4\text{ml} + \%SCQ \times \text{Peso (kg)}$
- ☐ b.  $9\text{ ml} + \%SCQ \times \text{Peso (kg)}$
- ☒ c.  $4\text{ml} \times \%SCQ \times \text{Peso (kg)}$  ✓
- ☐ d.  $10\text{ml} + \%SCQ \times \text{Peso (kg)}$

La respuesta correcta es:  $4\text{ml} \times \%SCQ \times \text{Peso (kg)}$

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las medidas terapéuticas a seguir en el paciente gran quemado, señala la incorrecta.

Seleccione una:

- ☒ a. Como protección gástrica, se debe colocar SNG a todos los pacientes quemados independientemente de la SCQ ✓
- ☐ b. Administrar profilaxis antitetánica sistemática en todo gran quemado
- ☐ c. La analgesia y la sedación se debe administrar vía IV y dependiendo de las necesidades de cada paciente.
- ☐ d. No administrar antibioterapia sistémica excepto en pacientes con evidencia de infección

La respuesta correcta es: Como protección gástrica, se debe colocar SNG a todos los pacientes quemados independientemente de la SCQ

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el manejo de las quemaduras en miembros, es correcto

Seleccione una:

- ☐ a. Los miembros deben estar en declive
- ☒ b. Los miembros deberán estar elevados para prevenir la aparición de edema ✓
- ☐ c. El ambiente del habitáculo donde se encuentre el paciente debe ser frío
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Los miembros deberán estar elevados para prevenir la aparición de edema

---

Actividad previa

◀ Examen 1

Ir a...

Siguiente actividad

GPC últimos días de vida ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>