

<b>Comenzado el</b>	domingo, 8 de septiembre de 2024, 19:52
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	domingo, 8 de septiembre de 2024, 19:59
<b>Tiempo empleado</b>	6 minutos 53 segundos
<b>Puntos</b>	19,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>9,50</b> de 10,00 ( <b>95%</b> )
<b>Comentario -</b>	Apto

#### Pregunta1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los alimentos no recomendados en litiasis son:

Seleccione una:

a.

Leche

b.

Café

c.

Verdura de hoja ancha

d.

Todas son correctas

Retroalimentación

Todos son alimentos desaconsejados en litiasis renales.

#### Pregunta2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una pieloplastia es:

Seleccione una:

a.

Una extirpación del uréter

b.

Una extirpación del riñón

c.

Corrección quirurgica de la obstrucción o estrechamiento del ureter.

d.

Corrección de la obstrucción o estrechamiento de la uretra.

Retroalimentación

Procedimiento quirurgico que corrige la obstrucción y/o estrechamiento del uréter

Pregunta3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando inspeccionando a un paciente encontramos, masa en hipogastrio con dolor a la palpación y que despierta deseos miccionales, nos encontramos ante:

Seleccione una:

a.

Una gastritis

b.

Son signos de infección importante

c.

Globo vesical

d.

Cálculo renal.

Retroalimentación

Son signos de presencia de globo vesical en una retención de orina aguda.

Pregunta4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El conducto que comunica el riñón con la vejiga se llama....

Seleccione una:

a.

Uretra

b.

Nefrona

c.

Uréter

d.

Ninguna es correcta

Retroalimentación

El conducto que comunica riñón con vejiga es el ureter

Pregunta5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente con insuficiencia renal crónica, deberemos educarle para que identifique los signos y/o síntomas por los cuales debe acudir a su médico. Los principales signos de alarma son:

Seleccione una:

a.

Tensión arterial elevada

b.

Edemas

c.

Disnea

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

Aumento de la TA, edemas, disnea, disminución de la cantidad de orina emitida al día... todos son signos de alarma en un paciente que padece insuficiencia renal crónica.

**Pregunta6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente portador de una FAV es cierto que...

Seleccione una:

a.

No se debe tomar TA en el brazo de la FAV

b.

No se debe utilizar la FAV como acceso venoso para la administración de medicación

c.

Si una FAV sangra, no se debe hacer un torniquete

d.

Todos los enunciados son ciertos.

Retroalimentación

Todos los enunciados son ciertos

**Pregunta7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La función principal de la eritropoyetina es:

Seleccione una:

a.

Aumentar la diuresis

b.

Estimular la producción de globulos rojos por parte de la médula ósea

c.

Disminuir la diuresis

d.

Activar el sistema renina-angiotensina aldosterona

Retroalimentación

Gracias a la eritropoyetina se estimula a la médula osea para a producción de glóbulos rojos.

**Pregunta8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente diagnosticado de insuficiencia renal crónica terminal...señale la correcta:

Seleccione una:

a.

Precisa sondaje vesical de forma continua

b.

Precisa hemodiálisis hasta recuperar su función renal.

c.

Precisa diálisis y/o trasplante renal

d.

Precisa trasplante renal urgente

Retroalimentación

Precisa tratamiento con diálisis o bien ser trasplantado. El trasplante renal no se puede considerar urgente si el paciente puede recibir terapia de sustitución renal (hemodiálisis o [diálisis peritoneal](#))

**Pregunta9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta:

Seleccione una:

a.

Anatomicamente el riñón derecho está situado más bajo que el izquierdo.

b.

Los riñones se alojan en la cavidad retroperitoneal

c.

Los riñones son un órgano par con forma de alubia.

d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

Todos los enunciados son correctos

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La nefrona realiza sus funciones en tres pasos:

Seleccione una:

a.

Secreción-filtración-reabsorción

b.

Reabsorción-secreción-filtración

c.

Filtración- reabsorción-secreción

d.

Filtración- adsorción- secreción-reabsorción

Retroalimentación

En primer lugar se filtra la sangre, mas tarde se reabsorven las sustancias que el organismo necesita y finalmente se secretan aquellas sustancias necesarias para mantener la homeostasis del organismo.

**Pregunta11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes alimentos, ¿cuáles son ricos en potasio?

Seleccione una:

a.

Espinacas

b.

Pollo

c.

Plátano

d.

A y C son correctas

Retroalimentación

Espinacas y plátano son dos alimentos ricos en potasio. El pollo no se caracteriza por su elevado contenido en potasio.

**Pregunta12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente portador de un catéter para diálisis... señale la correcta:

Seleccione una:

a.

Se puede utilizar para extracción de muestras sanguíneas de forma rutinaria

b.

No se debe utilizar para la administración de medicación en planta

c.

Es exclusivo para el uso de medicación

d.

Ninguna es correcta.

Retroalimentación

No se debe utilizar para administración de medicación en planta. El resto de enunciados son incorrectos porque no se puede utilizar para extracción de muestras sanguíneas de forma rutinaria y Sí se puede utilizar para la extracción de hemocultivos si se sospecha infección del mismo.

**Pregunta13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La evolución de la insuficiencia renal aguda se divide en 4 fases que son...

Seleccione una:

a.

Comienzo-Fase diurética-fase oligúrica-recuperación

b.

Comienzo-recuperación-fase diurética-fase oligúrica

c.

Comienzo- fase oligúrica-fase diurética-fase de recuperación.

d.

Fase diurética- recuperación-fase oligúrica-comienzo

Retroalimentación

Las fases son: comienzo- fase oligúrica-fase diurética-recuperación.

**Pregunta14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al tratamiento inmunosupresor en el trasplante renal

Seleccione una:

a.

Debe iniciarse lo antes posible tras la intervención

b.

Debe iniciarse pasada una semana

c.

El paciente tomará inmunosupresores mientras el trasplante sea funcional

d.

A y C son correctas.

Retroalimentación

El tratamiento con inmunosupresores, debe iniciarse lo antes posible y el paciente seguirá tomando esta medicación hasta que el órgano trasplantado sea funcional.

Pregunta15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las funciones del riñón es la secreción de hormonas. ¿Cuál de las siguientes hormonas es secretada por el riñón?

Seleccione una:

a.

Renina

b.

Eritropoyetina

c.

Calcitriol

d.

Todas son correctas

Retroalimentación

Todas las enunciadas son hormonas segregadas por el riñón

**Pregunta16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes procedimientos, ¿cuáles son terapias de sustitución renal?

Seleccione una:

a.

Sondaje vesical

b.

Hemodiálisis

c.

Talla vesical

d.

Ureterostomía

Retroalimentación

De todos los enunciados, sólo la hemodiálisis es considerada una terapia de sustitución renal.

**Pregunta17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La intervención mas habitual para solucionar la hiperplasia benigna de próstata es:

Seleccione una:

a.

Laparotomia exploratoria

b.

Cirugía abierta

c.

RTU( resección transuretral)

d.

Cistectomía radical

Retroalimentación

La mas habitual es la RTU (resección transuretral)

**Pregunta18**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué conocemos como "triada básica" de comprobación de funcionamiento de una FAV?

Seleccione una:

a.

Color-rubor-temperatura

b.

Color-soplo-latido

c.

Latido-soplo-thrill

d.

Trill-tempraura y soplo.

Retroalimentación

Latido, soplo y thrill, es lo que se conoce como triada básica. Estos tres signos nos permiten conocer si la FAV se encuentra funcionando o no.

**Pregunta19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se considera hipernatremia...

Seleccione una:

a.

Valores de calcio por encima de 145 mEq/L.

b.

Valores de potasio menores a 5 mEq/L

c.

Valores de sodio por encima de 145 mEq/L

d.

Diuresis menor de 500cc en el turno.

Retroalimentación

Hipernatremia son valores de sodio por encima de 145 mEq/L.

**Pregunta20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es una FAV?

Seleccione una:

a.

Una conexión entre 2 venas (basílica y cefálica generalmente)

b.

Una conexión entre una vena y una arteria

c.

Una conexión entre 2 arterias

d.

Una distensión de una arteria.

Retroalimentación

Una anastomosis entre una vena y una arteria que permite conseguir mayor flujo sanguíneo para las sesiones de hemodiálisis