

Pregunta

1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Un Recién Nacido a Término que se encuentra lactando al inicio de la toma, despierto, con los ojos abiertos y fijos en su madre mientras come, tranquilo sin realizar movimientos. ¿En qué fase clasificaríamos su estado de alerta?:

Seleccione una:

- ☐ a. FASE 2: Sueño superficial o de movimiento rápido.
- ☐ b. FASE 3: Despertar o somnolencia
- ☒ c. FASE 4: Alerta tranquila
- ☐ d. FASE 5: Alerta

[Quitar mi elección](#)

Pregunta

2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál es el tipo de convulsión más frecuentemente observado en los recién nacidos?

Seleccione una:

- ☐ a. Convulsiones mioclónicas
- ☐ b. Convulsiones Clónicas
- ☐ c. Convulsiones tónicas
- ☒ d. Convulsiones sutiles

[Quitar mi elección](#)

Pregunta

3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Sobre cuál de estos parámetros NO se basa la clasificación del comportamiento del RN?

Seleccione una:

- ☐ a. Vocalización
- ☐ b. Apertura de ojos
- ☒ c. Llanto
- ☐ d. Motricidad gruesa

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Acerca de las fontanelas y suturas de la cabeza del recién nacido. ¿Qué respuesta es la FALSA?

Seleccione una:

- ☐ a. son articulaciones fibrosas
- ☒ b. Proporcionan rigidez y resistencia al cráneo del recién nacido
- ☐ c. La fontanela anterior se cierra aproximadamente a los 14 meses
- ☐ d. La suturas no deberían estar ni superpuestas ni muy separadas entre sí.

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En un Hospital nivel I que no dispone de UCI neonatal ¿Cuál de las siguientes actuaciones en el manejo de un RN con sospecha de EHI es INCORRECTA?

Seleccione una:

- ☐ a. Tramitar el traslado urgente al centro de referencia más cercano antes de las primeras 6 horas de vida
- ☐ b. Disminuir la temperatura del RN mediante inmersión del cuerpo en agua fría
- ☒ c. Medir temperatura cada 15 minutos
- ☐ d. Control gasométrico y prevenir la hiperventilación.

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿cuál de los siguientes problemas NO suele desencadenar en una crisis convulsiva?

Seleccione una:

- ☐ a. Alteración hidroelectrolítica
- ☒ b. Cardiopatía
- ☐ c. Deshidratación
- ☐ d. Encefalopatía hipóxico-isquémica

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La fusión prematura de las suturas craneales se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Hidrocefalia
- ☒ b. Craneosinostosis
- ☐ c. Onfalocele
- ☐ d. Craneotomía

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Qué NO es un evento centinela de sospecha de encefalopatía hipóxico isquémica?

Seleccione una:

- ☐ a. Prolapso de cordón
- ☒ b. Líquido teñido de meconio
- ☐ c. Rotura de cordón
- ☐ d. Desprendimiento de placenta

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Con cuántas horas de vida se ha visto que se obtiene la máxima eficacia terapéutica al aplicar un protocolo de hipotermia leve en un RN con encefalopatía moderada?

Seleccione una:

- ☐ a. primeras 12 horas de vida
- ☒ b. primeras 6 horas de vida
- ☐ c. primeras 4 horas de vida
- ☐ d. No hay límite de horas.

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de estas causas NO son motivo para que un recién nacido esté hipotónico?

Seleccione una:

- ☒ a. Recién nacido de madre muy fumadora.
- ☐ b. Encefalopatía hipóxico-isquémica
- ☐ c. Hemorragia intracraneal
- ☐ d. Tras sufrir una crisis epiléptica (estado post-crítico)

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes hemorragias puede conllevar un compromiso de la permeabilidad de la vía aérea?

Seleccione una:

- ☒ a. Hemorragia subgaleal
- ☐ b. Hemorragia intraventricular
- ☐ c. Hemorragia subaracnoidea
- ☐ d. Hemorragia subdural

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

12

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes situaciones NO son una de las principales causas de convulsiones en el recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. Encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI)
- ☒ b. Craneosinostosis (Cierre prematuro de suturas)
- ☐ c. Meningitis
- ☐ d. Hemorragia intraventricular

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

13

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes escalas nos permiten medir el Síndrome de Abstinencia en un recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. Escala Silverman Anderson
- ☐ b. Escala de Hamilton
- ☒ c. Escala de Finnegan
- ☐ d. Test de Fagerstrom

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

De los siguientes fármacos ¿cuál NO tiene una acción anticonvulsivante?

Seleccione una:

- ☒ a. Fentanilo
- ☐ b. Fenobarbital
- ☐ c. Fenitoína
- ☐ d. Midazolam

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

15

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuántas fontanelas presenta el recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. 2 fontanelas
- ☐ b. 4 fontanelas
- ☒ c. 6 fontanelas
- ☐ d. 3 fontanelas

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

16

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Caput Succedaneum NO es correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Es la hemorragia extracraneal más frecuente en el recién nacido
- ☐ b. Atraviesa suturas
- ☒ c. Produce Anemización que puede llegar a requerir transfusión sanguínea
- ☐ d. Es de aparición intraparto.

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

17

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Se recibe en la UCI un aviso de ingreso de un RN diagnosticado antenatalmente de mielomeningocele. Cuál de estas acciones sería la CORRECTA

Seleccione una:

- ☐ a. Preparar gasas estériles con suero fisiológico a temperatura ambiente.
- ☒ b. Uso de guantes estériles sin látex cuando se precise técnica estéril.
- ☐ c. Preparar cuna térmica con calor radiante apagado
- ☐ d. Colocar en decúbito supino con posición antitrendelemburg.

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

18

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Señale cuál de los siguientes escalas permite una valoración neurológica completa del RN

Seleccione una:

- ☐ a. Test de Silverman
- ☒ b. Escala de Hammersmith
- ☐ c. Escala de Finnegan
- ☐ d. Test de Apgar

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

19

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes hemorragias intracraneales NO suele ser de aparición precoz en las primeras horas de vida tras el nacimiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragia subdural
- ☐ b. Hemorragia subaracnoidea
- ☒ c. Hemorragia intraventricular
- ☐ d. Hemorragia subgaleal

[Quitar mi elección](#)

---

Pregunta

20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuál de las siguientes situaciones NO es un factor de riesgo para una hemorragia intracraneal en el recién nacido?

Seleccione una:

- ☐ a. Parto prematuro
- ☒ b. Distocia de hombros
- ☐ c. Malformación arteriovenosa
- ☐ d. Parto gemelar.

[Quitar mi elección](#)

---

Actividad previa

◀ FISIOPATOLOGIA DE LA EHI NEONATAL

Ir a...

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>