

ABORDAJE DEL CONSUMO DE TABAJO EN PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES

CODIGO ACCESO: xarxa2024-sm

Qualificació 10 sobre 10.00 (100%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Señale la respuesta verdadera con respecto a la eficacia del consejo breve poblacional:

Pregunta 1Resposta

d. Su duración es de aproximadamente entre 3 a 5 minutos.

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Respecte a la síndrome d'abstinència de la nicotina descrita en persones amb trastorns mentals:

Pregunta 2Resposta

b.S'han descrit símptomes d'abstinència més intensos i perllongats en el temps, sobretot en els trastorns de tipus depressiu i trastorns d'ansietat.

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Per a realitzar correctament una història clínica del tabaquisme, a banda de les dades sociodemogràfiques, tindrem en compte:

Pregunta 3Resposta

c.Totes son correctes.

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Sobre el consum de tabac en les persones amb trastorns mentals, quina resposta és correcta?

Pregunta 4Resposta

c. Deixar de fumar millora els símptomes depressius i d'ansietat a mig-llarg termini.

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Digues quina afirmació és la correcta:

Pregunta 5Resposta

c.Una persona que ha fumat en el passat durant menys de 6 mesos es considerarà mai consumidora.

Pregunta 6

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quina afirmació sobre la TSN és falsa?

Pregunta 6Resposta

c.No està indicada en fumadors amb depressió.

Pregunta 7

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Una persona que consume cualquier tipo de tabaco/nicotina, pero no de forma diaria, se clasificaría como:

Pregunta 7Resposta

d. Consumidor ocasional

Pregunta 8

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quines d'aquestes afirmacions és correcta respecte les persones amb trastorns mentals?

Pregunta 8Resposta

D.LES INTERVENCIONS PER DEIXAR DE FUMAR SÓN LES MATEIXES QUE PER LA POBLACIÓ GENERAL.

Pregunta 9

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a la intervención breve "5As"

Pregunta 9Resposta

b.Las dos primeras As (Ask and Advise- Averiguar/Preguntar y Aconsejar) deberían realizarse a todas las personas atendidas en la práctica clínica habitual, y el resto en función de su deseo de abandono.

Pregunta 10

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Identifica els professionals més rellevants en l'abordatge de la cessació tabàquica. Indica l'opció correcta:

Pregunta 10Resposta

a. Tots els professionals són igual d'importants en el procés de cessació tabàquica dels pacients.

Pregunta 11

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quines mesures contempla l'estratègia MPOWER de control del tabac?

Pregunta 11Resposta

a.Totes les anteriors.

Pregunta 12

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quins dels següents fàrmacs poden patir canvis significatius dels seus nivells plasmàtics en deixar de fumar?

Pregunta 12Respo

D. L'OLANZAPINA I LA CLOZAPINA.

Pregunta 13

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Sobre la reducció de cigarretes prèvia a la cessació:

Pregunta 13Resposta

D.ELS AUTORREGISTRES PODEN AJUDAR A FER LA REDUCCIÓ PRÈVIA A LA CESSACIÓ.

Pregunta 14

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quin dels següents fàrmacs està indicat en el tractament del tabac en pacients psiquiàtrics?

Pregunta 14Resposta

A. TOTS SÓN CORRECTES.

Pregunta 15

Incorrecte

Puntuació 0.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a la epidemia actual de tabaquismo en España

Pregunta 15Resposta

**A.EL CONSUMO DE TABACO HA IDO DISMINUYENDO EN ESPAÑA
EN COMPARACIÓN CON LOS DATOS DE HACE 10 AÑOS.**

Pregunta 16

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Si una persona ha dejado de fumar durante su ingreso en el hospital, gracias a la ayuda proporcionada por el centro, entre las siguientes acciones de seguimiento a realizar señala cuál es correcta:

Pregunta 16Resposta

D.TODAS LAS ANTERIORES.

Pregunta 17

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Respecte el patró de consum de tabac de les persones amb trastorn mental:

Pregunta 17Resposta

**B.TENEN UN CONSUM MÉS ELEVAT, MÉS SIMPTOMATOLOGIA
D'ABSTINÈNCIA I MAJOR DEPENDÈNCIA DE LA NICOTINA.**

Pregunta 18

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Señale la respuesta FALSA. Ante un fumador que ha recaído, tras meses abstinentes, el profesional debe:

Pregunta 18Resposta

B.PROPORCIONAR TIEMPO AL FUMADOR, AL MENOS UNOS 6 MESES PARA UN NUEVO INTENTO.

Pregunta 19

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quina de les afirmacions següents en relació al consum de tabac a Catalunya és correcta?

Pregunta 19Resposta

A.EL PERCENTATGE DE DONES QUE FUMEN MOSTRA UNA TENDÈNCIA A LA REDUCCIÓ A PARTIR DELS PRIMERS ANYS DEL SEGLE XXI.

Pregunta 20

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Quin dels següents fàrmacs ha demostrat eficàcia per a deixar de fumar?

Pregunta 20Resposta

A. NORTRIPTILINA.

Pregunta 21

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Assenyala l'afirmació falsa:

Pregunta 21Resposta

C. LES TÈCNIQUES DE DISTRACCIÓ I EVITACIÓ DEL CRAVING ES PROPOSEN DES DE L'ENFOCAMENT DE LA TERÀPIA D'ACCEPTACIÓ I COMPROMÍS.

Pregunta 22

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Señale la opción correcta sobre los beneficios que conlleva dejar de fumar:

Pregunta 22Resposta

B.A LOS 10 AÑOS DE DEJAR DE FUMAR TIENES LA MITAD DE LAS POSIBILIDADES DE MORIR DE UN CÁNCER DE PULMÓN

Pregunta 23

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Señale la opción FALSA en relación a la medición del nivel de monóxido de carbono expirado.

Pregunta 23Resposta

D. PERMITE VALIDAR LA ABSTINENCIA DE CONSUMO DE TABACO DE FORMA SUBJETIVA DURANTE EL PROCESO DE ABANDONO DEL CONSUMO.

Pregunta 24

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

En un pacient amb trastorn bipolar, un dels tractaments de primera elecció per deixar de fumar podria ser:

Pregunta 24Resposta

B. TRACTAMENT COGNITIVOCONDUCTUAL MÉS TERÀPIA SUBSTITUTIVA AMB NICOTINA.

Pregunta 25

Correcte

Puntuació 1.00 sobre 1.00

Marca la pregunta

Text de la pregunta

Identifica l'opció incorrecta en relació a les persones amb trastorns mentals greus:

Pregunta 25Resposta

A. UN TERÇ D'AQUESTA POBLACIÓ MOR PER CAUSES
RELACIONADES AMB EL TABAC.