

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La evaluación temprana de los cuidados paliativos supone una mejora en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares porque (Señala la respuesta correcta):

Seleccione una:

a.

Produce una reducción en el coste hospitalario.

b.

Evita tratamientos innecesarios evitando el escarnecimiento terapéutico.

c.

Alivia el sufrimiento desde su diagnóstico hasta el final de su vida

d.

Todas son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la correcta respecto a los cuidados paliativos:

Seleccione una:

a.

Los cuidados paliativos prestan su atención de manera multidisciplinar para lograr el control de síntomas y se deben incluir en enfermedades graves sin depender del pronóstico y el entorno.

b.

La atención paliativa incluida de una forma precoz no mejora la evaluación, el tratamiento y comunicación con el paciente paliativo pediátrico.

c.

Los cuidados paliativos en gestantes y madres no se enfocan a normalizar la situación, manejo de síntomas y mejora en la comunicación.

d.

Los cuidados paliativos no prestan su atención de manera multidisciplinar para lograr el control de síntomas.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La atención paliativa 24h continuada puede prestarse mediante:

Seleccione una:

a.

SUMMA.

b.

Emergencias 112.

c.

Unidad telefónica PAL24.

d.

Todas con correctas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la escala que mide el grado de sobrecarga que afectan a los cuidadores de personas dependientes: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

HADS.

b.

MiLS-SP.

c.

Zarit.

d.

IDC-PAL.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes opciones se considera una herramienta útil para la valoración del nivel de sedación del paciente?

Seleccione una:

a.

Escala NECPAL.

b.

Escala SPICT-ES.

c.

Escala PPI.

d.

Escala de Ramsay.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos: (Señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

AECPAL.

b.

SECPAL

c.

SEMPAL

d.

PEDPAL

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de programa integrado de atención, nos referimos a la coordinación de los equipos multidisciplinares que proporcionan cuidados paliativos, los cuales se integran por:

Seleccione una:

a.

Sólo Equipo de soporte de cuidados paliativos.

b.

Sólo Servicios sociales y oncología.

c.

Oncología, servicios sociales, atención primaria, atención especializada, urgencias y equipo de soporte de cuidados paliativos.

d.

Ninguno de los anteriores.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se define como situación de últimos días o agonía a:

Seleccione una:

a.

La presencia de cáncer con diagnóstico en estadio IV, metástasis cerebral, medular, hepática o pulmonar múltiple; que, aun teniendo un tratamiento óptimo, se encuentra en situación de escasa o nula respuesta al tratamiento activo específico.

b.

Al periodo final del ciclo vital de las personas con acentuada degeneración funcional, variación en los signos vitales, pronóstico de muerte en horas o días e irreversibilidad de la situación.

c.

Enfermedad o insuficiencia crónica de un órgano no reversible, sin tener en cuenta el origen, en la fase más avanzada y sin respuesta al tratamiento óptimo.

d.

Ninguna de las anteriores.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La quimioterapia paliativa: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Su finalidad es la curación.

b.

Su finalidad es el de mejorar la calidad de vida con el control de síntomas.

c.

Los efectos secundarios de la quimioterapia serían distintos que los tratados para erradicar la enfermedad.

d.

La enfermera debe sólo valorar las necesidades propias de la enfermedad.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La enfermedad no oncológica en fase terminal se define como: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

La presencia de cáncer con diagnóstico en estadio IV, metástasis cerebral, medular, hepática o pulmonar múltiple; que, aun teniendo un tratamiento óptimo, se encuentra en situación de escasa o nula respuesta al tratamiento activo específico.

b.

Al periodo final del ciclo vital de las personas con acentuada degeneración funcional, variación en los signos vitales, pronóstico de muerte en horas o días e irreversibilidad de la situación

c.

Enfermedad o insuficiencia crónica de un órgano no reversible, sin tener en cuenta el origen, en la fase más avanzada y sin respuesta al tratamiento óptimo.

d.

Ninguna de las anteriores.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la escala de sedación se utilizan: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

En el primer escalón se utiliza el midazolam vs levomepromazina/ clorpromazina.

b.

En el primer escalón se utiliza el midazolam más levomepromazina.

c.

En el tercer escalón se utiliza midazolam más levopromazina.

d.

En el tercer escalón se utiliza midazolam y propofol.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son síntomas de valoración en la agonía según la escala de Menten y Huftens:

Seleccione una:

a.

Nariz y extremidades calientes.

b.

Livideces y labios cianóticos.

c.

Polaquiuria.

d.

Pausas de apnea menor de 15 segundos.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La unidad básica de Cuidados Paliativos la conforman: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Enfermera y médico.

b.

Celadores y personal de apoyo espiritual.

c.

Nutricionistas y trabajador social.

d.

Médicos de AP, auxiliar administrativo y auxiliar de enfermería.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se define como “una organización de profesionales sanitarios, que ofrece atención multidisciplinar de cuidados paliativos mediante un amplio espectro de modalidades de asistencia que incluye necesariamente la hospitalización en camas específicas. Deben cumplir unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, que garantizan las condiciones adecuadas de calidad, seguridad y eficiencia, para realizar esta actividad” (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

UCP.

b.

CC.AA

c.

PAL24h

d.

ESCP

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes opciones se considera una herramienta útil para la identificación de las necesidades paliativas? (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Escala PaP score.

b.

Escala NECPAL.

c.

Escala PPI.

d.

Escala de EDMONTON- ESAS.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del diagnóstico Autogestión Ineficaz de la Salud (00276) los resultados a conseguir (NOC) incluirían: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Modificación de la conducta (4360).

b.

Participación en las decisiones sobre la salud (1606).

c.

Manejo de la nutrición (1100).

d.

Mejora de la autoconfianza (5395).

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La prestación en cuidados paliativos se ampara en (Señala la respuesta correcta):

Seleccione una:

a.

Plan Nacional de Cuidados Paliativos (18 de diciembre 2000).

b.

Real Decreto 63/1995, de 20 enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.

c.

Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actuación (BOE nº 22, de 16 de septiembre del 2006).

d.

Todas son correctas.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El objetivo principal de los programas en todas las CCAA en Cuidados Paliativos es: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Incrementar la calidad de vida del paciente y sus familias.

b.

Acabar con la vida del paciente.

c.

Prevenir y disminuir el sufrimiento del paciente.

d.

A y C son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta CORRECTA en cuanto a la radioterapia paliativa:

Seleccione una:

a.

Es muy difícil el control de síntomas con este tratamiento.

b.

El principal rendimiento se encuentra en el hipofraccionamiento.

c.

La radioterapia paliativa supone el 90% del tratamiento del cáncer avanzado.

d.

El tratamiento en los últimos días ofrece una calidad de vida óptima del paciente.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Podemos catalogar a la sedación como sedación intermitente: (Señala la respuesta correcta)

Seleccione una:

a.

Atendiendo a la temporalidad.

b.

Atendiendo a la intensidad.

c.

Sedación superficial y profunda.

d.

Sedación de agonía.