

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [MQ-3.TFN.UCAV.01](#) »[Módulo 1. Atención avanzada al paciente con alteraciones gastrointestinales](#) »[Cuestionario de autoevaluación asignatura 1](#)

Comenzado el	jueves, 4 de julio de 2024, 13:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 4 de julio de 2024, 14:06
Tiempo empleado	36 minutos 2 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos dientes componen la dentadura adulta completa?

Seleccione una:

- ☐ a. 20
- ☐ b. 25
- ☐ c. 30
- ☒ d. 32 ✓

Justificación: En la dentadura adulta completa hay 32 piezas dentarias, los deciduos o dientes de leche son 20 piezas.

La respuesta correcta es: 32

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El ácido clorhídrico (HCl) y las enzimas son los responsables de la digestión en el estómago formando el jugo gástrico o digestivo, ¿sabrías decir qué células se encargan de secretar este ácido?

Seleccione una:

- ☒ a. Las parietales. ✓
- ☐ b. Las principales.
- ☐ c. Las cimógenas.
- ☐ d. El factor intrínseco.

Justificación: El factor intrínseco es una sustancia liberada por las células parietales del estómago que se une a las moléculas de la vitamina B12 facilitando su absorción. Las células principales y las cimógenas son las mismas y se encargan de secretar las enzimas digestivas. Son las células parietales las encargadas de secretar el HCl.

La respuesta correcta es: Las parietales.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica las partes del intestino grueso:

Seleccione una:

- ☐ a. Íleon, ciego y colon.
- ☒ b. Ciego, colon y recto. ✓
- ☐ c. Colon y recto.
- ☐ d. Colon, recto y ano.

Justificación: El intestino grueso está compuesto por tres partes: ciego, colon (ascendente, transversal, descendente, sigmoide) y recto (donde se incluyen el conducto anal y la ampolla rectal).

La respuesta correcta es: Ciego, colon y recto.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde se encuentra la ampolla de Vater?

Seleccione una:

- ☒ a. En el duodeno. ✓
- ☐ b. En el yeyuno.
- ☐ c. En el íleon.
- ☐ d. En la vesícula biliar.

Justificación: La ampolla de Vater se sitúa en el duodeno y en ella desembocan el conducto pancreático y el colédoco con las enzimas necesarias para la digestión y la bilis. Se abre al dudodeno a través del esfínter de Oddi.

La respuesta correcta es: En el duodeno.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuál es la proenzima inactiva que da lugar a la pepsina al reaccionar con HCl gástrico:

Seleccione una:

- ☐ a. Peptidasa.
- ☒ b. Pepsinógeno. ✓
- ☐ c. Proteasa.
- ☐ d. Factor intrínseco.

Justificación: El pepsinógeno es una proenzima que al entrar en contacto con el ácido clorhídrico (HCl) se activa dando lugar a la pepsina, enzima gástrica principal.

La respuesta correcta es: Pepsinógeno.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué moléculas digieren las nucleasas?

Seleccione una:

- ☐ a. Hidratos de carbono.
- ☐ b. Proteínas.
- ☐ c. Lípidos.
- ☒ d. ADN y ARN. ✓

Justificación: Las nucleasas digieren las moléculas de ADN y ARN en componentes más simples, como los nucleótidos, de ahí su nombre.

La respuesta correcta es: ADN y ARN.

Pregunta

7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes medidas antropométricas se utiliza en caso de obesidad?

Seleccione una:

- ☐ a. El perímetro muscular en el centro de la pierna.
- ☐ b. El perímetro muscular en el centro del brazo.
- ☒ c. El perímetro abdominal. ✗
- ☐ d. El grosor del pliegue cutáneo sobre el tríceps.

Justificación: El grosor del pliegue cutáneo sobre el tríceps está relacionado con el contenido de grasa corporal.

La respuesta correcta es: El grosor del pliegue cutáneo sobre el tríceps.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes medidas antropométricas se utiliza en caso de sospecha de malnutrición o desnutrición?

Seleccione una:

- ☐ a. El grosor del pliegue cutáneo sobre el tríceps.
- ☒ b. El perímetro muscular en el centro del brazo. ✓
- ☐ c. El perímetro muscular en el centro de la pierna.
- ☐ d. El perímetro muscular en el centro del antebrazo.

Justificación: El perímetro muscular en el centro del brazo es un indicador de la masa muscular, la grasa disponible y las reservas proteicas.

La respuesta correcta es: El perímetro muscular en el centro del brazo.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes parámetros del pliegue cutáneo del tríceps indica obesidad?

Seleccione una:

- ☐ a. Mayor a 10mm en hombres y a 15mm en mujeres.
- ☐ b. Mayor a 20mm en hombres y a 30mm en mujeres.
- ☒ c. Mayor a 15mm en hombres y a 25mm en mujeres. ✓
- ☐ d. Mayor a 25mm en hombres y a 30mm en mujeres.

Justificación: Un pliegue cutáneo sobre el tríceps mayor a 15mm en hombres y a 25mm en mujeres indica obesidad, así como un 20% o más del peso corporal con respecto al peso ideal.

La respuesta correcta es: Mayor a 15mm en hombres y a 25mm en mujeres.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes pacientes puede realizarse una Resonancia Magnética Nuclear (RMN)?

Seleccione una:

- ☐ a. Embarazada.
- ☐ b. Con obesidad.
- ☐ c. Portador de marcapasos.
- ☒ d. Portador de un Reservorio Subcutáneo. ✓

Justificación: Cualquier paciente con un dispositivo metálico no puede realizarse una RMN, tampoco una embarazada por el riesgo que supone la radiación.

La respuesta correcta es: Portador de un Reservorio Subcutáneo.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica los cuidados de enfermería antes de una esofagogastroduodenoscopia:

Seleccione una:

- ☒ a. Ayunas 6-12h antes. ✓
- ☐ b. Ayunas 2h antes.
- ☐ c. Ayunas mínimo 24h antes.
- ☐ d. No requiere ayunas.

Justificación: Para la realización de una esofagogastroduodenoscopia el paciente debe estar en ayunas entre 6 y 12 horas antes del procedimiento.

La respuesta correcta es: Ayunas 6-12h antes.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la posición que debe adoptar el paciente durante una esofagogastroduodenoscopia:

Seleccione una:

- ☐ a. Decúbito prono.
- ☒ b. Decúbito lateral izquierdo. ✓
- ☐ c. Decúbito lateral derecho.
- ☐ d. Posición antitrendelemburg.

Justificación: Durante una esofagogastroduodenoscopia el paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo y genupectoral para favorecer la entrada anatómica al colon.

La respuesta correcta es: Decúbito lateral izquierdo.

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes pruebas requiere sedación?

Seleccione una:

- ☒ a. RMN. ✗
- ☐ b. Proctosigmoidoscopia.
- ☐ c. Esofagogastroduodenoscopia.
- ☐ d. Gastroscoopia.

Justificación: Se recomienda que los pacientes vayan acompañados a aquellas pruebas diagnósticas que requieren sedación y que no conduzcan.

La respuesta correcta es: Esofagogastroduodenoscopia.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuál es la preparación para realizar una proctosigmoidoscopia:

Seleccione una:

- ☐ a. Ayunas 24 horas antes y dos enemas antes de la prueba.
- ☒ b. Dieta líquida 24 horas antes y dos enemas antes de la prueba. ✓
- ☐ c. Dieta líquida 24 horas antes.
- ☐ d. Ayunas durante dos días.

Justificación: El paciente debe tomar una dieta líquida o pastosa sin residuos 24 horas antes y no podrá ingerir ningún alimento sólido hasta 7 horas antes de la prueba. Además, deberá ponerse o deberemos ponerle un enema dos horas antes de la prueba y otro una hora antes.

La respuesta correcta es: Dieta líquida 24 horas antes y dos enemas antes de la prueba.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuál es la preparación para realizar una colonoscopia:

Seleccione una:

- ☐ a. Ayunas durante 24 horas y dos enemas antes de la prueba.
- ☐ b. Ayunas 24 horas antes y solución evacuante de Bohm.
- ☐ c. Solución evacuante de Bohm y dos enemas antes de la prueba.
- ☒ d. Dieta líquida 24 horas antes y solución evacuante de Bohm. ✓

Justificación: El paciente debe tomar una dieta líquida o pastosa sin residuos 24 horas antes y no podrá ingerir ningún alimento sólido hasta 7 horas antes de la prueba. Además, deberá iniciar el día anterior a la prueba la ingesta de la solución evacuante Bohm o similar, un laxante de preparación. La primera deposición aparecerá a las 1-7 horas de haber ingerido el laxante, y el paciente estará listo para la colonoscopia cuando la deposición carezca de restos de heces, es decir, sean líquidas y limpias.

La respuesta correcta es: Dieta líquida 24 horas antes y solución evacuante de Bohm.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se aplica el medio de contraste en una Colangiografía Percutánea Transhepática o CPTH?

Seleccione una:

- ☐ a. A través de un enema opaco.

- ☒ b. A través de una aguja directamente en el conducto. ✓
- ☐ c. Por vía oral.
- ☐ d. Por vía intravenosa.

Justificación: Tal y como su nombre indica, la colangiografía se realiza a través de la piel y directamente al hígado, donde se aspira e inyecta el contraste para posteriormente realizar radiografías.

La respuesta correcta es: A través de una aguja directamente en el conducto.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sedación requiere una Colangiografía Percutánea Transhepática o CPTH ?

Seleccione una:

- ☒ a. Anestesia local. ✓
- ☐ b. Anestesia raquídea.
- ☐ c. Anestesia regional.
- ☐ d. Anestesia general.

Justificación: La CPTH se realiza mediante anestesia local para evitar el dolor en la zona de punción.

La respuesta correcta es: Anestesia local.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas pruebas de heces se necesitan para descartar parásitos intestinales?

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☒ c. 3 ✓
- ☐ d. 4

Justificación: Normalmente se toman 3 coprocultivos de tres días seguidos para diagnosticar la presencia de parásitos intestinales.

La respuesta correcta es: 3

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué se realiza la prueba respiratoria de hidrógeno?

Seleccione una:

- ☐ a. Para diagnosticar el H. Pylori.
- ☒ b. Para evaluar la malabsorción de carbohidratos. ✓
- ☐ c. Para evaluar la Enfermedad de Crohn.
- ☐ d. Para evaluar la úlcera péptica.

Justificación: La prueba respiratoria de hidrógeno se realiza para evaluar la malabsorción de carbohidratos.

La respuesta correcta es: Para evaluar la malabsorción de carbohidratos.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Para qué se realiza la prueba de Shilling?

Seleccione una:

- ☐ a. Para evaluar la malabsorción de carbohidratos.
- ☐ b. Para evaluar la celiaquía.
- ☐ c. Para evaluar la Enfermedad de Crohn.
- ☒ d. Para evaluar la absorción de vitamina B12. ✓

Justificación: La prueba de Schilling se realiza para evaluar la absorción de vitamina B12.

La respuesta correcta es: Para evaluar la absorción de vitamina B12.

Actividad previa

◀ Objetivos específicos

Siguiendo actividad

Objetivos específicos ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>

