

○

17 puntos

1.

La triada de Beck consiste en:



Ingurgitación yugular, Pulso paradójico e hipotensión arterial.



Ingurgitación yugular, pulso paradójico e hipertensión arterial



Disnea, pulso paradójico y dolor torácico



Taquipnea, bradicardia y diaforesis.

○

Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

2.

Las dos causas más frecuentes de la pericarditis aguda son idiopáticas, y cuál otra de las siguientes:



Infección



Uremia



IAM



Cancer

○

Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

3.

¿Qué fármaco se utiliza inicialmente ante un paciente que presenta dolor torácico?



Ácido acetilsalicílico



Paracetamol



Nitroglicerina



Ticagrelol

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

4.

Quando el paciente recién trasplantado regresa a la unidad de cuidados intermedios, en relación con los dispositivos intravenosos y otros catéteres, señale la correcta:



No necesita accesos venosos porque toda la medicación es vía oral



Hay que mantener la vía central hasta el momento del alta a domicilio



El catéter venoso debe ser retirado o sustituido en cuanto aparezca algún síntoma como dolor o eritema



Gracias al tto inmunosupresor, el trasplantado no tiene riesgo de infección de los accesos venosos

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

5.

Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿cuál no está incluido?



IECAS



IECAS + ARNI simultáneamente.



Betabloqueantes



ARNI

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

6.

Indique cuál de estas medidas no es la correcta en el SCA:



Asesorar al paciente sobre hábitos de vida saludables como ejercicio físico, dieta con sal, abstención en el consumo de tabaco y toma de tratamiento farmacológico prescrito.



Monitorización electrocardiográfica y de los signos vitales.



Valoración de las características del dolor: localización, irradiación, tipo, duración, cortejo vegetativo,...



Todas son correctas

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

7.

Respecto al tratamiento de la TSV regular de QRS estrecho. Señale la correcta:



Se administrará Adenosina intravenosa



Si la taquicardia continua podemos intentar controlar la frecuencia cardiaca con Antagonistas del Calcio (Verapamilo, Diltiazem) o Betabloqueantes (Esmolol, metoprolol, atenolol)



Valsalva modificada: el paciente se encuentra sentado y debe de hacer una espiración profunda, se vuelve a tumbar el paciente con las piernas elevadas y luego vuelve a posición de sentado



Todas son correctas

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

8.

Las capas del musculo cardiaco son:



Epicardio, miocardio y endocardio



Pericardio, endocardio, miocardio.



Endocardio y miocardio

-
-

Ninguna es correcta

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○ **0.17puntos**

9.

Señale la respuesta correcta sobre el rechazo agudo celular:

-
-

Grado 1B es un rechazo moderado agudo focal

-
-



Grado 3B es un rechazo agudo severo difuso o "borderline"

-
-

Grado 1A es un rechazo agudo severo

-
-

Grado 1B es un rechazo agudo leve focal

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○ **0.17puntos**

10.

En la taquicardia ventricular monomorfa la cardioversión farmacológica puede realizarse con:

-
-

Procainamida: si no hay infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardiaca grave

-
-

Amiodarona: en miocardiopatías dilatada o hipertrófica, sospecha de isquemia miocárdica o insuficiencia cardiaca

-
-

Betabloqueantes iv: Metoprolol, Esmolol y Atenolol, en taquicardias ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho, fascicular del ventrículo izquierdo o sin cardiopatías

-
-



Todas las anteriores

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○ **0.17puntos**

11.

Al realizar la educación sanitaria no será una recomendación al paciente con insuficiencia cardiaca y su familia:

-

- Tomar una dieta hiposódica.
-
- Realizar ejercicio regularmente en función de sus posibilidades de esfuerzo.
-
- Tomar una dieta rica en grasas saturadas.
-
- Que se le administren las vacunas anuales correspondientes para su franja de edad. Anualmente la vacuna antigripal.

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

0.17puntos

12.

En cuanto a las actividades a realizar para disminuir la ansiedad en el paciente trasplantado, señale la correcta:

-
-
- Explicar todos los procedimientos incluidas las posibles sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento
-
- Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo y escuchar con atención
-
- Ayudar al paciente a identificar las situaciones que causen ansiedad
-
-
- Todas son correctas

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

0.17puntos

13.

Sobre la Taquicardia Auricular unifocal, señale la falsa:

-
- Se observa en pacientes con intoxicación digitálica
-
- La onda P tiene una morfología constante
-
-
- QRS ancho y con morfología irregular
-

■ La onda P es distinta a la P sinusal

○ Sin contestar: -0.02 puntos

0.17 puntos

14.

¿Cuál es la causa de la isquemia miocárdica?

■

■



Desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio

■

■

Tromboembolismo que llega al corazón

■

■

Deterioro de las paredes cardíacas

■

■

Inflamación del pericardio

○ Sin contestar: -0.02 puntos

0.17 puntos

15.

¿Cómo se denomina a la pericarditis post-infarto?

■

■

Síndrome de Turner

■

■



Síndrome de Dressler

■

■

Síndrome de Sjogren

■

■

Ninguna es correcta

○ Sin contestar: -0.02 puntos

0.17 puntos

16.

¿Durante la angiografía con contraste en que posición debe estar el paciente?

■

■

Decúbito lateral izquierdo

■

■



Decúbito supino

■

Decúbito prono

Es indiferente

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

17.

Son taquicardias dependientes del Nodo AV:

La Taquicardia por reentrada Nodal

Taquicardia por reentrada auriculo-ventricular mediada por vía accesoria

A y B son falsas

A y B son correctas

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

18.

En cuanto a los ritmos de escape, señale la opción correcta:

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

19.

Manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica, elige la opción falsa:

Disnea

○

0.17 puntos

22.

Los síntomas de las bradiarritmias incluyen:

-
- Mareo
-
- Sincope
-
- Disnea
-
-

Todas las anteriores

○

Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

23.

Cuál de estas recomendaciones sobre la alimentación en el trasplante es correcta:

-
- Mantener una higiene adecuada en la manipulación de alimentos
-
- Evitar alimentos crudos y sin cocinar correctamente
-
- Hay que intentar individualizar y respetar en la medida de lo posible las preferencias de cada paciente
-
-

Todas son correctas

○

Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

24.

Son manifestaciones del shock cardiogénico:

-
-
- Confusión mental.
-
- Existe buena perfusión distal.
-
- La tensión Arterial se mantiene o puede incrementarse.

-
-
- Los pulsos periféricos son fuertes y regulares.
- **Sin contestar: -0.02 puntos**

0.17puntos

25.

Señale la respuesta incorrecta:

-
-
- Se recomienda no tener contacto directo con plantas, tierra o abonos
-
-
- El paciente trasplantado tiene menos riesgo de sufrir tumores que la población general
-
-
- Son imprescindibles los aportes de Calcio y Vitamina D por el riesgo de osteoporosis
-
-
- Se aconseja la no utilización de alfombras en domicilio porque acumulan polvo y ácaros
- **Sin contestar: -0.02 puntos**

0.17puntos

26.

La arritmia más peligrosa en un paciente con insuficiencia cardíaca:

-
-
- Es la fibrilación auricular.
-
-
- Es el flutter auricular.
-
-
- Es la fibrilación ventricular y el tratamiento es la cardioversión sincronizada precoz.
-
-
- Es la fibrilación ventricular y el tratamiento es la desfibrilación.
- **Sin contestar: -0.02 puntos**

0.17puntos

27.

Definición de Infarto Agudo de Miocardio

-
-
- Necrosis irreversible del tejido miocárdico, debido a una isquemia de corta duración

-
-



Necrosis irreversible del tejido miocárdico, debido a una isquemia de larga duración.

-
-

Necrosis reversible del tejido miocárdico, debido a una isquemia de corta duración.

-
-

Necrosis reversible del tejido miocárdico, debido a una isquemia de larga duración.

○ Sin contestar: -0.02 puntos

○ **0.17puntos**
28.

Dónde estará localizado el infarto si existe una alteración electrocardiográfica en aVL y I:

-
-

Lateral

-
-



Lateral alto

-
-

Inferior

-
-

Anterior

○ Sin contestar: -0.02 puntos

○ **0.17puntos**
29.

A la sensación subjetiva de falta de aire de un paciente se le denomina:

-
-



Disnea

-
-

Taquipnea

-
-

Ortopnea

-
-

Apnea

○ Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

30.

Respecto a las recomendaciones sobre sexualidad en el paciente trasplantado:

-
-
-
-
-
-
-
-

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

31.

Señale la respuesta incorrecta en cuanto al dolor en el postoperatorio del trasplante cardiaco:

-
-
-
-
-
-
-
-

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

32.

Entre las contraindicaciones absolutas del trasplante cardiaco, señale la respuesta incorrecta:

-
-
-

Diabetes mellitus con afectación orgánica (retinopatía, nefropatía o neuropatía)

Hipertensión arterial pulmonar severa e irreversible



Diabetes mellitus sin afección orgánica

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

33.

El dispositivo DAVI Heart Mate III se caracteriza por:

Son dispositivos biventriculares.

Generar flujo pulsátil.

Se coloca en el ventrículo derecho.



Una de sus indicaciones para implantarlo es como terapia de puente al trasplante cardíaco.

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

34.

La Cardioversion Electrica:



Consiste en administrar un choque eléctrico sincronizado con la onda R del ECG

Está indicada en casos de Fibrilacion ventricular

La descarga coincide con el periodo refractario relativo de la repolarización cardiaca que corresponde con la onda T

No puede realizarse en pacientes que estén anticoagulados

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

35.

Respecto al tratamiento general de las arritmias:



Monitorización continua del ritmo cardiaco, tensión arterial y saturación de oxígeno



Canalización de vía venosa periférica



Valoración continua del estado hemodinámico del paciente



Todas las anteriores

○

Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

36.

En la valoración de un paciente con sospecha de arritmia cardiaca es fundamental realizar:



Prueba de mesa oscilante



Colocación de un marcapasos



Colocación de un desfibrilador cardiaco implantable



Entrevista clínica y electrocardiograma

○

Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

37.

Señale cuáles son los principales signos y síntomas de rechazo del injerto:



Disnea, fatiga, tos persistente



Edemas en MMII, oliguria, aumento brusco de peso



Hipotensión, Derrame pericárdico





Todas son correctas

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

38.

Sobre la desfibrilación. Señala la correcta:



Consiste en aplicar una descarga eléctrica sincronizada a través de unos electrodos autoadhesivos desechables o palas conectados a un desfibrilador



Suele hacerse en caso de ritmos cardiacos con QRS fácilmente discernibles



El tiempo que transcurre desde el momento en que se producen, hasta que desfibrilamos no es fundamental para lograr el éxito de la misma



Cuando se realiza la descarga nadie debe tocar al paciente

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

39.

De las taquiarritmias ¿cuál de ellas no corresponde a las supraventriculares?



Flutter ventricular



Taquicardia auricular



Flutter auricular



Fibrilación auricular

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

40.

Tras la realización de un cateterismo cardiaco la enfermera debe vigilar:



- Constantes vitales
- Punto de punción
- Electrocardiografía continua
- Todas son correctas

○ Sin contestar: -0.02 puntos

○ 0.17 puntos

41.

En el IAM hay que solicitar las siguientes pruebas analíticas:

- LDH, mioglobina y coagulación
- Hemoglobina, glucosa, urea, creatinina y TTPA
- Proteína C, lactato y PCR
- CK, CK-MB, troponina

○ Sin contestar: -0.02 puntos

○ 0.17 puntos

42.

¿Cuál es la manifestación clínica más significativa de la insuficiencia cardíaca?

- Ascitis.
- Disnea.
- Dolor torácico tipo pleurítico.
- Nicturia.

○ Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17puntos

43.

Para la detección del rechazo en el paciente con trasplante cardíaco, la prueba diagnóstica de elección es:



Rx de tórax, analítica y ECG



Biopsia endomiocárdica



Ecocardiograma



A y C son correctas

○

Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17puntos

44.

La pericardiocentesis está indicada en presencia de:



Taponamiento cardíaco



Pericarditis con derrame



Derrame pericárdico abundante



Ninguna de las anteriores

○

Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17puntos

45.

En relación a los planes de cuidados, el paciente y la familia deben comprender:



El diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento



Los factores de riesgo asociados con el riesgo de infección y los métodos de controlarlos y prevenirlos.



■ La forma de conseguir y mantener un estado nutricional sano, manteniendo un peso adecuado.

■

■



Todas son correctas

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

46.

Clasificación Killip "grado IV":

■

■

Edema agudo de pulmón

■

■



Shock cardiogénico

■

■

Insuficiencia cardíaca leve, signos de congestión. Estertores o crepitantes húmedos.

■

■

Sin signos ni síntomas de insuficiencia cardiaca izquierda

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

47.

La Fibrilacion Auricular:

■

■

Es la arritmia sostenida más frecuente

■

■

Es un ritmo cardíaco rápido e irregular producido por una actividad eléctrica auricular caótica y con múltiples focos de activación con frecuencias de más de 400 latidos por minuto

■

■

Apenas genera síntomas

■

■



A y B son correctas

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17puntos

48.

En el diagnóstico de IC los parámetros analíticos que son esenciales en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico del paciente son:

-
-
- NT-proBNP
-
- BNP
-
- Creatinina
-
-

Todos los anteriores.

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○ **0.17 puntos**

49.

La valvulopatía más frecuente en el contexto de insuficiencia cardíaca es:

-
-
- Insuficiencia tricúspide
-
- Insuficiencia aórtica
-
- Estenosis mitral
-
-

Estenosis aórtica

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○ **0.17 puntos**

50.

En el trasplante cardíaco, la prevención de infecciones:

-
-
- Se recomiendan medidas universales en cuanto a la higiene de manos, según recomendaciones de la OMS
-
- La salud dental es imprescindible para evitar trastornos digestivos y prevenir infecciones
-
- Tomar antibióticos es la única manera de prevenir
-
-

a y b son correctas

○ Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

51.

¿Cuál es la “arteria implicada” en el “IAM anterior”?



Circunfleja



Coronaria derecha



Coronaria izquierda



Descendente anterior

○ Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

52.

La triple terapia inmunosupresora consiste en:



Un corticoide, un anticuerpo monoclonal y los policlonales



Anticalcineurínico, antibióticos y un corticoides



Un anticalcineurínicos, un corticoide e Inhibidor de la síntesis de purina



Inhibidores de la síntesis de purina, OKT3 y corticoides

○ Sin contestar: -0.02 puntos

○

0.17 puntos

53.

En la valoración de la situación funcional y psicosocial del paciente con IC, ¿qué aspectos debemos valorar?



Apoyo familiar y grado de dependencia.



Situación cognitiva.



Estado anímico.



Todos los anteriores.

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

54.

La presencia de insuficiencia cardíaca y arritmia sugiere:



Miocarditis



Endocarditis



Pericarditis



Ninguna de las anteriores

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

55.


Paciente que acude a urgencias con dolor precordial de ≤ 12 horas de inicio de los síntomas, ¿cuál sería la primera actuación?



Terapia fibrinolítica



Valorar ICP [intervención coronaria percutánea] Temprana (3-24 h)



Trasladar en ≤ 90 minutos a un hospital de alta especialidad



ECG, evaluación, confirmación de IAMCEST

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

56.

En el edema agudo de pulmón:



Se pueden emplear mórnicos intravenosos.



La furosemida intravenosa es el diurético de elección.

a tratamiento médico y quirúrgico convencional con esperanza de vida calculada de menos de un año



Estadio D (AHA) y clase funcional (NYHA) IV, con acuerdo unánime de que el tratamiento médico ha sido correcto y que otro tratamiento quirúrgico no puede ofrecer una mejor expectativa y calidad de vida



Edad comprendida entre 14 y 69 años



Todas son correctas

○ **Sin contestar: -0.02 puntos**

○

0.17 puntos

60.

¿Cuál es un factor de riesgo cardiovascular?



Sedentarismo



Tabaquismo



Hipertensión arterial



Todas son correctas