

[Página Principal](#)[Mis cursos](#)[DF-CEU](#)[Módulo 2. Actualización en cuidados médico-quirúrgicos en urgencias](#)[Prueba de conocimientos 2](#)

Comenzado el	jueves, 24 de octubre de 2024, 10:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 24 de octubre de 2024, 11:05
Tiempo empleado	17 minutos 54 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es un signo de complicación en un cólico reno ureteral:

Seleccione una:

- ☒ a. Fiebre. ✓
- ☐ b. Vómitos.
- ☐ c. Dolor.
- ☐ d. Disuria.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El principal riesgo de una crisis asmática que no cede, es:

Seleccione una:

- ☐ a. Los vómitos.
- ☒ b. El agotamiento. ✓
- ☐ c. La infección.
- ☐ d. El mareo.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En que tipo de shock aparece una piel caliente y sonrojada en el paciente:

Seleccione una:

- ☐ a. Shock hipovolémico.
- ☒ b. Shock séptico. ✓
- ☐ c. Shock cardiogénico.
- ☐ d. Shock neurogénico.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante un Tromboembolismo pulmonar (TEP) estable hemodinámicamente hablando:

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar antiagregación plaquetaria.
- ☐ b. Tratamiento trombolítico con TNK-TPA.
- ☒ c. Tratamiento anticoagulante con Enoxaparina (heparinas de bajo peso molecular). ✓
- ☐ d. Pedir medición del INR.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una Epistaxis?

Seleccione una:

- ☐ a. El momento de extasis tras el uso del EPI (Equipo de Protección Individual) completo.
- ☐ b. Un sangrado interno no exteriorizado.
- ☒ c. Una hemorragia nasal. ✓
- ☐ d. La inflamación de la epíffisis.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el shock hipovolémico la primera acción a tomar sería:

Seleccione una:

- ☐ a. Administración de coloides
- ☐ b. Administración de drogas inotrópicas
- ☒ c. Reposición con cristaloides ✓
- ☐ d. Reposición con vía oral

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes opciones, cuál es la diferencia entre el shock séptico y los demás tipos:

Seleccione una:

- ☐ a. No precisa reposición de volumen aún con hipotensión.
- ☐ b. No causa taquicardia (salvo en paciente betabloqueados).
- ☒ c. La necesidad de recoger hemocultivos y urocultivo. ✓
- ☐ d. Nunca se modifica la función respiratoria.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Por muchos coloides y cristaloides que perfundamos a un paciente en shock, tenemos que tener claro que a diferencia de los hemoderivados, la citada sueroterapia no aporta:

Seleccione una:

- ☐ a. Volumen.
- ☐ b. Aumento de tensión arterial.
- ☒ c. Capacidad de transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos. ✓
- ☐ d. Lavado gástrico.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Medida a tomar de forma prioritaria ante un paciente inconsciente (en coma):

Seleccione una:

- ☐ a. Hacer glucemia capilar.
- ☐ b. Administrar Naloxona.
- ☒ c. Valorar ABCD. ✓
- ☐ d. Aplicar escala de coma de Glasgow.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La clasificación de Killip ordena:

Seleccione una:

- ☐ a. La única clasificación de Killip es la que junto a Kimbal, clasifica la relación de Insuficiencia Cardíaca con Síndrome Coronario Agudo de mayor a menor, de tal forma que "I" es Shock Cardiogénico y "IV" infarto NO complicado
- ☐ b. El origen de la Insuficiencia Cardíaca.
- ☒ c. El grado y tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca. ✓
- ☐ d. Los bloqueos aurículo-ventriculares de 2º grado

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Qué podemos no vigilar en un episodio de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- ☐ a. El pH.
- ☐ b. K+.
- ☐ c. Edema cerebral.
- ☒ d. Recientes episodios de caries en la cavidad oral. ✓

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Siguiendo las últimas recomendaciones de tratamiento del Síndrome Coronario Agudo, la saturación de oxígeno del paciente deberá estar:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre 95% y 100%.
- ☒ b. Entre 90% y 95%. ✓
- ☐ c. En 90%.
- ☐ d. En 100%.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Primera medida ante paciente con sospecha de cetoacidosis diabética:

Seleccione una:

- ☒ a. Valorar ABCD. ✓
- ☐ b. Hacer glucemia capilar.
- ☐ c. Buscar cuerpos cetónicos.
- ☐ d. Administrar dextrosa/glucosa.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con que alergia deberemos tener especial cuidado a la hora de atender una crisis tiorotóxica:

Seleccione una:

- ☐ a. Penicilinas.
- ☐ b. Gluten.
- ☒ c. Yodo. ✓
- ☐ d. Polen.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el shock hipovolémico la Noradrenalina se administración en una dosis de:

Seleccione una:

- ☒ a. 6 mg + 44 ml de SG/Dx 5% a 4 ml/h de inicio. ✓
- ☐ b. 6 mg en bolo sin disolver.
- ☐ c. 6 mg + 50 ml de Sg/Dx 5% o SSF 0,9 a 8 ml/h.
- ☐ d. 12 mg + 88 ml de SG/Dx 5% a 16 ml/min inicialmente.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se considera crisis hipertensiva:

Seleccione una:

- ☒ a. TAS mayor o igual que 210 mm Hg y/o TAD mayor o igual que 120 mmHg. ✓
- ☐ b. TAS mayor que 200 mmHg y TAD mayor que 130 mmHg.
- ☐ c. Toda TA que no sea 120/80 mmHg.
- ☐ d. TAD mayor que 110 mmHg y TAS mayor que 200 mmHg.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La dosis inicial de insulina en bolo IV ante una cetoacidosis diabética será de:

Seleccione una:

- ☐ a. 15 U.I.
- ☒ b. 10 U.I. de insulina regular/rápida. ✓
- ☐ c. 10 U.I de insulina NPH.
- ☐ d. 12 U.I de insulina rápida/regular.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una acidosis implica:

Seleccione una:

- ☒ a. Descenso del pH. ✓
- ☐ b. Hipotensión - Bradicardia - Bradipsiquia.
- ☐ c. Aumento del pH.
- ☐ d. Triplicar la PCO₂.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El uso de SNG en pacientes con sangrado digestivo alto activo, esta contraindicado en caso de:

Seleccione una:

- ☐ a. VHC +.
- ☒ b. Varices esofágicas. ✓
- ☐ c. INR mayor que 7.
- ☐ d. Pacientes diabéticos.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

NO es un tipo de SHOCK:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipovolémico.
- ☐ b. Cardiogénico.
- ☐ c. Séptico.
- ☒ d. Anaerobio. ✓

Actividad previa

◀ Documento de estudio Módulo 2

Ir a...

Siguiente actividad

Caso práctico: Actualización en cuidados médico-quirúrgicos en urgencias ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>