

ACTIVACIÓN DE CÓDIGOS EN PATOLOGÍAS TIEMPO-DEPENDIENTE. ALERTA HOSPITALARIA EN EL PACIENTE CRÍTICO (2024)

1 Indique que signos de sospecha clínica del Ictus valora la Escala de Cincinnati:

Seleccione una:

D.ASIMETRÍA FACIAL, DEBILIDAD DEL BRAZO Y TRASTORNO DE LENGUAJE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **ASIMETRÍA FACIAL, DEBILIDAD DEL BRAZO Y TRASTORNO DE LENGUAJE.**

2 Señale la respuesta incorrecta en cuanto a la estabilización y cuidados en el caso de un paciente con Ictus agudo en el medio extrahospitalario:

Seleccione una:

C.LA CANALIZACIÓN DE LOS ACCESOS VENOSOS SE REALIZARÁN PREFERENTEMENTE EN EL BRAZO PARÉTICO.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **LA CANALIZACIÓN DE LOS ACCESOS VENOSOS SE REALIZARÁN PREFERENTEMENTE EN EL BRAZO PARÉTICO.**

3 Cual sería un criterio de exclusión para llevar a cabo el tratamiento fibrinolítico en un paciente diagnosticado de Ictus.

Seleccione una:

A.HEMORRAGIA O SANGRADO GRAVE RECIENTE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **HEMORRAGIA O SANGRADO GRAVE RECIENTE.**

4 Dentro de los criterios de exclusión del Código ictus, señale la incorrecta:

Seleccione una:

C.PUNTUACIÓN MENOR QUE 2 EN LA ESCALA RANKIN.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **PUNTUACIÓN MENOR QUE 2 EN LA ESCALA RANKIN.**

5 Si conseguimos una puntuación de 22 en la Escala NIHSS, nos encontramos ante un Ictus:

Seleccione una:

B.MUY GRAVE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **MUY GRAVE.**

6 Según las nuevas recomendaciones recogidas en el plan de Acción para el Ictus en Europa 2018-2030, cuál se consideraría paciente candidato para llevar a cabo la activación del Código Ictus:

Seleccione una:

C.PACIENTE DE 80 AÑOS, CON UNA PUNTUACIÓN DE 2 EN LA ESCALA DE RANKIN MODIFICADO, QUE PRESENTA SINTOMATOLOGÍA NEUROLÓGICA ESPECÍFICA DE ICTUS DE MENOS DE 24HORAS DE EVOLUCIÓN.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **PACIENTE DE 80 AÑOS, CON UNA PUNTUACIÓN DE 2 EN LA ESCALA DE RANKIN MODIFICADO, QUE PRESENTA SINTOMATOLOGÍA NEUROLÓGICA ESPECÍFICA DE ICTUS DE MENOS DE 24HORAS DE EVOLUCIÓN.**

7 Como se denomina el sistema de telemedicina que permite la comunicación entre los diferentes niveles asistenciales cuando existen barreras geográficas que dificultan o retrasan el acceso directo a los mismos:

Seleccione una:

C.TELEICTUS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **TELEICTUS.**

8 En 1995 se emitió la Declaración de Helsinborg para reforzar los conocimiento y calidad asistencias en los pacientes que padecen:

Seleccione una:

A.ICTUS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **ICTUS.**

9 Señale el objetivo que pretende conseguir el “Plan de Acción para el Ictus en Europa 2018-2030”

Seleccione una:

A.1.5 UNIDADES DE ICTUS POR CADA 1000 ACCIDENTES.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **1.5 UNIDADES DE ICTUS POR CADA 1000 ACCIDENTES.**

10 Indique cuál no es un síntoma de sospecha de Ictus:

Seleccione una:

B.CEFALEA MIGRAÑOSA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **CEFALEA MIGRAÑOSA.**

11 Se tendrá especial precaución en la administración de vasodilatadores, como por ejemplo la NTG sublingual en pacientes que presenten algunas de las siguientes características. Señale la falsa:

Seleccione una:

B.INFARTO DEL VI.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **INFARTO DEL VI.**

12 En qué situación se retrasaría la realización de ACTP hasta la estabilización del paciente. Señale la falsa:

Seleccione una:

D.HIPERGLUCEMIA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **HIPERGLUCEMIA.**

13 Para la realización del tratamiento fibrinolítico en un paciente con IAM, señale, de entre las siguiente, cuál no es una contraindicación relativa:

Seleccione una:

A.PRESENCIA DE MELENAS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **PRESENCIA DE MELENAS.**

14 Cuál de los siguientes hallazgos electrocardiográficos no es compatible con la activación del Código Infarto:

Seleccione una:

D.BLOQUEO AV DE PRIMER GRADO.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **BLOQUEO AV DE PRIMER GRADO.**

15 En cuanto a la administración del TNK (Tecnectplasa):

Seleccione una:

B.SE ADMINISTRARÁ EN BOLO EN 10 SEGUNDOS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **SE ADMINISTRARÁ EN BOLO EN 10 SEGUNDOS.**

16 Qué signo electrocardiográfico indica la existencia de una lesión cardíaca en el contexto de un IAM:

Seleccione una:

D.SEGMENTO ST ELEVADO.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **SEGMENTO ST ELEVADO.**

17 En el IAM. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

A.LOS ANCIANOS Y LOS DIABÉTICOS PUEDEN TENER DOLORES TORÁDICOS ATÍPICOS, INCLUSO SILENTES.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **LOS ANCIANOS Y LOS DIABÉTICOS PUEDEN TENER DOLORES TORÁDICOS ATÍPICOS, INCLUSO SILENTES.**

18 Para la adecuada realización de un ECG es preciso que la enfermera coloque de forma correcta los electrodos en el tórax del paciente. Indique cual es la incorrecta:

Seleccione una:

B.V3 EN QUINTO ESPACIO INTERCOSTAL, LÍNEA MEDIA CLAVICULAR.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **V3 EN QUINTO ESPACIO INTERCOSTAL, LÍNEA MEDIA CLAVICULAR.**

19 En cuanto a los cuidados de enfermería en el IAM, señale la falsa:

Seleccione una:

C.ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO A TODOS LOS PACIENTES.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO A TODOS LOS PACIENTES.**

20 Mujer de 50 años, casada y con dos hijos, empresaria con alto cargo, fumadora, que, tras presentar dolor torácico opresivo, en su trabajo sufre un episodio de pérdida de conciencia con PCR. Se inician maniobra de RCP. Cuál sería la secuencia de pasos a seguir en la actuación, según las últimas recomendaciones del European Resuscitation Council 2021:

Seleccione una:

A .RECONOCIMIENTO PRECOZ Y PEDIR AYUDA, RCP PRECOZ POR TESTIGOS, DESFIBRILACIÓN PRECOZ, SVA PRECOZ Y CUIDADOS POSTRESUCITACIÓN.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **RECONOCIMIENTO PRECOZ Y PEDIR AYUDA, RCP PRECOZ POR TESTIGOS, DESFIBRILACIÓN PRECOZ, SVA PRECOZ Y CUIDADOS POSTRESUCITACIÓN.**

21 ¿En qué año se desarrolló el “Plan de Donación 40” por la Organización Nacional de trasplantes (ONT) que establecía para todas las comunidades el objetivo de 40 donantes por millón de habitantes?

Seleccione una:

A.2008

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **2008**

22 Según la clasificación de Maastricht modificada del 2011, un paciente que sufre una parada cardiaca extrahospitalaria, y es atendido por los SEM, quienes le trasladan al hospital con maniobras de RCP infructuosas, se clasificaría como:

Seleccione una:

B. II.A.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **II.A.**

23 En cuál de las siguientes situaciones sería posible activar el protocolo de DANC:

Seleccione una:

D. MUJER DE 45 AÑOS. PESO DE 50KG. SUFRE PCR EN UN CENTRO COMERCIAL. LOS TESTIGOS QUE LA PRESENCIAN INICIAN INMEDIATAMENTE MANIOBRAS DE RCP BÁSICA. A LOS 7 MINUTOS, LLEGAN LOS SEM E INICIA MANIOBRAS DE RCP AVANZADA DURANTE MÁS DE 40 MINUTOS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **Mujer de 45 años. Peso de 50Kg. Sufre PCR en un centro comercial. Los testigos que la presencian inician inmediatamente maniobras de RCP básica. A los 7 minutos, llegan los SEM e inicia maniobras de RCP avanzada durante más de 40 minutos.**

24 Según la clasificación de Maastricht modificada del 2011, un paciente clasificado como I se corresponde con:

Seleccione una:

A. PACIENTE QUE HA SUFRIDO UNA MUERTE SÚBITA FUERA DEL HOSPITAL, AL QUE NO SE LE REALIZAN MANIOBRAS DE REANIMACIÓN.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **PACIENTE QUE HA SUFRIDO UNA MUERTE SÚBITA FUERA DEL HOSPITAL, AL QUE NO SE LE REALIZAN MANIOBRAS DE REANIMACIÓN.**

25 Qué ley regula el traslado y transporte estatal de órganos en España:

Seleccione una:

A. REAL DECRETO 1723/2012, DE 28 DE DICIEMBRE.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **REAL DECRETO 1723/2012, DE 28 DE DICIEMBRE.**

26 Las nuevas directrices internacionales por SSC (Campaña para Sobrevivir a la Sepsis) incluyen una serie de escalas para la valoración de un paciente con sepsis o shock séptico excepto:

Seleccione una:

A. ESCALA DE CINCINNATI.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **ESCALA DE CINCINNATI.**

27 Qué parámetros valora la escala q-SOFA. Señale la incorrecta:

Seleccione una:

C. FRECUENCIA CARDÍACA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **FRECUENCIA CARDÍACA.**

28 Con cuál de estos pacientes con sospecha de infección consideraría la activación del Código Sepsis:

Seleccione una:

D. GLASGOW DE 12, FR DE 25RPM Y TAS DE 100MMHG.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **GLASGOW DE 12, FR DE 25RPM Y TAS DE 100MMHG.**

29 Dentro de los criterios fisiológicos para activar el Código Trauma encontramos todos excepto:

Seleccione una:

B. COAGULOPATÍA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **COAGULOPATÍA.**

30 Según las últimas recomendaciones, el uso del torniquete:

D. SE EMPLEARÁN ANALGÉSICOS PARA DISMINUIR EL DOLOR PROVOCADO POR LA ISQUEMIA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: **SE EMPLEARÁN ANALGÉSICOS PARA DISMINUIR EL DOLOR PROVOCADO POR LA ISQUEMIA.**