

[Página Principal](#) > [IT.Q003](#) > [Módulo 2. Atención enfermera al final de la vida](#)

[Prueba de conocimientos Módulo 2](#)

Comenzado el	viernes, 8 de noviembre de 2024, 20:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 8 de noviembre de 2024, 20:43
Tiempo empleado	27 minutos 56 segundos
Puntos	18,00/20,00
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)
Comentario	- Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la vía de elección para la administración de fármacos en el paciente paliativo? Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Intravenosa.
- b. Subcutánea.
- c. Oral. ✓
- d. Rectal.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las medidas para prevenir la mucositis podemos destacar: Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Calentar alimentos a altas temperaturas. ✓
- b. Buena higiene dental con cepillo suave.
- c. Realizar colutorios con agua con bicarbonato o manzanilla.
- d. B y c son correctas

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera para preservar la higiene del paciente paliativo: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Facilitará un baño diario.
- b. El secado de los pliegues debe ser minucioso.
- c. No es preciso evaluar la piel en el aseo.
- d. La respuesta a y b son correctas. ✓

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta. En el síndrome de vena cava superior.

Seleccione una:

- a. Entre los signos y síntomas se encuentra edema en esclavina, ingurgitación yugular y cianosis en cara y miembros superiores.
- b. Puede ser debida a tumores de pulmón, trombosis de vena cava superior por trastornos paraneoplásicos y pacientes con accesos venosos centrales relacionado con la trombosis del mismo.
- c. Entre los tratamientos se encuentra la radioterapia y colocación de endoprotesis.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las medidas a tomar en caso de hemorragia. Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Si el sangrado es local: aplicar vendajes compresivos o taponamiento nasal.
- b. Si hemoptisis: colocar al paciente en decúbito lateral sobre el lado del pulmón afectado para evitar la aspiración.
- c. Utilizar paños blancos en todo momento.
- d. A y b son correctas. ✓

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. En cuanto a el ejercicio en el paciente paliativo.

Seleccione una:

- a. El ejercicio al final de la vida debe ser reducido y focalizado en objetivos sencillos como pasar de la cama a la silla.
- b. El ejercicio al final de la vida debe incrementarse y aumentar la intensidad. ✓
- c. La presencia de metástasis y otros síntomas puede producir disminución de la función física y el estado general del paciente.
- d. Se debe fomentar la ocupación del paciente en su tiempo libre siempre que su situación lo permita, que lea, escriba o salga a pasear.

Pregunta

7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Entre las ventajas de la vía subcutánea se encuentra. Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Técnica segura y poco agresiva.
- b. Puede evitar o reducir la hospitalización. ✗
- c. Limitación de fármacos y fluidos.
- d. No precisa de medidas especiales de mantenimiento.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la evaluación de los síntomas del paciente con necesidades paliativas: Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Se debe evaluar la intensidad de los mismo.
- b. La frecuencia con que se producen.
- c. La evaluación la hace el personal sanitario sin contar con el paciente. ✓
- d. La opinión del paciente es importante.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las alteraciones hematopoyéticas en el paciente paliativo nos encontramos con: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Anemia.
- b. Trombopenia.
- c. Neutropenia.
- d. Todas con correctas. ✓

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los cuidados especiales de las úlceras tumorales. Señala la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se debe realizar un lavado minucioso de la herida friccionando para eliminar esfacelos y descontaminar la herida. ✓
- b. Se puede utilizar metronidazol tópico para el control del mal olor.
- c. Se puede utilizar apósitos hemostáticos para el control del sangrado.
- d. Se debe administrar analgesia pautada previa a la cura en úlceras dolorosas.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la Escala Analgésica de la OMS modificada por Dr. Gómez Sancho: Señala la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se progresará dependiendo la respuesta a cada escalón, la escalada dependerá del fallo del escalón anterior.
- b. Se puede ascender del primer al tercer escalón si la intensidad del dolor lo requiere.
- c. Se puede acompañar del uso de coadyudantes en cualquier escalón.
- d. El soporte emocional y de comunicación al paciente y la familia no es tenido en cuenta. ✓

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el tratamiento de la anorexia en el paciente paliativo se usan: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Dexametasona como estimulante del apetito.
- b. Domperidona para aumentar el funcionamiento gastrointestinal enlentecido.
- c. Acetato de megestrol como estimulante del apetito.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el alivio de la xerostomía en el paciente paliativo es recomendable: Seleccione la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Chupar trocitos de hielo saborizados con zumo de frutas.
- b. Dar pequeños sorbos frecuentes de bebidas frías.
- c. Realizar enjuagues con manzanilla con limón.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método válido para la detección de alteraciones en la deglución es: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Test clínico volumen viscosidad (MECV-V). ✓
- b. Test de Lattinen.
- c. McGill Pain Questionnaire (MPQ).
- d. B y c son correctas.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pablo diagnosticado de cáncer de esófago avanzado presenta disfagia que le impide recibir analgésicos por vía oral, solicitando permanecer en su domicilio. ¿Qué otra vía de administración de fármacos implementaría prioritariamente? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Intravenosa.
- b. Intramuscular.
- c. Subcutánea. ✓
- d. Endoscópica

Pregunta

16

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para valorar la disnea en un paciente paliativo utilizaremos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Cancer Dyspnea Scale.
- b. Verbal Scale Rating.
- c. Escala Visual analógica (EVA). ✗
- d. Todas son correctas.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las complicaciones de la disfagia encontramos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Neumonía aspirativas.
- b. Insuficiencia respiratoria.
- c. Deshidratación e insuficiencia renal.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la incorrecta. Ante una crisis de disnea:

Seleccione una:

- a. Mantener al paciente en una postura cómoda.
- b. Administrar la medicación pautaada.
- c. Fomentar la respiración eficaz y la utilización de ejercicios de relajación por parte del paciente.
- d. Pedir a los familiares que se salgan de la habitación para no estar junto al paciente. ✓

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La xerostomía es un síntoma frecuente en los pacientes paliativos. Entre sus causas están: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Fármacos como opioides y corticoesteroides.
- b. Radioterapia.
- c. A y b son correctas. ✓
- d. La hiperhidratación.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la obstrucción intestinal el tratamiento puede incluir: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Descompresión abdominal mediante sondaje nasogástrico conectado a bolsa.
- b. Ocreotride
- c. Metoclopramida
- d. Todas son correctas. ✓

Actividad previa

◀ Ponencia "El cuidado paliativo de la persona con dolor"

Ir a...

Siguiente actividad

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>