

[Página Principal](#) > [IT.Q003](#) > [Módulo 2. Atención enfermera al final de la vida](#)

[Prueba de conocimientos Módulo 2](#)

Comenzado el	viernes, 8 de noviembre de 2024, 21:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 8 de noviembre de 2024, 21:54
Tiempo empleado	24 minutos 12 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario	- Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la incorrecta. La compresión medula:

Seleccione una:

- a. En muchos casos supone el debut oncológico del paciente.
- b. La demora en la atención puede producir parálisis irreversible e incontinencia de esfínteres.
- c. No supone una emergencia médica. ✓
- d. A y b son correctas.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A un paciente paliativo con diarrea le recomendaríamos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Limitar el azúcar y las grasas en la dieta. ✓
- b. Beber mucho volumen de líquidos de una sola vez y con gran contraste de temperatura.
- c. Comer alimentos integrales, así como legumbres y frutas.
- d. Ingerir bebidas gaseosas.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las complicaciones de la traqueotomía podemos tener: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Lesión tumoral en el estoma.
- b. Estenosis.
- c. Hemorragias.
- d. Todas con correctas. ✓

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. En cuanto a el ejercicio en el paciente paliativo.

Seleccione una:

- a. El ejercicio al final de la vida debe ser reducido y focalizado en objetivos sencillos como pasar de la cama a la silla.
- b. El ejercicio al final de la vida debe incrementarse y aumentar la intensidad. ✓
- c. La presencia de metástasis y otros síntomas puede producir disminución de la función física y el estado general del paciente.
- d. Se debe fomentar la ocupación del paciente en su tiempo libre siempre que su situación lo permita, que lea, escriba o salga a pasear.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué se refiere el concepto de "dolor total" definido por la Dra. Cicely Saunders? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. A la suma de los dolores que refiere un paciente.
- b. A la queja del dolor por el paciente y su familia.
- c. A los aspectos físicos, sociales, emocionales y espirituales del dolor. ✓
- d. Al mecanismo, la intensidad y la clasificación del dolor.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los cuidados especiales de las úlceras tumorales. Señala la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se debe realizar un lavado minucioso de la herida friccionando para eliminar esfacelos y descontaminar la herida. ✓
 - b. Se puede utilizar metronidazol tópico para el control del mal olor.
 - c. Se puede utilizar apósitos hemostáticos para el control del sangrado.
 - d. Se debe administrar analgesia pautada previa a la cura en úlceras dolorosas.
-

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las medidas para prevenir la mucositis podemos destacar: Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Calentar alimentos a altas temperaturas. ✓
 - b. Buena higiene dental con cepillo suave.
 - c. Realizar colutorios con agua con bicarbonato o manzanilla.
 - d. B y c son correctas
-

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los laxantes utilizados en el estreñimiento en el paciente paliativo se encuentra: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Laxantes osmóticos salinos y no salinos.
 - b. Lactulosa y macrogol.
 - c. Laxantes formadores de volumen o reguladores.
 - d. A y b son correctas ✓
-

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la obstrucción intestinal el tratamiento puede incluir: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Descompresión abdominal mediante sondaje nasogástrico conectado a bolsa.
- b. Ocreotide
- c. Metoclopramida
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la mucositis Grado 1 según la clasificación de la OMS. Seleccione la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. El paciente sólo tolera líquidos.
- b. El paciente no puede comer nada por las úlceras bucales.
- c. El paciente presenta eritema en la mucosa oral. ✓
- d. El paciente no presenta ningún síntoma ni alteración.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la incorrecta. Ante una crisis de disnea:

Seleccione una:

- a. Mantener al paciente en una postura cómoda.
- b. Administrar la medicación pautada.
- c. Fomentar la respiración eficaz y la utilización de ejercicios de relajación por parte del paciente.
- d. Pedir a los familiares que se salgan de la habitación para no estar junto al paciente. ✓

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la vía de elección para la administración de fármacos en el paciente paliativo? Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Intravenosa.
- b. Subcutánea.
- c. Oral. ✓
- d. Rectal.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la hipercalcemia tumoral aparecen síntomas como: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Anorexia.
- b. Polidipsia.
- c. Deshidratación.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pablo diagnosticado de cáncer de esófago avanzado presenta disfagia que le impide recibir analgésicos por vía oral, solicitando permanecer en su domicilio. ¿Qué otra vía de administración de fármacos implementaría prioritariamente? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Intravenosa.
- b. Intramuscular.
- c. Subcutánea. ✓
- d. Endoscópica

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la Escala Analgésica de la OMS modificada por Dr. Gómez Sancho: Señala la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se progresará dependiendo la respuesta a cada escalón, la escalada dependerá del fallo del escalón anterior.
- b. Se puede ascender del primer al tercer escalón si la intensidad del dolor lo requiere.
- c. Se puede acompañar del uso de coadyudantes en cualquier escalón.
- d. El soporte emocional y de comunicación al paciente y la familia no es tenido en cuenta. ✓

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el paciente paliativo existen alteraciones en la nutrición debido a problemas al tragar, deglutir o masticar, náuseas, vómitos, anorexia, dificultades en la absorción y efectos secundarios a fármacos, de ahí que la enfermera como objetivo prioritario en los cuidados básicos establezca: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Invitaremos a que coma todo lo posible, cuanto más mejor.
- b. Se servirá en cantidades copiosas y platos grandes para nutrir bien al paciente.
- c. Añadiremos salsas picantes con textura adecuada para propiciar la deglución.
- d. Haremos hincapié en los cuidados higiénicos de la boca e hidratación adecuada. ✓

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los síntomas y signos de linfedema nos podemos encontrar: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Piel eritematosa, delgada y traslúcida.
- b. Hipoestesias, parestesia y alodinia.
- c. Afectación glanglionar tumoral.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera para preservar la higiene del paciente paliativo: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Facilitará un baño diario.
- b. El secado de los pliegues debe ser minucioso.
- c. No es preciso evaluar la piel en el aseo.
- d. La respuesta a y b son correctas. ✓

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando hablamos de la incapacidad de la persona para retener la orina, unido en la mayoría de los casos de un deseo continuo de orinar, nos referimos a: Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Retención urinaria.
- b. Tenesmo vesical.
- c. Espasmo vesical.
- d. Incontinencia urinaria. ✓

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método válido para la detección de alteraciones en la deglución es: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Test clínico volumen viscosidad (MECV-V). ✓
- b. Test de Lattinen.
- c. MaGill Pain Questionnaire (MPQ).
- d. B y c son correctas.

Actividad previa

[◀ Ponencia "El cuidado paliativo de la persona con dolor"](#)

Siguiente actividad

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>