Mi Cuenta

Desconectar

Ir a la web de FAE





<u>Inicio</u> <u>Fo</u>

<u>Formación</u>

<u>Librería</u>

Comprobación De Certificados

<u>FAQ</u>

<u>Actualidad</u> <u>Vídeos</u>

<u>Aula Virtual</u> > <u>CUIDADOS DEL TCAE EN PACIENTE POSTOPERATORIO DE FRACTURA DE CADERA</u> > <u>Cumplimentar test</u>

CUIDADOS DEL TCAE EN PACIENTE POSTOPERATORIO DE FRACTURA DE CADERA

>cráneo:	su función es la protección de órganos nobles y se encuentran rodeando las cavidades que contribuyen a formar
O Huesos cortos.	
• Huesos anchos o	planos.
○ Huesos largos.	
○ Huesos frágiles.	
> La fractura de cadera	es:
🖲 La más frecuente	en pacientes geriátricos.
O La más frecuente	en pacientes pediatras.
O La menos frecuer	nte en pacientes geriátricos
○ Ninguna es corre	cta.
> En la exploración del	aparato locomotor los rangos normales de movimiento en decúbito supino:
💿 Todas son correc	tas.
○ Flexión: hasta 90°	° con rodilla extendida y 120° con rodilla flexionada.
O Abducción: hasta	45° antes que la pelvis empiece a bascular.
○ Aducción: hasta 4	40°.
> ¿Cuál es la prueba dia	agnóstica principal para confirmar la fractura?
 RX	
○ Angiografía.	
○ RM	

> Entre los signos de la fractura de cadera:	
○ Todas son correctas.	
O Coloración de la zona afectada.	
O Deformidad.	
O Tumefacción.	
> A la llegada a hospitalización se deben seguir las siguientes actividades de control y seguimiento quirúrgico:	
 Todas son correctas.	
🔾 Prevenir caídas (barreras de protección, asistencia oportuna).	
○ Vigilar sangrado y apósitos de la herida.	
O Incorporar al paciente en la cama con ayuda parcial o total según la situación.	
> En la clínica del paciente evalúa el estado general del paciente:	******
○ Nivel de conciencia.	
○ Repercusión de otros órganos distintos al que se ha producido la lesión.	
 Todas son correctas.	
🔾 Valoración hemodinámica.	
> En decúbito supino no debe rotar las piernas hacia fuera (los pies deben mirar hacia arriba)., no se recomienda dormir ni tumbarse sobre la pierna no operada. (Falso o Verdadero)	
○ Falso.	
 Verdadero.	
> Para reducir el riesgo de lesionarse la espalda el TCAE/TCE debe hacer lo siguiente:	
○ Explique al paciente los movimientos que va a hacer y pídale que le diga cuando esté listo	
 Todas son correctas.	
○ Mantenga las rodillas dobladas y la espalda en posición vertical.	
○ Obtenga ayuda en caso de ser necesario.	
> ¿Cuáles son las indicaciones artroplastia de cadera?	
○ Displasia de cadera.	
○ Secuelas de artritis séptica.	
 Todas son correctas.	^
🔾 Secuelas de artritis séptica.	
 Son un órgano que se encuentra en la unión entre dos o más huesos que favorece a su desplazamiento, gracias a los ligamentos y musculatura: 	
○ La tiroides.	
 Las articulaciones.	
○ Ninguna es correcta.	
O Los huesos.	
> Entre las complicaciones se encuentran, excepto:	
○ Necrosis avascular.	
 Pielonefritis.	
○ Trombosis venosa profunda.	

🔾 Lesión neurovascular.
¿Cuáles son los tipos de cadera?
🔾 Fractura intracapsulares
🔾 Fractura extracapsulares
● Todas son correctas.
🔾 Fractura subcapital
Las articulaciones sinoviales realizan diferentes tipos de movimientos planos:
🔾 Tres, cuatro y cinco planos.
🤊 Uno, dos o tres planos.
🔾 Todas son correctas.
🔾 Uno y dos planes.
es producto de una hemorragia, inestabilidad circulatoria.
🔾 Gangrena
🔾 Todas son correctas.
🤋 Shock
○ Hemorragia.
Los pasos para subir las escaleras, son los siguientes:
🔾 Se debe apoyar la pierna operada en el escalón a subir.
🧿 Todas son correctas.
🔾 Se deben apoyar los bastones.
○ Y posteriormente subir la pierna operada.
El tejido óseo sufre un proceso de crecimiento y desarrollo, desde:
🔾 De la adolescencia hasta la vejez
🔾 La adolescencia
🔾 Ninguna es correcta
🤊 La vida uterina
No es permitido que se ponga en decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo, durante las primeras 6 semanas de la cirugía.
🖲 Verdadero
○ Falso
Entre los factores de riesgo se encuentran:
🔾 Medicamentos, problemas de nutrición.
🧿 Todas son correctas.
🔾 Inactividad física, consumo de tabaco y de alcohol.
🔾 Edad, sexo, osteoporosis.
La articulación coxofemoral es fuerte que soporta carga y realiza movimientos.
○ Una diartrosintesis.
🧿 Una diartrosis.

O Una conexión	
O Una troclear	

Enviar

Estadísticas

Intento: 1

Total Preguntas: **20**

Se aprueba con: 16 aciertos

Respuestas: 20

Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE)

Escríbenos Llámanos: 91 521 52 24 Tomás López 3 - 4ª Dcha 28009 Madrid

© Copyright - 2021 FAE

Aviso Legal

Politica de privacidad

Política de Ventas y Devoluciones

