

# EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACCESOS VASCULARES PARA ENFERMERÍA (ZXV02)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA > EXPERTOS 20 ECTS EUNEIZ > ZXV02 > UNIDAD 1 > TEST UNIDAD 1

<b>Comenzado el</b>	miércoles, 4 de diciembre de 2024, 23:07
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	jueves, 5 de diciembre de 2024, 00:46
<b>Tiempo empleado</b>	1 hora 38 minutos
<b>Puntos</b>	99,00/100,00
<b>Calificación</b>	<b>9,90</b> de 10,00 (99%)
<b>Comentario -</b>	<b>APROBADO</b>

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

333.- Dentro de los catéteres venosos centrales encontramos:

Seleccione una:

- a. Catéter de Swan-Ganz.
- b. PICC.
- c. Middle line.
- d. A y B son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

415.- Forma parte de la preparación segura y limpia de medicación:

Seleccione una:

- a. Leer y revisar la prescripción médica.
- b. Higienizar y limpiar la superficie.
- c. Preparar y tener disponibles todos los materiales fungibles.
- d. Todas correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

542.- La sustancia que se suele usar para curar PICC (Peripheral Insertion Central Catheter) es:

Seleccione una:

- a. Nitrato de plata.
- b. Clorhexidina acuosa al 2%. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Efedrina 2%.
- d. Povidona yodada jabonosa siempre.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

510.- Debemos tomar las constantes:

Seleccione una:

- a. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Antes de comenzar la transfusión.
- c. A los 15 minutos de haber iniciado la transfusión.
- d. En caso de cualquier incidente y al final de la transfusión.

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

511.- La duración de la administración de una transfusión de hematíes de 200-300ml debe ser de:

Seleccione una:

- a. 30 min.
- b. 15 min.
- c. 60-120min. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. 6-10min.

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

112.- Cuantos artículos tiene esta resolución:

Seleccione una:

- a. Uno.
- b. Cuatro. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Cinco.
- d. Siete.

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

535.- La nutrición parenteral se debe almacenar en el refrigerador a una temperatura estable:

Seleccione una:

- a. De 14°-40 °C. En estas condiciones, su caducidad es de 45 días.
- b. De 24°-28 °C. En estas condiciones, su caducidad es de 35 días.
- c. De 4°-8 °C. En estas condiciones, su caducidad es de 5 días. ✓  
¡Bien, correcto!
- d. De 4°-88 °C. En estas condiciones, su caducidad es de 100 días.

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

111.- Cuantos preámbulos tiene esta resolución:

Seleccione una:

- a. I y II.
- b. I, II y III.
- c. I, II, III y IV. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. I, II, III, IV y V.

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

530.- Sobre las consideraciones específicas a tener en cuenta ante una transfusión sanguínea en neonatos:

Seleccione una:

- a. Los neonatos son menos susceptibles a las infecciones.
- b. La inmadurez del sistema cardiovascular en neonatos nunca puede afectar la capacidad de manejar cambios bruscos en el volumen sanguíneo.
- c. La anemia es poco común en neonatos prematuros.
- d. Los neonatos tienen un volumen sanguíneo relativamente pequeño en comparación con los adultos. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

527.- Son fármacos prehemostáticos: Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Vitamina K.
- b. Ácido Tranexámico.
- c. Fibrinógeno.
- d. Azul de metileno. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

308.- Señale la afirmación correcta sobre el Magnesio:

Seleccione una:

- a. Su equilibrio es de suma importancia para la función neuromuscular del organismo.
- b. Actúa directamente sobre las arterias y arteriolas periféricas, causando una caída de la resistencia periférica total.
- c. Su principal función es la de activador de multitud de sistemas enzimáticos celulares y también cabe destacar su función en el metabolismo de carbohidratos y proteínas.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

412.- Los 5 principios conocidos como los 5 correctos de la administración de medicación; señale la cierta:

Seleccione una:

- a. Fármaco correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Fármaco correcto, enfermero correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta.
- c. Fármaco correcto, paciente correcto, postura correcta, vía correcta, hora correcta.
- d. Fármaco correcto, centro correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta.

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

418.- El primero en vincular el acto de lavarse las manos con la propagación de enfermedades infecciosas fue:

Seleccione una:

- a. Eickoff.
- b. Semmelweis. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Darwin.
- d. Cardoso.

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

301.- Los órganos reguladores de la homeostasia son:

Seleccione una:

- a. Los pulmones.
- b. El corazón.
- c. Las glándulas suprarrenales.
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

315.- Señale la afirmación falsa sobre la hipocalcemia:

Seleccione una:

- a. La tetania es característica tanto en hipocalcemia como en hipomagnesemia.
- b. Dentro de las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia encontramos las convulsiones.
- c. Electrocardiográficamente un acortamiento del intervalo QT. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Puede producir "Torsades de pointes".

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

331.- Señala la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- a. 20 gotas equivalen a 1 ml.
- b. 1 gota equivale a 3 microgotas.
- c. 60 microgotas equivalen a 1 ml.
- d. 1 gota equivale a 0,5 ml. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

416.- Forman parte de la administración segura y limpia de medicación; señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Comprobar las alergias del paciente.
- b. Evitar realizar una correcta higiene de manos. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Administrar el medicamento.
- d. Identificación inequívoca del paciente.

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

120.- En que preámbulo se hace alusión a la necesidad de especialización de Enfermería en accesos vasculares:

Seleccione una:

- a. Preámbulo I.
- b. Preámbulo II. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Preámbulo III.
- d. Preámbulo IV.

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

534.- Nutrición Parenteral Periférica (NPP) está indicada cuando la persona requiere alimentación:

Seleccione una:

- a. Por un periodo inferior a 7-10 horas y/o en pacientes en los que no es posible o está indicada la NPC.
- b. Por un periodo entre 7-10 horas y/o en pacientes en los que no es posible o está indicada la NPC.
- c. Ninguna es cierta.
- d. Por un periodo superior a 7-10 días y/o en pacientes en los que no es posible o está contraindicada la NPC. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

514.- La transmisión de enfermedades infecciosas es una reacción adversa:

Seleccione una:

- a. Retardada no inmune. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Retardada e inmune.
- c. Inmediata no inmune.
- d. Inmediata inmune.

**Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

138.- Señale la afirmación falsa en los equipos de infusión y acceso vascular:

Seleccione una:

- a. Es un equipo de enfermeros y TCAES expertos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Orientado en la seguridad y la mejora de la calidad de vida del paciente.
- c. Trabaja en colaboración con un equipo multidisciplinar.
- d. Todas las opciones son falsas.

**Pregunta 22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

205.- El principal vaso de la región del cuello para la inserción de catéteres centrales es:

Seleccione una:

- a. Vena yugular externa.
- b. Vena yugular interna. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Vena vertebral.
- d. Vena temporal superficial.

**Pregunta 23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

313.- Entre las manifestaciones clínicas de la hiponatremia podemos ver:

Seleccione una:

- a. Estrechamiento y elevación de la onda T.
- b. Debilidad muscular.
- c. Poliuria.
- d. B y C son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

403.- Las grageas son comprimidos envueltos en una capa de:

Seleccione una:

- a. Fructometaxol.
- b. Triglicéridos.
- c. Fosfomaltosa.
- d. Sacarosa. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

419.- Cuando las manos presentan suciedad evidente o están contaminadas con sangre u otros fluidos corporales, se recomienda lavarlas con:

Seleccione una:

- a. Agua y jabón no antimicrobiano o agua y jabón antimicrobiano. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Agua solamente.
- c. Clorhexidina.
- d. Agua caliente y lejía.

**Pregunta 26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

319.- Entre las manifestaciones clínicas de la hipovolemia no encontramos:

Seleccione una:

- a. Hipertensión ortostática. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Pérdida de la turgencia de la piel.
- c. Pérdida brusca de peso.
- d. Debilidad muscular y calambres.

**Pregunta 27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

424.- Son especialmente propensos a experimentar los impactos negativos derivados de las incompatibilidades farmacológicas:

Seleccione una:

- a. Todas falsas.
- b. Pacientes graves de uci sometidos a una gama variada de medicamentos. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Pacientes diabéticos solamente.
- d. Pacientes nefrópatas únicamente.

**Pregunta 28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

132.- Como docente el Enfermero debe:

Seleccione una:

- a. Detectar las necesidades de aprendizaje teniendo en cuenta las posibilidades existentes. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Supervisión del cumplimiento de protocolos.
- c. Implicación en Comités de calidad.
- d. Tener un conocimiento actualizado.

**Pregunta 29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

103.-Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- a. En 1582 John Lumley donó al Royal College of Physicians los fondos necesarios para contratar un Profesor de Anatomía.
- b. En 1628, en la cuarta lectura del Lumleian, William Harvey describe la circulación arteriovenosa sistémica.
- c. En 1924 se tuvo conocimiento de que el médico de Damasco Ibn an Nafis (1213- 1288) ya había publicado el descubrimiento de la circulación arteriovenosa pulmonar.
- d. Todas las afirmaciones son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

214.- Respecto a los compartimentos vasculares del cuello no es cierto que:

Seleccione una:

- a. Se localizan a ambos lados del cuello.
- b. Sólo albergan los vasos sanguíneos que pasan por esta zona. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Albergan el nervio Vago.
- d. Los compartimentos vasculares albergan los vasos sanguíneos y el nervio Vago.

**Pregunta 31**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

305.- Si decimos “cuando aumenta la presión osmótica, las neuronas se deshidratan liberando impulsos a la hipófisis, produciendo la liberación de la hormona antidiurética”, hablamos de:

Seleccione una:

- a. Osmorreceptores. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Hormona antidiurética.
- c. Sistema renina-angiotensina.
- d. Barorreceptores.

**Pregunta 32**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

306.- Los Barorreceptores:

Seleccione una:

- a. Cuando aumenta la liberación de renina, es liberada la aldosterona, disminuyendo el sodio sérico y aumentando el potasio.
- b. Regulan el volumen circulante, así como la actividad neural del sistema nervioso simpático, parasimpático y actividades endocrinas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Regulan la sed, así como la concentración de sodio y el consumo oral de líquidos.
- d. El sistema es opuesto al renina-angiotensina-aldosterona.

**Pregunta 33**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

314.- Cual es el motivo principal de la hipopotasemia:

Seleccione una:

- a. Los sistemas de diálisis.
- b. Las pérdidas intestinales mediante el vómito, aspiración gástrica o diarrea. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Uso excesivo de bicarbonato de sodio.
- d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 34**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

553.- Señale cuál de los siguientes no es antídoto de citostáticos:

Seleccione una:

- a. Metamizol. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Tiosulfato de sodio.
- c. Hialuronidasa.
- d. Dimetilsulfóxido.

**Pregunta 35**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

512.- Son consideraciones a tener en cuenta respecto de la transfusión:

Seleccione una:

- a. En caso de transfundir a través de catéter de doble luz, se hará por la luz distal.
- b. Evitar administrar fármacos o sueros simultáneamente con hemoderivados, excepto suero fisiológico que es el único compatible.   
✓ ¡Bien, correcto!
- c. Si el paciente tiene instaurado un catéter venoso, no lavar la vía ni antes ni después de la administración.
- d. Cambiar el sistema con cada unidad transfundida, no debiendo permanecer más de 34 horas.

**Pregunta 36**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

115.- Que guía establece el marco conceptual para conseguir que el rigor científico en indicaciones clínicas y los tipos de dispositivos utilizados sean adecuados.

Seleccione una:

- a. RNAO.
- b. CDC.
- c. MAGIC.   
✓ ¡Bien, correcto!
- d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 37**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

140.- Señala la afirmación correcta en la evidencia respecto a equipos de expertos en accesos vasculares:

Seleccione una:

- a. Según una revisión de Chocrane se define equipo de expertos en accesos vasculares (EIAV) como el grupo de personal de asistencia sanitaria que tiene conocimiento y aptitudes avanzadas en la evaluación, inserción y tratamiento de los dispositivos de acceso vascular y equipos de infusión intravenosa de tratamientos.
- b. Las tasas identificadas del fracaso del primer intento de inserción periférica son de un 12% a un 26% en adultos y de un 24% a un 54% en los niños.
- c. Según el Estudio Nacional de Efectos Adversos (ENEAS), la incidencia de pacientes con efectos adversos relacionados con la asistencia hospitalaria es del 8,4%, de los cuales el 25,34% de las infecciones habían sido desarrolladas en el hospital.
- d. Todas son correctas.   
✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 38**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

137.- Cuando decimos que el programa es "Sugerido para la implementación y respaldado por estudios clínicos o epidemiológicos o una justificación teórica" hablamos de:

Seleccione una:

- a. Categoría I.
- b. Categoría II. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Categoría III.
- d. Categoría IV.

**Pregunta 39**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

337.- ¿Qué catéter contiene el manguito dracon a 1 cm de la salida?

Seleccione una:

- a. Hickman. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. PICC.
- c. Línea media.
- d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 40**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

429.- En un catéter central de tres luces tiene el mayor calibre la luz:

Seleccione una:

- a. Proximal.
- b. Medial.
- c. Distal ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Inicial.

**Pregunta 41**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

110.- En que resolución de los Colegios de Enfermería se ordenan determinados aspectos del ejercicio profesional de Enfermero/a, Experto/a en el ámbito de los cuidados de accesos vasculares.

Seleccione una:

- a. 12/2018, de 18 de diciembre de 2018.
- b. 12/2019, de 18 de diciembre de 2019. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 14/2019, de 18 de diciembre de 2019.
- d. 14/2018, de 18 de diciembre de 2018.

**Pregunta 42**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

202.- Diferenciamos 3 grandes regiones anatómicas para la inserción de catéteres venosos centrales que son:

Seleccione una:

- a. Axila, tórax y cuello. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Brazos, tórax y cuello.
- c. Miembros inferiores, axila y cuello.
- d. Miembros inferiores, brazos y tórax

**Pregunta 43**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

544.- La recomendación sobre el tiempo que se debe usar el mismo par de guantes es de:

Seleccione una:

- a. 30 minutos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. 24 horas.
- c. 2 horas.
- d. 5 minutos.

**Pregunta 44**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

409.- Sobre la vía intravenosa, señale la cierta:

Seleccione una:

- a. No podemos mantener una vigilancia de los niveles en sangre del fármaco.
- b. Siempre existe proceso de absorción del fármaco.
- c. La concentración del fármaco para producir el efecto deseado se producirá lentamente.
- d. La administración del principio activo es directamente en el torrente sanguíneo. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 45**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

426.- Dentro de las categorías de fármacos más empleados en las unidades de cuidados intensivos se incluyen los medicamentos:

Seleccione una:

- a. Vasoactivos.
- b. Sedantes.
- c. Analgésicos.
- d. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 46**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

131.- Dentro de la función investigadora que actuación se plantea:

Seleccione una:

- a. Implicación en Comités de calidad.
- b. Tener un conocimiento actualizado. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Conocer la farmacología aplicada.
- d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 47**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

421.- Optar por la anticoagulación en lugar de la salinización en los accesos venosos provoca ventajas como:

Seleccione una:

- a. Aumenta el riesgo de formación de coágulos y redes de fibrina.
- b. Prevención de infecciones secundarias. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Mayor carga de trabajo.
- d. Menor comodidad y seguridad del paciente.

**Pregunta 48**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

551.- Cuando se sospecha de la extravasación de un fármaco irritante: Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Detener la infusión inmediatamente.
- b. Localizar el botiquín de extravasación.
- c. Retirar el catéter inmediatamente. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Administrar antídoto local a través del catéter si procede.

**Pregunta 49**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

323.- Entre los síntomas de la hipervolemia encontramos.

Seleccione una:

- a. Bradicardia.
- b. Ingurgitación yugular. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Disminución de la PVC.
- d. Piel fría.

**Pregunta 50**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

524.- La hemorragia masiva implica una pérdida de volemia de aproximadamente:

Seleccione una:

- a. El 1 % del peso ideal de un adulto en 24 horas.
- b. El 7 % del peso ideal de un adulto en 24 horas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. El 3 % del peso ideal de un adulto en 24 horas.
- d. El 2 % del peso ideal de un adulto en 24 horas.

**Pregunta 51**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

422.- La anticoagulación de las vías venosas se llevará a cabo:

Seleccione una:

- a. Cada 24 horas y hasta cuatro veces al día si es necesario por la administración de medicación. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Hasta nueve veces al día si es necesario por la administración de medicación.
- c. Hasta doce veces al día si es necesario por la administración de medicación.
- d. Todas ciertas.

**Pregunta 52**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

411.- Sobre la vía rectal:

Seleccione una:

- a. Nunca es vía alternativa cuando la vía oral no sea posible.
- b. La absorción es más lenta que por vía oral.
- c. La absorción es regular y completa.
- d. La absorción es irregular e incompleta. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 53**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

108.- Señale la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- a. En 1935 se procedió a la canalización de la primera vía central ✓ ¡Bien, correcto!
- b. En 1952 se difundió la punción de venas de mayor calibre que llevaron a poder administrar mayores cantidades de glucosa y aminoácidos.
- c. En 1959 Moore publica el uso de la cava superior para la infusión de grandes concentraciones de glucosa.
- d. Durante las Grandes Guerras se comenzó a utilizar la vía intravenosa para la administración de tiopental.

**Pregunta 54**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

549.- Son recomendaciones para el estreñimiento de pacientes tratados con quimioterapia:

Seleccione una:

- a. Hacer ejercicio diariamente como andar.
- b. Aumentar ingesta de líquidos.
- c. Alimentos ricos en fibra.
- d. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 55**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

119.- Dentro de las reglas a la hora de la administración de la medicación intravenosa no encontramos:

Seleccione una:

- a. Asegurarse de administrar los fármacos juntos en la misma infusión. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Asegurarse de administrar la dosis correcta en cada momento.
- c. Asegurarse de administrar la medicación a la hora correcta.
- d. Asegurarse de administrar la medicación por la vía correcta.

**Pregunta 56**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

531.- Los sistemas de hemovigilancia abarcan:

Seleccione una:

- a. Sólo la donación de sangre.
- b. Desde la donación de sangre hasta el cuidado post-transfusional del paciente. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Sólo el cuidado post-transfusional del paciente.
- d. No abarcan función alguna hasta que se anula la transfusión.

**Pregunta 57**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

408.- Sobre la vía intramuscular, señale la cierta:

Seleccione una:

- a. Nunca podremos utilizar la cara lateral externa del cuádriceps y el deltoides.
- b. Es más rápida que la vía subcutánea. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. El principal punto de punción es el glúteo menor en su cuadrante superior interno.
- d. La administración del fármaco es directamente en el tejido epidérmico.

**Pregunta 58**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

332.- Si tienes que infundir 1000 ml en 24 horas ¿Qué velocidad de infusión usarías?:

Seleccione una:

- a. 20,83 ml/h
- b. 40,8 microgotas/min. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 6,9 gotas/min.
- d. 3,5 gotas/min.

**Pregunta 59**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

104.- Señale el autor al que se debe el comienzo de la terapia intravenosa en humanos:

Seleccione una:

- a. Dr. Tomas Latta.
- b. Ibn an Nafis.
- c. Johann Daniel Mayor. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. John Lumley.

**Pregunta 60**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

206.- La vena yugular interna se forma en:

Seleccione una:

- a. Se forma en el extremo proximal del músculo esternocleidohioideo.
- b. Se forma por la dilatación del cartilago tiroides.
- c. Se forma por la dilatación de la vena subclavia.
- d. Se forma por la dilatación del seno sigmoideo. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 61**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

401.- Si la sustancia produce un efecto favorable para el organismo, estaremos hablando de:

Seleccione una:

- a. Neutro.
- b. Fármaco. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Tóxico.
- d. Todas falsas.

**Pregunta 62**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

109.- La vía intravenosa está indicada en, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Administración de quimioterapia.
- b. Necesidad de distribución rápida de un medicamento por todo el organismo.
- c. Perfusión de sangre o hemoderivados.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 63**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

114.- Que guías recomiendan la disponibilidad de este tipo de terapias y dispositivos:

Seleccione una:

- a. RNAO.
- b. CDC.
- c. ERC.
- d. A y B son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 64**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

106.- Que científico realizó estudios con azúcar en animales y provocó que la vía intravenosa fuera propuesta como técnica para fines nutritivos:

Seleccione una:

- a. Alexander Wood.
- b. Charles Gabriel Pravaz.
- c. Claude Bernard. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Semmellweiss.

**Pregunta 65**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

515.- Ante las reacciones transfusionales agudas actuaremos de la siguiente forma:

Seleccione una:

- a. Es preciso no tomar y anotar las constantes del paciente.
- b. No es necesario registrar correctamente todo el proceso en la historia clínica del paciente.
- c. Evitar enviar al banco de sangre debidamente cumplimentada la hoja de notificación de reacción transfusional.
- d. Suspender inmediatamente la transfusión en el caso de aparición de fiebre o tiritonas, disnea, urticaria grave, náuseas, vómitos. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 66**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

310.- Sobre el potasio podemos decir:

Seleccione una:

- a. Un 98% del potasio total de nuestro cuerpo se encuentra en el exterior de nuestras células.
- b. La concentración de potasio en el líquido extracelular es de 5,5 mEq/L.
- c. El potasio está estrechamente ligado a la función renal, ya que alrededor de un 80% es excretado diariamente por vía renal mientras que el 20% restante se excreta por heces y sudor. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. 65-70 mEq del total del potasio corporal se encuentra dentro de la célula.

**Pregunta 67**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

311.- Su función principal es la distribución de agua en el cuerpo:

Seleccione una:

- a. Magnesio.
- b. Sodio. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Calcio.
- d. Potasio.

**Pregunta 68**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

532.- Son metas de la hemovigilancia:

Seleccione una:

- a. Prevención de eventos adversos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Abandono de la calidad.
- c. Ausencia de educación.
- d. Carencia de entrenamiento.

**Pregunta 69**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

304.- Qué glándula segrega la hormona antidiurética:

Seleccione una:

- a. Las glándulas suprarrenales.
- b. Las glándulas paratiroides.
- c. La hipófisis. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. La glándula tiroidea.

**Pregunta 70**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

334.- De los catéteres venosos centrales, el más utilizado es:

Seleccione una:

- a. Catéter venoso no tunelizado. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Catéter venoso tunelizado.
- c. Catéter venoso implantado.
- d. Catéter venoso central de inserción periférica.

**Pregunta 71**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

113.- En el preámbulo I de la resolución que ordena el ejercicio profesional de enfermero en el ámbito de los cuidados de accesos vasculares:

Seleccione una:

- a. Se define los cuidados en accesos vasculares como uno de los más comunes en el ámbito de la actividad profesional de la Enfermería, tanto hospitalaria como en Primaria, ligada a la atención de cuadros clínicos en la aplicación de terapias concretas.
- b. Determina las indicaciones para el uso de la vía intravenosa.
- c. Especifica la necesidad de que los profesionales de Enfermería estén implicados en este tipo de terapias debido a las grandes consecuencias que sobre los pacientes se pueden tener.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 72**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

335.- Entre los usos del Catéter venoso central no tunelizado encontramos:

Seleccione una:

- a. La medición de la presión venosa central (PVC).
- b. Infusión simultánea de múltiples medicamentos, drogas vasoactivas, quimioterápicos.
- c. Administración de nutrición parenteral.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 73**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

505.- La prueba de antiglobulina cruzada (Coombs indirecta) se realiza con el propósito de detectar:

Seleccione una:

- a. Todas ciertas.
- b. Posibles anticuerpos anormales en el suero del donante que puedan reaccionar con las plaquetas del donante.
- c. Posibles anticuerpos anormales en el suero del receptor que puedan reaccionar con los glóbulos rojos del donante. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Posibles antígenos normales en el suero del donante que puedan reaccionar con los glóbulos blancos del donante.

**Pregunta 74**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

321.- En la hipervolemia:

Seleccione una:

- a. Entre los factores causantes del exceso de volumen de líquidos, se encuentran la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia renal y la cirrosis hepática.
- b. Es producido por un aumento del contenido de sodio que se traduce en un aumento del contenido total de agua total.
- c. A y B son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son incorrectas.

**Pregunta 75**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

121.- En qué preámbulo se describen las competencias mínimas que la Enfermería debe tener sobre la base de sus conocimientos y capacidades adquiridas:

Seleccione una:

- a. Preámbulo I.
- b. Preámbulo II.
- c. Preámbulo III. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Preámbulo IV.

**Pregunta 76**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

540.- El síndrome de realimentación (Síndrome de Refeeding):

Seleccione una:

- a. Puede producirse cuando se inicia la NP demasiado rápido en pacientes que están severamente desnutridos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Siempre se produce cuando se inicia la NP demasiado lento en pacientes que están severamente nutridos.
- c. Se caracteriza por cambios leves en electrolitos y fluidos, pero no disfunción de órganos.
- d. Nunca afecta a electrolitos y fluidos.

**Pregunta 77**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

555.- La diarrea se asocia al tratamiento citostático cuando:

Seleccione una:

- a. Existen 3 evacuaciones semiblandas en las 24 horas siguientes a la administración de quimioterapia sin dolor cólico y sin distensión abdominal.
- b. Existen 3 ó más evacuaciones normales en las 24 horas anteriores a la administración de quimioterapia y acompañada de dolor cólico sin distensión abdominal.
- c. Existen 3 ó más evacuaciones líquidas en las 24 horas siguientes a la administración de quimioterapia y acompañada de dolor cólico y distensión abdominal. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Existen 1 ó 2 evacuaciones líquidas en las 24 horas siguientes a la administración de quimioterapia y acompañada de dolor cólico y distensión abdominal.

**Pregunta 78**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

122.- Dentro de las competencias mínimas que la Enfermería debe tener en accesos vasculares no encontramos:

Seleccione una:

- a. Competencia en el diagnóstico de modo independiente de cuidados enfermeros que se necesitan. Deben de emplear los conocimientos teóricos y clínicos. También deben programar, organizar y administrar estos cuidados.
- b. Competencia en la colaboración con otros integrantes sanitarios, con participación en la formación de personal sanitario.
- c. Competencia para quitar toda la responsabilidad de los cuidados a personas y familias implicados. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Competencia para tomar medidas independientemente con relación al mantenimiento de la vida y situaciones de crisis o catástrofes.

**Pregunta 79**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

518.- Ante una reacción alérgica transfusional:

Seleccione una:

- a. Administrar antihistamínicos V.O en el caso de reacción urticariforme, si cede el cuadro en pocas horas se puede continuar con la transfusión.
- b. Administrar antihistamínicos IV en el caso de reacción urticariforme, si cede el cuadro en pocos minutos se puede continuar con la transfusión. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Administrar antihistamínicos IV en el caso de reacción urticariforme, si cede el cuadro en pocos minutos nunca se puede continuar con la transfusión.
- d. Todas falsas.

**Pregunta 80**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

320.- Cual de los siguientes desequilibrios electrolíticos sucede en la insuficiencia suprarrenal:

Seleccione una:

- a. Hipocalcemia. ✗ Mal, debes repasar un poco
- b. Hipercalcemia.
- c. Hiponatremia.
- d. Hipernatremia.

**Pregunta 81**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

105.- Quien recibió el Premio Nobel de Medicina por conseguir el primer cateterismo de cavidades derechas en una persona:

Seleccione una:

- a. Werner Forssmann. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Charles Gabriel Pravaz.
- c. Claude Bernard.
- d. Semmellweiss.

**Pregunta 82**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

208.- Para la inserción de catéteres arteriales la arteria más frecuentemente utilizada por su fácil accesibilidad:

Seleccione una:

- a. Arteria cubital
- b. Arteria radial. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Arteria femoral.
- d. Arteria cubital.

**Pregunta 83**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

210.- Es cierto respecto a la inserción de catéteres arteriales que la arteria femoral:

Seleccione una:

- a. La canalización la conlleva un facultativo.
- b. La arteria femoral no es utilizada para la inserción de catéteres arteriales.
- c. Conlleva un riesgo muy alto de: hemorragia, hematomas, infección e isquemia.
- d. "a" y "c" son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 84**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

338.- ¿Qué afirmación es correcta en referente a los PICC?

Seleccione una:

- a. Son catéteres tunelizados de inserción percutánea.
- b. La vena de elección es la mediana antecubital.
- c. Se requiere de ecoguía para su inserción. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son correctas.

**Pregunta 85**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

102.- Que autor empleó por primera vez la palabra circulación para describir que la sangre regresaba al punto de partida:

Seleccione una:

- a. Andrea Cesalpino. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Miguel Servet.
- c. John Lumley.
- d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 86**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

427.- Los errores en la administración de medicamentos en la UCI pueden atribuirse a:

Seleccione una:

- a. Prescripciones de dosis expresadas en unidades de medida diferentes.
- b. Elevada cantidad de medicamentos que deben administrarse a cada paciente.
- c. Utilización de medicamentos de alto riesgo.
- d. Ninguna es falsa. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 87**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

513.- No debemos calentar la sangre a más de:

Seleccione una:

- a. 12°C
- b. 37°C. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 73°C
- d. Todas falsas.

**Pregunta 88**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

410.- Sobre la vía inhalatoria, es falso que:

Seleccione una:

- a. Es muy dolorosa. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Se requieren dosis pequeñas del fármaco.
- c. Los efectos aparecen muy rápidamente.
- d. No tiene efecto sistémico.

**Pregunta 89**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

127.- El marco de actuación viene recogido en:

Seleccione una:

- a. Artículo 1.
- b. Artículo 2.
- c. Artículo 3. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Artículo 4.

**Pregunta 90**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

541.- El PICC (Peripheral Insertion Central Catheter):

Seleccione una:

- a. Tras su colocación, la primera cura se realiza a los 7 días siempre.
- b. Tras su colocación, la primera cura se realiza a las 2 horas para valorar el estado del catéter.
- c. Tras su colocación, la primera cura se realiza a las 24 horas para valorar el estado del catéter. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Ninguna es cierta.

**Pregunta 91**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

548.- La mucositis de pacientes con quimioterapia:

Seleccione una:

- a. Suele aparecer el primer día.
- b. Suele aparecer a los 7-14 días y su duración media es dos semanas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Suele aparecer a los 3-4 días y su duración media es dos meses.
- d. c. Suele aparecer a los 3-4 meses y su duración media es de seis meses.

**Pregunta 92**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

212.- Respecto a la vena cefálica señale la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se origina en la fosa del codo. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Se origina en la tabaquera anatómica.
- c. Ascende por la superficie anterolateral hasta cruzar el codo.
- d. Alcanza la vena axilar.

**Pregunta 93**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

324.- El objetivo principal es la reposición del líquido del interior de la célula. Hablamos de:

Seleccione una:

- a. Soluciones hipertónicas.
- b. Soluciones Acidificantes.
- c. Soluciones Hipotónicas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Soluciones Alcalinizantes.

**Pregunta 94**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

318.- Sobre la hipovolemia:

Seleccione una:

- a. Esta sucede cuando se excreta un volumen mayor de líquido extracelular que los líquidos que se ingresan.
- b. Se define como la pérdida de agua y electrolitos en la misma proporción que están presentes en los líquidos corporales.
- c. La formación de un tercer espacio (edema), en quemaduras o ascitis, también produce o provoca un déficit de volumen de líquidos.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 95**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

517.- Ante el edema pulmonar no cardiogénico:

Seleccione una:

- a. Nunca tomar muestras para el diagnóstico.
- b. Administrar oxigenoterapia y esteroides. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. No precisa descartar causas cardiogénicas del edema.
- d. Todas falsas.

**Pregunta 96**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

211.- La cavidad torácica, está rodeada por la pared del tórax y el diafragma donde encontramos 3 cavidades que son:

Seleccione una:

- a. Cavidad pleural derecha, izquierda y cavidad media.
- b. Cavidad pleural derecha, izquierda y diafragma.
- c. Cavidad pleural derecha, izquierda y mediastino. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Cavidad pleural, mediastino y corazón.

**Pregunta 97**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

130.- Aplicar las guías de práctica clínica previo conocimiento y estudio de las mismas, se encuentra dentro de la función enfermera de:

Seleccione una:

- a. Gestora. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Investigadora.
- c. Docente.
- d. Asistencial.

**Pregunta 98**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

538.- La prevención de la embolia como complicación, se evita colocando al paciente en:

Seleccione una:

- a. Posición de Roser unos 30°.
- b. Posición de Trendelenburg de unos 20°. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Posición de SIMS de unos 80°.
- d. Posición de Antitrendelenburg de unos 60°.

**Pregunta 99**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

118.- Dentro de las contraindicaciones para la inserción de PICC encontramos:

Seleccione una:

- a. Pacientes con enfermedad renal avanzada que puedan ser infundidos por una vía periférica.
- b. Infusiones de cuidados paliativos en situaciones de final de vida. ✓  
¡Bien, correcto!
- c. Flebotomías no frecuentes.
- d. Obtención de muestras sanguíneas.

**Pregunta 100**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

328.- Dentro de las soluciones coloides encontramos.

Seleccione una:

- a. Albúminas.
- b. Dextranos.
- c. Hidroxietilalmidón.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!