

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACCESOS VASCULARES PARA ENFERMERÍA (ZXV02)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA > EXPERTOS 20 ECTS EUNEIZ > ZXV02 > UNIDAD 3 > TEST UNIDAD 3

Comenzado el domingo, 8 de diciembre de 2024, 08:53

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 8 de diciembre de 2024, 18:08

Tiempo empleado 9 horas 14 minutos

Puntos 82,00/100,00

Calificación 8,20 de 10,00 (82%)

Comentario - APROBADO

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1330.- Pasadas cuantas horas es recomendable retirar aquellos catéteres que han sido insertados de manera urgente por su alta posibilidad de infección:

Seleccione una:

- a. 24h
- b. 48h ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 72h
- d. 18-24h

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1536.- La vía venosa periférica si no se utiliza está recomendado:

Seleccione una:

- a. Heparinizar con 10 cc de heparina 20 ui/ml.
- b. Heparinizar con 5 cc de heparina al 2%.
- c. Salinizar con 10 cc de suero fisiológico. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Heparinizar con 3 cc de heparina al 5%.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1406.- Dentro de los pasos en el procedimiento de retirada de acceso venoso periférico no encontramos:

Seleccione una:

- a. Cerrar todos los sistemas de infusión.
- b. En caso necesario coger muestra del exudado alrededor del punto de inserción con la torunda, para seguidamente aplicar clorhexidina alcohólica al 2% y dejar secar. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Una vez secada la clorhexidina, proceder a la retira del acceso venoso periférico, traccionando del mismo de manera suave y progresiva colocando una gasa estéril sobre la zona de inserción para proceder a digito presión durante 5 minutos, si el paciente tuviese algún tipo de coagulopatía o tratamiento anticoagulante se deberá hacer dicha presión durante al menos 10 minutos.
- d. Aplicar un apósito oclusivo sobre la zona donde se localizaba la vía venosa periférica.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1208.- ¿Cuál de estas afirmaciones forma parte de los 10 correctos de la administración de la medicación?

Seleccione una:

- a. Paciente correcto
- b. Hora correcta
- c. Comprobar la fecha de caducidad.
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1339.- Cuando se retire cualquier tipo de catéter a un paciente es muy importante:

Seleccione una:

- a. Observar la integridad del mismo
- b. Registrar la fecha
- c. Registrar la hora
- d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1402.- Señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. El deterioro del catéter es una indicación de la retirada de este.
- b. Si se sospecha de infección del catéter hay que mandar la punta de este a cultivar.
- c. A y B son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son incorrectas.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1538.- Respecto al catéter venoso central en vena subclavia no es cierto que:

Seleccione una:

- a. Cómoda para el paciente.
- b. Reservada para casos en los que otras vías no sean factibles. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Contraindicada en coagulopatías.
- d. Menos riesgo de infección.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1518.- En los cuidados del catéter venoso central utilizaremos apósito de gasa:

Seleccione una:

- a. Nunca, todas las guías de práctica clínica recomiendan apósitos transparentes.
- b. En caso de que el punto de punción presente hemorragia.
- c. En caso de exceso de sudoración del enfermo.
- d. "b" y "c" son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1311.- Señala cuales se identificar como bacteriemia:

Seleccione una:

- a. Bacteriemia relacionada con el catéter.
- b. Bacteriemia primaria
- c. Bacteriemia relacionada con infusiones
- d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1521.- Respecto al lavado del catéter venoso central no es cierto que:

Seleccione una:

- a. El catéter debe lavarse con Suero Fisiológico estéril previa y posteriormente a la administración de medicación.
- b. El lavado y sellado deben realizarse asegurando una técnica de presión positiva.
- c. La mínima cantidad de Suero Fisiológico para el lavado de CVC será el doble del volumen de cebado del catéter (+/- 5 ml).
- d. Solo se recomienda la técnica de presión positiva en el sellado. ✓
¡Bien, correcto!

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1257.- ¿Qué escala se debe de usar para valorar los síntomas y signos asociados a la flebitis?

Seleccione una:

- a. EVA
- b. Glasgow
- c. VIP ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son correctas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1530.- En relación a los cuidados del catéter arterial no es necesario:

Seleccione una:

- a. Vigilar signos locales y sistémicos de infección y cambiar si se observan estos.
- b. Vigilar que la circulación en la extremidad distal al punto de inserción sea adecuada.
- c. Comprobar la piel de la zona de punción en busca de signos de palidez, cianosis o induración.
- d. Retirar apósito con guantes estériles. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1304.- Señala la opción correcta

Seleccione una:

- a. Se entiende flebitis a la inflamación de la pared de la vena debido a la alteración endotelial ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Se entiende flebitis a la inflamación de la pared de la arteria debido a la alteración endotelial
- c. Se entiende flebitis a la disminución de la pared de la arteria debido a la alteración endotelial
- d. Se entiende flebitis a la disminución de la pared de la vena debido a la alteración endotelial

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1331.- Valoraremos la posibilidad de canalizar una línea media o catéter centra de inserción periférica si el tratamiento es superior a:

Seleccione una:

- a. 6 días
- b. 7 días
- c. 10 días ✗ Mal, debes repasar un poco
- d. 2 semanas

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1531.- En el manejo de accesos venosos el uso de guantes está recomendado:

Seleccione una:

- a. Siempre. ✗ Mal, debes repasar un poco
- b. Solo durante la inserción.
- c. No es necesario para cambiar un suero, sí la higiene de manos.
- d. En la retirada no es necesario guantes.

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1248.- Para ajustar la longitud del PICC.....se puede

Seleccione una:

- a. Cortar en el extremo distal
- b. Cortar en el extremo proximal
- c. A y B son ciertas
- d. Todas son falsas ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1416.- En los materiales para la retirada del acceso venoso central se encuentra:

Seleccione una:

- a. Marquesita estéril y/o torunda estéril para el envío de muestra en caso necesario.
- b. Clorhexidina acuosa al 2%*.
- c. Apósito oclusivo.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1532.- En pacientes con catéteres arteriales respecto al diagnóstico enfermero Riesgo de infección y en relación a la NIC "Control de infecciones" incluiremos actividades, excepto:

Seleccione una:

- a. Vigilar de cerca al paciente para detectar signos y síntomas de hemorragia interna y externa.
- b. Utilizar jabón antimicrobiano para el lavado de manos que sea apropiado.
- c. Limpiar la piel con un agente antibacteriano apropiado. ✗ Mal, debes repasar un poco
- d. Mantener un sistema cerrado mientras se realiza la monitorización hemodinámica invasiva.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1201.- ¿Cuál es un uso de la terapia intravenosa en niños?

Seleccione una:

- a. Administración de nutrición
- b. Administración de fármacos
- c. Administración de enemas
- d. A y B son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1232.- Con respecto a los catéteres de tipo midline.....(señalar la correcta)

Seleccione una:

- a. La cánula puede oscilar de 14 a 21 G.
- b. La longitud varia de 6 a 28 cm
- c. Se recomiendan para terapia de más de 7 días que no sean irritativas
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1227.- En caso de mayores de 16 años o menores emancipados, el consentimiento informado lo firmará....

Seleccione una:

- a. Los padres
- b. Los padres escuchando al menor
- c. La persona por sí misma ✓ ¡Bien, correcto!
- d. El médico, pues es el que sabe el procedimiento

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1327.- Se debe evitar realizar la punción en la cara interna de la muñeca debido al elevado riesgo de punción de la arteria:

Seleccione una:

- a. Cubital
- b. Radial
- c. Yugular
- d. A y B son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1503.- Uno de los diagnósticos más utilizados en personas que tienen insertado un catéter corto periférico es:

Seleccione una:

- a. Riesgo de lesión.
- b. Riesgo de infección. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Exceso de volumen de líquidos.
- d. Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1540.- Entre los cuidados del catéter venoso central está recomendado:

Seleccione una:

- a. Utilizar catéteres del mayor número de luces posible.
- b. Vigilar cada 48 h el punto de inserción.
- c. Si el apósito es transparente cambiar cada 48 h.
- d. Si tiene Nutrición Parenteral Total (NPT) dejar una luz en exclusiva para su uso. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1219.- ¿Qué indicación tiene el catéter arterial?

Seleccione una:

- a. Duración máxima de 7 días
- b. Indicado en prematuros de más de 1500 gr
- c. Extracción de gases
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!