

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACCESOS VASCULARES PARA ENFERMERÍA (ZXV02)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA > EXPERTOS 20 ECTS EUNEIZ > ZXV02 > UNIDAD 2 > TEST UNIDAD 2

| | |
|------------------------|--|
| Comenzado el | domingo, 8 de diciembre de 2024, 18:25 |
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | domingo, 8 de diciembre de 2024, 20:38 |
| Tiempo empleado | 2 horas 12 minutos |
| Puntos | 93,00/100,00 |
| Calificación | 9,30 de 10,00 (93%) |
| Comentario - | APROBADO |

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

737.- Respecto al procedimiento para limpiar el aparataje, señala la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Limpieza del monitor y pantalla táctil del ecógrafo
- b. Limpieza de la membrana del transductor
- c. No frotar enérgicamente
- d. Utilizar alcohol para desinfectar ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

909.- Es fundamental comprender que en la canalización de vía periférica o línea media:

Seleccione una:

- a. No influye la elección de técnica adecuada.
- b. No requiere mantenimiento.
- c. Es indiferente la educación y actualización.
- d. Sea una inserción aséptica. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

950.- La presencia de coagulopatías congénitas o adquiridas puede incrementar el riesgo de trombosis asociada a catéteres venosos periféricos hasta:

Seleccione una:

- a. 9 veces.
- b. 4 veces. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 10 veces.
- d. 43 veces.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

728.- Señala la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Las estructuras que se encuentran más superficialmente ubicadas, son las que van a estar más cerca y próximas al transductor ✓
¡Bien, correcto!
- b. Las estructuras que se encuentran más profundas ubicadas, son las que van a estar más lejos y próximas al transductor
- c. Las estructuras que se encuentran más superficialmente ubicadas, son las que van a estar más cerca y distales al transductor
- d. Las estructuras que se encuentran más profundas ubicadas, son las que van a estar más cerca y próximas al transductor

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

808.- Las principales diferencias para identificar una vena y una arteria son:

Seleccione una:

- a. En la vena la pared es fina, ocasionalmente son pulsátiles, se comprimen y se visualizan válvulas mientras que la arteria tiene una pared más gruesa, pulsátiles y no se comprimen fácilmente ✓ ¡Bien, correcto!
- b. En la vena la pared es gruesa, ocasionalmente son pulsátiles, se comprimen y se visualizan válvulas mientras que la arteria tiene una pared más fina, pulsátiles y no se comprimen fácilmente
- c. En la vena la pared es fina, son pulsátiles, se comprimen y se visualizan válvulas mientras que la arteria tiene una pared más gruesa, ocasionalmente pulsátiles y no se comprimen fácilmente
- d. Todas son falsas

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

814.- En el ecógrafo, una vez seleccionada la profundidad, ¿qué campo máximo examinará?

Seleccione una:

- a. 7cm
- b. 8cm ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 9cm
- d. 10cm

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

946.- Antes de "Flebitis Zero" tradicionalmente, se ha considerado una tasa de flebitis estándar aceptable:

Seleccione una:

- a. A partir del 17%.
- b. De hasta el 50%.
- c. De hasta el 25%.
- d. De hasta el 5%. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

837.- Para comprobar el alojamiento de la punta del catéter, cada vez está más desaconsejado por las repercusiones tan negativas para el ser humano; hacemos referencia a:

Seleccione una:

- a. Ecografía
- b. Radiografía ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Electrocardiograma intracavitario
- d. Tac

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

937.- El método más preciso para controlar el flujo es:

Seleccione una:

- a. Sistema de gotero.
- b. Manguito de infusión a presión.
- c. Bomba de infusión. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Regulador de flujo.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1006.- Entre las contraindicaciones absolutas de vía intraósea encontramos:

Seleccione una:

- a. Osteoporosis.
- b. Incapacidad de encontrar sitio de punción. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Hueso con un intento previo de canalización intraósea (24-48 horas previas), sin incluir las tentativas previas.
- d. Tumores óseos.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

948.- Ante cualquier vía periférica se deben monitorizar los siguientes signos de alarma:

Seleccione una:

- a. Eritema, tumefacción, induración de la zona.
- b. Extravasación visible de fluido hacia tejidos próximos.
- c. Dolor intenso, escozor o ardor en el punto de punción.
- d. Todas correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1142.- Se define como la variación del volumen sistólico expresada en porcentaje, calculada durante un período de 30 segundos, que proporciona una estimación aproximada de la volemia.

Seleccione una:

- a. Fracción de eyección global
- b. Permeabilidad Vascular Pulmonar
- c. Variación del volumen sistólico ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son ciertas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

735.- Tras realizar un corte transversal, podemos observar:

Seleccione una:

- a. En la parte más superior se podrá observar la parte anterior de la persona estudiada
- b. En la parte más inferior se observará la parte posterior del paciente
- c. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son falsas

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

734.- La imagen de que plano va a ser similar a la que se obtiene en una tomografía axial computarizada:

Seleccione una:

- a. Plano transversal ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Plano longitudinal
- c. Plano oblicuo
- d. Plano transverso

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1027.- En la técnica de inserción con B.I.G. (Bone injection gun) es cierto que:

Seleccione una:

- a. Comprobar la inserción aspirando médula o introduciendo un bolo de suero de 10-20 ml de suero en adultos y con 10-15 ml en niños durante 5 segundos.
- b. Coloque la extremidad seleccionada sobre una superficie lisa y firme, y en una ligera rotación hacia dentro.
- c. Después de completar la punción intraósea, retire la pistola con precaución para no mover la aguja. Luego, retire el mandril de la aguja. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Utilizando la mano no dominante, retire el pasador de seguridad mientras mantiene la pistola en su lugar con la otra mano sin aplicar presión.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1003.- Podemos considerar que las ventajas más destacadas de la vía intraósea son las siguientes:

Seleccione una:

- a. Rapidez en la canalización.
- b. Seguridad de colocación.
- c. Facilidad en reconocer las referencias anatómicas.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1144.- Que patologías pueden dar lugar a medidas incorrectas de termodilución

Seleccione una:

- a. Shunt intracardiaco
- b. Aneurisma aórtico
- c. Tromboembolia pulmonar
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1128.- Con respecto a la presión venosa central podemos decir que un paciente con un valor de 5, presenta

Seleccione una:

- a. Presión elevada.
- b. Necesita furosemida
- c. Necesita fluidoterapia
- d. Valor adecuado. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

917.- Las venas endurecidas:

Seleccione una:

- a. Son las más apropiadas para todas las terapias.
- b. Nunca indican flebitis anterior.
- c. Es recomendable su uso.
- d. Pueden indicar una vena previamente utilizada, flebitis anterior o una vena esclerosada. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1101.- Es un uso del catéter arterial en las unidades de cuidados intensivos:

Seleccione una:

- a. Medición de la presión arterial ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Administración de medicamentos
- c. Medición de la presión venosa
- d. Administración de hemoderivados

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

824.- Se puede detectar una trombosis teniendo en cuenta:

Seleccione una:

- a. Descompresión de la vena
- b. Color externo de ésta en la ecografía
- c. Compresión de la arteria
- d. Todas son falsas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

919.- Previo a la inserción del catéter:

Seleccione una:

- a. Se hará una verificación y valoración integral. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. No se precisa verificación.
- c. No es preciso interrogar acerca de alergias, enfermedades sistémicas, medicaciones actuales, tolerancia a procedimientos previos.
- d. Todas falsas.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1023.- En el ajuste previo de la B.I.G. se realiza girando una rosca que se localiza en la zona de inyección del dispositivo y encontraremos en adultos (AZUL) según el lugar de punción:

Seleccione una:

- a. Tibia proximal...1,5 cm.
- b. Húmero proximal...2 cm.
- c. Tibia distal...2 cm. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Radio distal...1 cm.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1028.- COOKÒ. Agujas de Cook Critical Care. Señale la afirmación correcta:

Seleccione una:

- a. Este dispositivo presenta un amplio mango o manubrio que proporciona un agarre seguro para el usuario, lo que facilita su manipulación durante el procedimiento.
- b. A nivel interno presenta un mandril versátil pues puede tener una punta en forma de lápiz, ideal para neonatos y lactantes, cuya cortical ósea es más delicada y puede perforarse con una presión suave.
- c. Este dispositivo se encuentra disponible en tres calibres diferentes: 18, 16 y 14 G, lo que proporciona flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas del paciente y del procedimiento.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

1108.- En líneas generales, la luz de elección para la medición de la presión venosa central es:

Seleccione una:

- a. Luz Medial
- b. Luz Distal ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Luz Proximal
- d. Indistintamente, es decir se puede medir en cualquiera de las luces del dispositivo