

## TEST 4 ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES URGENCIAS Y EMERGENCIAS RESPIRATORIAS, REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y POLITRAUMATIZADO (EME1V)

### Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

160.- Para el traslado de una paciente embarazada debe optar una posición que es:

Seleccione una:

- a. Anti-Trendelemburg.
- b. Trendelemburg.
- c. Supino.
- d. Decúbito lateral izquierdo. ✓ ¡Bien, correcto!

### Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

163.- Para la sedación en el paciente politraumatizado se pueden utilizar los opiáceos ¿cuál de éstos no es un opiáceo?

Seleccione una:

- a. Morfina.
- b. Fentanilo.
- c. Tramadol.
- d. Metamizol. ✓ ¡Bien, correcto!

### Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

162.- La inmovilización tetracameral o inmovilizador de cabeza limita principalmente los movimientos de:

Seleccione una:

- a. Lateralización.
- b. Flexión cervical.
- c. A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son falsas.

### Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

157.- A la hora de evaluar la columna cervical y cuello hay que observar la tráquea y estamos ante una patología cuando ésta se encuentra:

Seleccione una:

- a. Desviada a la izquierda.
- b. Medial.
- c. Desviada a la derecha.
- d. A y c son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

161.- En la técnica de actuación de la camilla de cuchara:

Seleccione una:

- a. Se sitúa la camilla paralela a uno de los lados del paciente.
- b. Regulamos su longitud a través de los anclajes laterales.
- c. Una vez que el paciente esté en la camilla lo sujetaremos con las cinchas para evitar su caída.
- d. Todas las anteriores son actuaciones correctas en el manejo de la camilla de cuchara. ✓

¡Bien, correcto!

**Pregunta 6**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

148.- Hay muchas lesiones que pueden comprometer la respiración pero la que no compromete seriamente es:

Seleccione una:

- a. Volet costal.
- b. Neumotórax abierto.
- c. Contusión de la parrilla costal. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Neumotórax a tensión.

**Pregunta 7**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

151.- La principal causa que produce en un politraumatizado una PCR es:

Seleccione una:

- a. Hipovolemia.
- b. Dolor.
- c. Obstrucción de vía aérea.
- d. Hipoxia. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 8**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

▼ Marcar  
pregunta

146.- En el paciente politraumatizado las funciones deben de ser evaluadas de manera:

Seleccione una:

- a. Rápida.
- b. Tranquilamente.
- c. Eficientemente.
- d. A y c son verdaderas. ✓ ¡Bien, correcto!

**Pregunta 9**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

156.- El principal problema que se genera en la utilización de férulas neumáticas de vacío:

Seleccione una:

- a. Son muy incómodas.
- b. No inmovilizan bien.
- c. En traslados aéreos pierden consistencia. ✓ Bien, correcto!
- d. Todas son falsas.

**Pregunta 10**

Correcta

Se puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

164.- El efecto de las benzodiazepinas en el politraumatizado es importante. Cuál no es una cualidad de éstas:

Seleccione una:

- a. Depresión del SNC.
- b. Aumento de la PIC. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Depresión respiratoria.
- d. Disminución de la TA.