1. Juan es un niño de 3 años que se ha tragado 3 pilas de botón. ¿Cuál de las siguientes medidas cree que será más efectiva?

- a. Endoscopia. XX
- b. Carbón activado.
- c. Lavado gástrico.
- d. Irrigación intestinal completa.

2. En pacientes con problemas de audición, podemos encontrar los siguientes signos auditivos, excepto:

- a. Cerumen.
- b. Enrojecimiento.
- c. Inflamación.
- d. Disminución de la sensibilidad. XX

3. La enfermedad de Ménière puede estar relacionada con las siguientes medidas, excepto con:

- a. Uso de fármacos como el ácido acetilsalicílico.
- b. Hipertensión arterial.
- c. Consumo de tabaco y alcohol.
- d. Limpieza con bastoncillos. XX

4. El músculo dilatador de la pupila, cuya inervación corre a cargo del sistema nervioso simpático, cuando se activa, va a provocar:

- a. Nistagmus.
- b. Miosis.
- c. Midriasis. XX
- d. Anopsia.

5. La presencia de escamas palpebrales son propias de:

- a. Chalazión.
- b. Blefaritis. XX
- c. Orzuelo.
- d. Pterigión.

6. La opacidad del cristalino del ojo, se denomina:

- a. Catarata. XX
- b. Presbicia.
- c. Glaucoma.
- d. Degeneración maculopapilar.

7. ¿Qué es la enfermedad de Ménière?

- a. Es una inflamación del oído interno que puede ser de origen bacteriano o viral.
- b. Es un desequilibrio anormal de los líquidos del oído por absorción deficiente en el saco endolinfático. XX
- c. Es un período breve de vértigo incapacitante, que ocurre cuando la posición de la cabeza del paciente cambia con respecto a la gravedad.
- d. Es un trastorno del equilibrio.

8. Trabaja en un centro de salud laboral de una fábrica, un profesional ha tenido un accidente y ha sufrido una quemadura con lejía en el ojo ¿Durante cuánto tiempo deberemos realizar lavado ocular en este caso?

- a. 10 minutos.
- b. 2 días.
- c. 30 min. XX
- d. 2 horas.

9. Se realizarán test vestibulares en una exploración otorrinolaringológica, siendo éstos:

- a. Test de Nysten-Barany y Romberg. XX
- b. Test de Alien.
- c. Test de Weber.
- d. Test de Rinne.

10. Cristóbal ha tenido una rotura timpánica tras la eliminación de un cuerpo extraño en su oído. ¿Cuál de las siguientes no es una recomendación al alta?

- a. Seguir el tratamiento antibiótico pautado.
- b. Taponar el oído para protegerlo y evitar la infección.
- c. No es necesario proteger el oído del agua. XX

d. Si no cierra en tres/seis meses, será preciso la reparación quirúrgica.

11. ¿Qué diferencia hay entre epistaxis y rinorragia?

- a. Rinorragia es un sangrado abundante y epistaxis es corto.
- b. Es lo mismo. XX
- c. En la rinorragia el sangrado es de las fosas nasales y en la epistaxis es de la propia nariz.
- d. En cuanto a la epistaxis, la causa es un traumatismo y en cuanto a la rinorragia es una hipertensión arterial.

12. Señale los signos y síntomas del síndrome de Ménière:

- a. Diarrea vespertina y heces acólicas.
- b. Dolor y fiebre mayor de 38° C.
- c. Sensación de plenitud en el oído afectado y tinnitus. XX
- d. Otorrea.

13. Mariana refiere pérdida de visión con dolor, ve una mancha de color rojizo con el ojo izquierdo, además en la valoración se observa una midriasis de esa pupila ¿Qué tipo de medidas adoptaremos en el tratamiento?

Seleccione una:

- a. Masaje ocular.
- b. Hacer respirar al paciente en una bolsa de plástico o papel.
- c. Administrar vasodilatadores.
- d. Todas son correctas. XX

14. En la exploración del sistema vestibular, tiene gran significación:

- a. Nistagmus. XX
- b. Otorrea.
- c. Otorragia.
- d. Asteatosis.

15. En un niño que presenta rinorrea unilateral persistente, lo que debemos descartar es:

- a. Hipertrofia de adenoides.
- b. Cuerpo extraño. XX
- c. Sinusitis aguda.
- d. Epistaxis.

16. El examen con fluoresceína es muy útil en el diagnóstico de:

- a. Ojo seco.
- b. Ojo rojo. XX
- c. Orzuelo.
- d. Chalazión.

17. Mario es ingresado en la unidad de corta estancia de la urgencia donde trabaja, en el informe pone que presenta hemianopsia, ¿qué significa este hallazgo?

- a. Pérdida de visión en medio campo visual. XX
- b. Movimiento involuntario, rápido y repetitivo del ojo.
- c. Caída permanente del párpado superior.
- d. Pérdida total de visión en ambos ojos.

18. En cuál de las siguientes situaciones está contraindicado extraer un tapón de cerumen por irrigación de agua.

- a. Sospecha de perforación timpánica. XX
- b. Dolor de garganta al tragar fluidos.
- c. Fiebre.
- d. Estapedectomía

19. La visión de sombras puede corresponder a:

- a. Cataratas.
- b. Desprendimiento de retina. XX
- c. Queratitis.
- d. Glaucoma.

20. La irrigación para la extracción de un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo está contraindicada:

- a. El cuerpo extraño no ocluye totalmente el conducto auditivo.
- b. El cuerpo extraño no es un fruto seco.
- c. El paciente tuvo antiguamente una infección en el conducto auditivo.
- d. El paciente tiene una lesión timpánica. XX

21. Pablo es un niño de 4 años traído al SUAP por rinorrea purulenta y maloliente desde esta mañana por una narina, su madre comenta que parece que le cuesta respirar por la nariz. ¿Qué sospecha que le puede pasar a Pablo?

- a. Catarro nasal.
- b. Hipertrofia de adenoides.
- c. Cuerpo extraño nasal. XX
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

22. En un barotraumatismo, se utiliza como prueba diagnóstica:

- a. Audiometría.
- b. Test de Romberg. XX
- c. Test de Weber.
- d. Timpanometría.

23. La presión intraocular se define como aquella presión que el ojo puede soportar sin lesionar sus estructuras y sin alterar su función. ¿Cuáles son los valores normales?

- a. Mayor de 50 mm Hg.
- b. Entre 0 y 5 mm Hg.
- c. Entre 10 y 21 mm Hg. XX
- d. Entre 30 y 50 mm Hg.

24. En una otitis media, ¿cuál es la complicación más frecuente?

- a. Dolor.
- b. Laberintitis.
- c. Mastoiditis. XX
- d. Supuración.

25. En el tratamiento local de la epistaxis, se debe:

- a. Realizar un taponamiento anterior de la fosa nasal permaneciendo colocado 48 horas. XX
- b. Cauterizar con nitrato de plata.
- c. Evitar evacuar los coágulos que taponan las fosas nasales.
- d. Realizar un taponamiento posterior que se dejará mínimo 72 horas.

26. Respecto a la otitis externa, señale la respuesta correcta:

- a. Fiebre mayor de 39° C.
- b. Tinnitus.
- c. Mastoiditis.
- d. Hay otorrea clara e inodora. XX

27. Entre los cuidados de enfermería de una persona que ha sufrido una epistaxis se incluye la enseñanza de varias medidas de autocuidado, siendo la correcta:

- a. Tomar alimentos calientes y condimentados.
- b. Evitar sonarse la nariz con fuerza. XX
- c. Realizar barridos suaves con bastoncillos de algodón en la nariz para favorecer la expulsión de coágulos residuales.
- d. En caso de sangrado nasal recurrente, el paciente tendrá que extender el cuello para disminuir la presión en el punto de sangrado.

28. ¿A qué se le llama midriasis?

- a. Dilatación de la pupila por encima de 4 mm. XX
- b. Dilatación de la pupila por encima de 2 mm.
- c. Contracción de la pupila por debajo de 4 mm.
- d. Contracción de la pupila por debajo de 2 mm.

29. El cuerpo ciliar de ojo se encuentra en:

- a. Capa externa.
- b. Capa media. XX
- c. Capa interna.
- d. Córnea.

30. ¿Qué prueba diagnóstica se utiliza para diferenciar glaucoma de ángulo cerrado y de ángulo abierto?

- a. Tonometría.
- b. Gonioscopia. XX
- c. Carta de Snellen.
- d. Lámpara de hendidura.

Retroalimentación