

Información

🚩 [Marcar pregunta](#)

Varón de 71 años, hipertenso, ex-fumador, con carcinoma urotelial vesical tratado con resección transuretral.

Fue traído a Urgencias por el servicio de emergencia extrahospitalaria tras ser rescatado del interior de un incendio. Fue encontrado bradicárdico, hipotérmico y con bajo nivel de conciencia. Iniciaron sueroterapia, se administró una dosis inicial de vitamina B12 y se trasladó al hospital tras intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica.

Ingresa en UCI bajo efectos de la sedación, con GCS 3/15. TA: 85/45, FC 100 lpm, hipotermia < 30° C. No quemaduras externas. Coloración rosada de piel y mucosas. Resto de exploración física sin hallazgos de interés. En pruebas complementarias destacan pH 7,24; pCO2 31; pO2 421 (FIO2 1) y bicarbonato 13. Carboxihemoglobina (COHb) 14,2%. Radiografía de tórax sin infiltrados. Orina normal.

En las primeras horas el paciente recupera progresivamente el nivel de conciencia hasta alcanzar una puntuación en la escala de Glasgow de 11+T/15.

En la evolución posterior del paciente destaca el desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica y enfermedad neuromuscular grave del paciente crítico, pudiendo finalmente ser trasladado sin secuelas respiratorias ni neurológicas atribuibles a la intoxicación.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 [Marcar pregunta](#)

Según los datos de la analítica podemos decir que el paciente se encuentra en

Seleccione una:

- a. Acidosis respiratoria
- b. Acidosis metabólica ✓
- c. Alcalosis metabólica
- d. Alcalosis respiratoria

La respuesta correcta es: Acidosis metabólica

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 [Marcar pregunta](#)

El tratamiento de la intoxicación por humo incluye:

Seleccione una:

- a. Oxígeno en cámara hiperbárica
- b. Oxigenoterapia a alto flujo
- c. Tiosulfato sódico
- d. a y b son correctas ✓

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

De entre las siguientes afirmaciones cuales son criterio para inicio de Ventilación Mecánica

Seleccione una:

- a. Prevenir cambios bruscos de pH
- b. Disnea
- c. Inestabilidad hemodinámica severa
- d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Durante su estancia en la UCI el paciente ha sufrido una Neumonía asociada a Ventilación. Cuáles de las siguientes medidas NO son aconsejables para su control.

Seleccione una:

- a. Realizar lavado de manos antes y después del contacto con el paciente y su entorno
- b. Mantener y realizar la correcta higiene de los equipos usados en la terapia respiratoria
- c. Hacer los cambios de filtros, pero las tubuladuras pueden continuar con el siguiente paciente ya que se elevan costes y no se manipulan los equipos ✓
- d. Hacer una correcta higiene oral, al menos tres veces al día, o cuando sea necesario, para evitar que las secreciones se acumulen en la orofaringe

La respuesta correcta es: Hacer los cambios de filtros, pero las tubuladuras pueden continuar con el siguiente paciente ya que se elevan costes y no se manipulan los equipos

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Cual es la causa más común de aumento de presión máxima en la vía aérea de un paciente con ventilación mecánica.

Seleccione una:

- a. Secreciones ✓
- b. Bronquiectasias
- c. Diámetro del tubo endotraqueal
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Secreciones

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

[Marcar
pregunta](#)

Una de las escalas en las que medimos el estado de consciencia del paciente y su evolución a medida que pasan las horas es la Escala GLASGOW. Se considera un estado comatoso por debajo de:

Seleccione una:

- a. 5
- b. 13
- c. 7 ✓
- d. 9

La respuesta correcta es: 7