

[Página Principal](#) » [Mis cursos](#) » [AV.P044_25](#) » [Evaluación Marzo](#) »

[Curso: Cuidados enfermeros al paciente pediátrico con dolor](#)

Comenzado el	jueves, 27 de marzo de 2025, 08:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 27 de marzo de 2025, 10:33
Tiempo empleado	1 hora 49 minutos
Puntos	29,00/30,00
Calificación	9,67 de 10,00 (96,67%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a la escala CRIES del dolor en el recién nacido, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Llanto controlable 2 puntos.
- b. Despierta muy frecuentemente 1 punto. ✓
- c. Cara descansada y expresión neutra 1 punto.
- d. Aumento del 20% de la F.C basal 0 puntos.

La respuesta correcta es: Despierta muy frecuentemente 1 punto.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente post quirúrgico de 3 años, ¿qué escala de valoración del dolor usarías?

Seleccione una:

- a. La escala LLANTO. ✓
- b. La escala DSVNI.
- c. La escala de AMIEL-TISON.
- d. Escala CHIPPS.

La respuesta correcta es: La escala LLANTO.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes tratamientos para el dolor es usado con mayor frecuencia en las unidades neonatales?

Seleccione una:

- a. Paracetamol oral.
- b. Hidrato de cloral.
- c. Sacarosa 24%. ✓
- d. Midazolam.

La respuesta correcta es: Sacarosa 24%.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Vamos a realizar la canalización de una vía venosa periférica a un paciente de 5 meses, ¿Qué analgesia emplearíamos de primera elección:

Seleccione una:

- a. Paracetamol oral.
- b. Sacarosa 12%.
- c. Leche materna. ✓
- d. Ibuprofeno oral.

La respuesta correcta es: Leche materna.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pedro (6 años), ingresa en la planta de escolares para intervención programada de hernia inguinal. Después de presentarse, la enfermera acompaña al niño y a sus padres a la habitación, donde se le explica las medidas a llevar a cabo. Tras dar un tiempo de adaptación, vuelve para comunicar a Pedro la necesidad de realizar una extracción de sangre y a la vez canalizar una vía periférica. ¿Qué no debe hacer la enfermera?

Seleccione una:

- a. Informar al niño de lo que se le va a hacer y su necesidad, de forma clara y sencilla para que pueda entenderlo.
- b. Decir que no le va a doler, para que se tranquilice. ✓
- c. Promover la participación de los padres como apoyo al niño.
- d. Usar habilidades de comunicación, como el tacto, contacto ocular y una tranquilidad verbal realista cuya finalidad sea reducir la ansiedad del niño junto con la de la familia.

La respuesta correcta es: Decir que no le va a doler, para que se tranquilice.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál no es un instrumento para medir el dolor en el niño?

Seleccione una:

- a. Escala de caras.
- b. Sistema de puntuación FLACC.
- c. Escala tipo Likert.
- d. Score de Finnegan. ✓

La respuesta correcta es: Score de Finnegan.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a los opioides mayores, señala la correcta:

Seleccione una:

- a. Se usan para el tratamiento del dolor leve.
- b. La metadona es el de elección para el tratamiento del dolor neuropático que responde mal a otros analgésicos. ✓
- c. No está indicado el uso de morfina en pediatría.
- d. El uso del segundo escalón analgésico está fuertemente recomendado en la infancia.

La respuesta correcta es: La metadona es el de elección para el tratamiento del dolor neuropático que responde mal a otros analgésicos.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tratamiento analgésico indicado para el dolor irruptivo por cáncer es:

Seleccione una:

- a. Morfina Intravenosa.
- b. Oxycodona oral.
- c. Tramadol intramuscular.
- d. Fentanilo bucal. ✓

La respuesta correcta es: Fentanilo bucal.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería el orden adecuado de la valoración del cuadro doloroso y de la situación clínica del individuo, antes de iniciar el tratamiento analgésico de un adolescente en cuidados paliativos?

Seleccione una:

- a. Aplicar parche de fentanilo y spray nasal según indicación; evaluar el nivel de dolor; realizar con el paciente una historia clínica del dolor; Evaluar la respuesta al tratamiento.
- b. Preguntar al paciente por el dolor; cuantificar el dolor; Realizar una historia del dolor; Realizar una exploración física completa; Clasificar el dolor; administrar el tratamiento analgésico adecuado; evaluar la respuesta al tratamiento analgésico. ✓
- c. Preguntar al paciente por el dolor; cuantificar el dolor; administrar el tratamiento analgésico.
- d. Cuantificar el dolor; administrar el tratamiento analgésico adecuado; clasificar el dolor; realizar una historia de dolor; realizar una exploración física completa; Evaluar la respuesta al tratamiento analgésico.

La respuesta correcta es: Preguntar al paciente por el dolor; cuantificar el dolor; Realizar una historia del dolor; Realizar una exploración física completa; Clasificar el dolor; administrar el tratamiento analgésico adecuado; evaluar la respuesta al tratamiento analgésico.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

cuando el profesional de enfermería quiere valorar el estado de sedación de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, utilizará la escala de:

Seleccione una:

- a. Ramsay. ✓
- b. Melzac.
- c. Escala analógica visual.
- d. Índice de Lattimen.

La respuesta correcta es: Ramsay.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un paciente tiene pautado codeína en su tratamiento para el dolor, ¿en qué escalón de la escalera analgésica de la OMS se encuentra?:

Seleccione una:

- a. Primer escalón.
- b. Segundo escalón. ✓
- c. Tercer escalón.
- d. Cuarto escalón.

La respuesta correcta es: Segundo escalón.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los fármacos que no están clasificados farmacológicamente como analgésicos, pero que se usan solos o asociados a fármacos de la escalera analgésica de la OMS para el control del dolor, se conocen como:

Seleccione una:

- a. Antagonistas.
- b. Coadyuvantes. ✓
- c. Nocebos.
- d. Secundarios.

La respuesta correcta es: Coadyuvantes.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La definición "una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión presente o potencial o descrita en términos de la misma", ¿a qué concepto hace referencia?

Seleccione una:

- a. Alodinia.
- b. Dolor. ✓
- c. Parestesia.
- d. Neuralgia.

La respuesta correcta es: Dolor.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto el dolor en la infancia señale la respuesta INCORRECTA:

Seleccione una:

- a. La sensación de dolor es subjetiva y debe ser aceptada por la enfermera.
- b. La respuesta al dolor es importante cuando se explora a un niño para diagnosticar su enfermedad y se puede demorar su tratamiento analgésico. ✓
- c. Los padres al conocer a sus hijos son capaces de identificar cuando el niño tiene dolor.
- d. Los niños no toleran el dolor mejor que los adultos.

La respuesta correcta es: La respuesta al dolor es importante cuando se explora a un niño para diagnosticar su enfermedad y se puede demorar su tratamiento analgésico.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tiene que repetir las pruebas metabólicas a un recién nacido de 20 días de vida. Para la punción del talón emplearía como analgésico:

Seleccione una:

- a. Ibuprofeno oral.
- b. Sacarosa oral. ✓
- c. Paracetamol intravenoso.
- d. Fentanilo intravenoso.

La respuesta correcta es: Sacarosa oral.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Oximorfona, mepedina, codeína, pentazocina, fentanilo. Todos estos principios activos tienen en común su pertenencia al grupo de:

Seleccione una:

- a. Alucinógenos.
- b. Anfetaminas clásicas.
- c. Opiáceos. ✓
- d. Cannabinoides.

La respuesta correcta es: Opiáceos.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Son signos posibles de dolor agudo:

Seleccione una:

- a. Taquicardia, aumento de la tensión arterial, taquipnea, midriasis, etc. ✓
- b. Bradicardia, disminución de la tensión arterial, bradipnea, miosis, etc.
- c. Taquicardia, bradipnea y disminución de la tensión arterial.
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Taquicardia, aumento de la tensión arterial, taquipnea, midriasis, etc.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la vía de administración de medicación indicada para el control del dolor en la infancia inicialmente?

Seleccione una:

- a. Oral. ✓
- b. Intravenosa.
- c. Subcutánea.
- d. Intramuscular.

La respuesta correcta es: Oral.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué caso estaría indicado el uso de benzodicepinas en la infancia respecto al tratamiento del dolor?

Seleccione una:

- a. Para el manejo y control de la ansiedad. ✓
- b. Para tratar el dolor.
- c. Para dormir a la niña y que no nos transmita su sensación de dolor.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Para el manejo y control de la ansiedad.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es característico del dolor en pediatría:

Seleccione una:

- a. En muchas ocasiones no es el paciente el que transmite la información relacionada con el dolor. ✓
- b. Los niños sienten menos dolor que los adultos.
- c. Cuanto mayor es el niño menos tolerancia al dolor tiene.
- d. Si un niño no dice que le duele entonces es que no le duele.

La respuesta correcta es: En muchas ocasiones no es el paciente el que transmite la información relacionada con el dolor.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En qué consiste el abordaje multidisciplinar del dolor:

Seleccione una:

- a. La actuación sinérgica de todos los profesionales implicados en el tratamiento del dolor. ✓
- b. Maximizar el impacto que el dolor supone para la salud del paciente.
- c. Limitar la implicación de los padres en el tratamiento del dolor.
- d. Valorar solo la esfera biológica de dolor.

La respuesta correcta es: La actuación sinérgica de todos los profesionales implicados en el tratamiento del dolor.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la morfina es cierto que:

Seleccione una:

- a. Es el opioide de referencia y elección en el tratamiento del dolor grave en pediatría. ✓
- b. Es el fármaco indicado para el tratamiento del dolor leve.
- c. Se desaconseja su uso en la infancia.
- d. Genera dependencia incluso en tratamientos cortos.

La respuesta correcta es: Es el opioide de referencia y elección en el tratamiento del dolor grave en pediatría.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es el opioide de elección en el tratamiento del dolor neuropático:

Seleccione una:

- a. Metadona. ✓
- b. Fentanilo.
- c. Hidromorfona.
- d. Codeína.

La respuesta correcta es: Metadona.

Pregunta

24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Con respecto al fenómeno de dependencia:

Seleccione una:

- a. Aparece por la administración de un sedante u opioide durante horas de tratamiento. ✘
- b. Es la disminución del efecto farmacológico tras semanas de tratamiento.
- c. Aparece por la administración de un sedante o un opioide durante semanas de tratamiento.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Aparece por la administración de un sedante o un opioide durante semanas de tratamiento.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los objetivos del tratamiento del dolor no farmacológico será:

Seleccione una:

- a. Maximizar la cooperación del niño. ✔
- b. Reducir la implicación parental en el tratamiento del niño.
- c. Maximizar el dolor.
- d. Maximizar el riesgo del niño ante cualquier procedimiento.

La respuesta correcta es: Maximizar la cooperación del niño.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto al dolor crónico señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Habitualmente es más sencillo de tratar que el dolor agudo. ✔
- b. Habitualmente es más complejo de tratar que el dolor agudo.
- c. Con frecuencia se precisan varios fármacos para controlarlo.
- d. Puede llegar a limitar la calidad de vida del paciente.

La respuesta correcta es: Habitualmente es más sencillo de tratar que el dolor agudo.

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es una clave en la comunicación con el niño con dolor:

Seleccione una:

- a. Crear un entorno dinámico y activo.
- b. Ajustar el lenguaje a la capacidad de comprensión del niño. ✓
- c. Comunicarse con los padres exclusivamente.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Ajustar el lenguaje a la capacidad de comprensión del niño.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La hiperalgesia se define como:

Seleccione una:

- a. Respuesta al dolor aumentada ante un estímulo doloroso. ✓
- b. Sensación de dolor ante un estímulo no doloroso.
- c. Sensación anormal no desagradable descrita como hormigueo.
- d. Aumento de la sensibilidad ante un estímulo táctil.

La respuesta correcta es: Respuesta al dolor aumentada ante un estímulo doloroso.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la morfina es cierto que:

Seleccione una:

- a. Se debe pautar con un laxante. ✓
- b. Es el fármaco indicado para el tratamiento del dolor leve.
- c. Se desaconseja su uso en la infancia.
- d. Genera dependencia incluso en tratamientos cortos.

La respuesta correcta es: Se debe pautar con un laxante.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a los sedantes es falso que:

Seleccione una:

- a. Producen efecto analgésico. ✓
- b. Se pueden asociar a opioides para disminuir la ansiedad.
- c. Se pueden emplear para disminuir la agitación.
- d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: Producen efecto analgésico.

Actividad previa

◀ Documento en PDF

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>