Cuidados enfermeros en el paciente en cuidados paliativos en el ámbito asistencial de las urgencias y emergencias extrahospitalarias. (2024)

Página Principal

Mis cursos

AV.Q085_24

Evaluación Junio

Curso: Cuidados enfermeros en el paciente en cuidados paliativos en el ámbito asistencial de las urgencias y emergencias extrahospitalarias

Comenzado el viernes, 21 de junio de 2024, 20:41

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 21 de junio de 2024, 20:58

Tiempo empleado 16 minutos 15 segundos

Puntos 29,00/30,00

Calificación 9,67 de 10,00 (96,67%)

Comentario -

Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la tos en el paciente terminal, señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a.

Puede ser patológica si es repetitiva y molesta.

b.

Se emplean siempre fármacos antitusígenos como la codeína y la morfina si la tos es productiva.

c.

Puede afectar al 50% de los pacientes.

d.

Su causa puede proceder de la irritación del tracto respiratorio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se emplean siempre fármacos antitusígenos como la codeína y la morfina si la tos es productiva.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta en relación a la administración de fármacos por vía subcutánea en los cuidados paliativos:

Seleccione una:

a.

Se considera la vía de primera opción para los pacientes con disfagia grave y mal control del dolor.

b.

La medicación se puede administrar en forma de bolos o en bombas de infusión.

c.

Las zonas de punción recomendadas para la vía subcutánea son la infraclavicular, la deltoidea, el abdomen y la zona glútea.

d.

Las situaciones en las que se desaconseja son la anasarca, el shock y las coagulopatías graves.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las zonas de punción recomendadas para la vía subcutánea son la infraclavicular, la deltoidea, el abdomen y la zona glútea.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la escalera analgésica de la OMS en el segundo escalón estarían los siguientes medicamentos:

Seleccione una:

a.

Tramadol y codeína.

b.

Paracetamol, metamizol, ácido acetil salicílico e ibuprofeno.

c.

Diclofenaco y naproxeno.

d.

Morfina, fentanilo y metadona.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tramadol y codeína.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes principios sobre los cuidados paliativos, señale el incorrecto:

Seleccione una:

a.

Mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positivamente en el curso de la enfermedad.

b.

Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a las familias a adaptarse durante la enfermedad de los pacientes y en el duelo.

c.
Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal.

d.
Intentan acelerar o retrasar la muerte.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intentan acelerar o retrasar la muerte.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existe una serie de instrumentos básicos en cuidados paliativos, entre los cuales podemos destacar:

Seleccione una:

a.
Control de síntomas, apoyo emocional, cambios en la organización y equipo interdisciplinar.

b.
Atención integral, concepción terapéutica caritativa y localización.

c.
Enfermo como unidad objeto de atención y concepción terapéutica positiva.

d.
Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Control de síntomas, apoyo emocional, cambios en la organización y equipo interdisciplinar.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La alimentación en los procesos terminales puede estar alterada por:

Seleccione una:

a.
Anorexia.

b.
Náuseas y/o vómitos.

c.
Dificultades para la deglución.

d.
Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes afirmaciones es falsa. Señale cuál de ellas:

Seleccione una:

a.

No hay que permitir la estancia continuada de la familia.

b.

La retención urinaria o la impactación fecal pueden causar agitación.

c.

Los analgésicos se pondrán a horas fijas, no a demanda.

d.

Ante el dolor, hay que lograr que el paciente adopte la posición más adecuada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No hay que permitir la estancia continuada de la familia.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las etapas del duelo de kübler-ross, cuando una persona en situación terminal expresa: "solo quiero ver el nacimiento de mi nieto, después estaré listo...", decimos que está en la fase de:

Seleccione una:

a.

Negación.

b.

Ira.

c.

Aceptación.

d.

Negociación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Negociación.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes actividades de enfermería no está incluida en relación a los cuidados paliativos:

Seleccione una:

a.

Control de síntomas que alteren el confort del paciente.

b.

Ayuda a la familia a superar la pérdida.

c.

Prestar la atención según el protocolo médico exclusivamente.

d.

Valorar los cambios para poder anticiparse a las necesidades del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prestar la atención según el protocolo médico exclusivamente.

Pregunta

10

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el proceso de duelo, las manifestaciones que se pueden presentar son:

Seleccione una:

a.

Sensaciones físicas de ahogo y boca seca.

b.

Alucinaciones visuales y auditivas.

c.

Trastornos del apetito.

d.

Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No recomendaríamos para los cuidados de la boca en un paciente en fase terminal:

Seleccione una:

a.

Estimular la salivación masticando chicle o frutas.

b.

Utilizar anestésicos locales sobre las úlceras dolorosas antes de las comidas.

c.

Utilizar un cepillo duro para eliminar bien los restos alimenticios.

d.

Extremar cuidados higiénicos en caso de prótesis dentales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar un cepillo duro para eliminar bien los restos alimenticios.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cantidad de estímulo doloroso que requiere una persona para sentir dolor se denomina:

Seleccione una:

a.

Umbral del dolor.

b.

Tolerancia al dolor.

c.

Dependencia del dolor.

d.

Pico máximo del dolor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Umbral del dolor.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No encontramos en el síndrome de abstinencia a opiáceos:

Seleccione una:

a.

Bradycardia.

b.

Midriasis.

c.

Diaforesis profusa.

d.

Sialorrea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bradicardia.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con la atención paliativa, señala la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

a.

La atención paliativa es un concepto más concreto que los cuidados terminales.

b.

Es una estrategia de atención y un sistema estructurado para la atención, que pretende "prevenir y aliviar el sufrimiento, y mantener lo mejor posible la calidad de vida de los pacientes y sus familias".

c.

Hace énfasis en el manejo de problemas psicológicos, sociales y espirituales, además de controlar el dolor y otros síntomas físicos.

d.

No comienza cuando termina el tratamiento enfocado en la curación, sino que es más provechosa cuando se brinda junto con los tratamientos que inducen a la remisión de la enfermedad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La atención paliativa es un concepto más concreto que los cuidados terminales.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la sociedad española de cuidados paliativos (secpal), los sanitarios utilizan de forma inadecuada o insuficiente los analgésicos opioides debido a una serie de prejuicios entre los que no se encuentra uno de los siguientes:

Seleccione una:

a.

La morfina por vía oral es efectiva.

b.

La morfina es peligrosa porque causa depresión respiratoria.

c.

La morfina provoca acostumbramiento.

d.

La tolerancia a la morfina se desarrolla rápidamente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La morfina por vía oral es efectiva.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Usted realiza una valoración a un paciente oncológico utilizando la escala de karnofsky y le atribuye los siguientes criterios, "paciente muy grave, encamado por completo, precisa hospitalización y tratamiento activo". ¿Qué puntuación obtendría teniendo en cuenta la escala utilizada?

Seleccione una:

a.

100

b.

80

c.

20

d.

0

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta sobre el escalón III de la escala analgésica de la OMS:

Seleccione una:

a.

Está formado por Opioides débiles +/- coanalgésicos +/- Escalón I.

b.

Está formado por Opioides potentes +/- coanalgésicos +/- Escalón II.

c.

Está formado por Opioides potentes +/- coanalgésicos +/- Escalón I.

d.

Está formado por Opioides débiles +/- coanalgésicos +/- Escalón II.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está formado por Opioides potentes +/- coanalgésicos +/- Escalón I.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tercera fase del proceso de duelo según Kubler Ross se corresponde con:

Seleccione una:

a.

No aceptación.

b.

Depresión.

c.

Aceptación.

d.

Negociación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Negociación.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante la fase terminal la valoración del paciente de cara a planificar los cuidados debe referirse a:

Seleccione una:

a.

El grado del confort del paciente.

b.

Nivel de conocimiento de la familia.

c.

Proceso de duelo.

d.

Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente que presenta estertores premortem y que precisa cuidados paliativos, ¿Cuál de las siguientes acciones sería la adecuada? Indique la opción correcta.

Seleccione una:

a.

Aumentar la ingesta de líquidos para hidratarle.

b.
Aspirar secreciones.

c.
Informar a la familia de que se trata de un ruido debido a la oscilación de las secreciones.

d.
No necesita cuidados en la boca.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a la familia de que se trata de un ruido debido a la oscilación de las secreciones.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Con qué tipo de duelo se corresponde la siguiente definición?: aquellas personas que "se controlan", "no tienen tiempo de ocuparse de sí mismas" o escapan al dolor y a la realidad de la muerte del ser querido mediante una "hiperactividad". Durante meses o incluso años, cualquier recuerdo o imagen, desencadena el duelo no resuelto.

Seleccione una:

a.
Anticipatorio.

b.
Crónico.

c.
Retardado.

d.
Patológico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Retardado.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para realizar un buen control de síntomas en un paciente en fase terminal, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) tendremos que... Señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

a.
Evaluar antes de tratar.

b.
Tratar síntomas sin tener en cuenta las causas de éstos.

c.
Estrategia terapéutica mixta.

d.
Monitorización de síntomas.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tratar síntomas sin tener en cuenta las causas de éstos.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta en relación a los objetivos de la escala funcional de karnofsky:

Seleccione una:

a.
Permite saber la capacidad del paciente para llevar a cabo las actividades cotidianas.

b.
Un índice igual o superior a 60 en esta escala indica un riesgo de muerte alto durante los 6 meses siguientes.

c.
Sirve para tomar decisiones y valorar el impacto de un tratamiento y de la progresión de la enfermedad del paciente.

d.
Es un elemento predictor independiente de la mortalidad en las patologías oncológicas y no oncológicas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un índice igual o superior a 60 en esta escala indica un riesgo de muerte alto durante los 6 meses siguientes.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las bases del tratamiento analgésico del dolor en pacientes terminales encontramos (Señala la falsa)

Seleccione una:

a.
Elegir el fármaco analgésico según la intensidad del dolor.

b.
No usar placebos.

c.
Uso de medidas no farmacológicas.

d.

Elegir analgésicos potentes en función del tiempo de supervivencia previsto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Elegir analgésicos potentes en función del tiempo de supervivencia previsto.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué papel desempeña la familia en este proceso de enfermedad terminal?

Seleccione una:

a.

Se mantiene apartada del paciente para dejar que éste viva en paz su enfermedad.

b.

Son los receptores únicos de la información y decisiones médicas.

c.

Es soporte afectivo y de compañía.

d.

Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es soporte afectivo y de compañía.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación con el duelo:

Seleccione una:

a.

Es un término que se aplica únicamente ante la muerte de un ser querido.

b.

Es realmente una enfermedad y como tal hay que tratarla.

c.

Responde a una conducta de apego, en el sentido de función evolutiva.

d.

Tiene una duración fija y reproducible en personas adultas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Responde a una conducta de apego, en el sentido de función evolutiva.

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tercer escalón de la escalera analgésica promulgada por la O.M.S., se utiliza:

Seleccione una:

a.

Morfina oral exclusivamente.

b.

Opiáceos potentes y fármacos coadyuvantes si lo necesita.

c.

Opiáceos débiles, no opioides y medicación coadyuvante si lo necesita.

d.

Opiáceos menores, no opioides y medicación coadyuvante si lo necesita.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opiáceos potentes y fármacos coadyuvantes si lo necesita.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes características no se corresponde con una situación de enfermedad terminal?

Seleccione una:

a.

Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable.

b.

Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.

c.

Pronóstico de vida inferior a doce meses.

d.

Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pronóstico de vida inferior a doce meses.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al manejo de los síntomas respiratorios en los pacientes que precisan de cuidados paliativos. Indique la afirmación correcta

Seleccione una:

a.

La disnea no es una urgencia.

b.

Nunca se usan broncodilatadores.

c.

El drenaje postural y los ejercicios respiratorios están contraindicados.

d.

La morfina disminuye la sensación de disnea porque reduce el trabajo respiratorio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La morfina disminuye la sensación de disnea porque reduce el trabajo respiratorio.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta, en relación al dolor en un paciente al final de la vida:

Seleccione una:

a.

Los pacientes que siguen un régimen establecido de analgésico no deben continuar con estos medicamentos conforme se aproximan al final de su vida.

b.

La incapacidad para comunicar el dolor no debe equipararse con la ausencia de dolor.

c.

La solución concentrada de morfina no puede administrarse, de manera efectiva, por vía sublingual.

d.

Mientras el paciente reciba opioides, no debe implementarse un régimen para corregir el estreñimiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La incapacidad para comunicar el dolor no debe equipararse con la ausencia de dolor.

Me Gusta

Citar

Más...