Caso práctico: Manejo enfermero de heridas y quemaduras

Comenzado el	lunes, 31 de marzo de 2025, 11:19
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 31 de marzo de 2025, 11:23
Tiempo empleado	3 minutos 55 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100 %)
Comentario -	Apto

Información

Martina es una niña de 7 años que en el transcurso de una actividad escolar (paseo por un Hayedo), cae accidentalmente por una ligera pendiente de 2 metros.

Al observarla tras la caída ,se determinan heridas abrasivas en ambas rodillas, herida incisocontusa en antebrazo derecho, herida supraciliar derecha. No perdida de consciencia. Es valorada inicialmente en el propio hayedo por los Servicios de Emergencias y trasladada al centro asistencial de Primaria más cercano, una vez descartada emergencia vital. En el centro asistencial, la enfermera procede a la intervención sobre las diferentes lesiones que presenta Martina, planteándose las siguientes cuestiones:



Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué técnica se debe emplear al limpiar una herida antes de su sutura para reducir la carga bacteriana?

Seleccione una:

- oa. Limpieza con agua corriente.
- b. Irrigación con solución salina estéril.

 ✓
- o. Aplicación de alcohol.
- Od. Uso de yodo povidona.

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes condiciones podría contraindicar el uso de puntos de sutura en una herida?

Seleccione una:
🔾 a. Hemorragia mínima.
b. Presencia de tejido necrótico. ✓
c. Bordes de la herida alineados.
🔾 d. Herida reciente en una zona de bajo riesgo.
Pregunta
3
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué complicación es más común en heridas tratadas con sutura intradérmica en comparación con otras técnicas de sutura?
teerneds de satura.
Seleccione una:
a. Infección superficial.
b. Dehiscencia de la herida. ✓
c. Formación de cicatrices visibles.
🔾 d. Retención de material de sutura.
Pregunta
4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál es la función principal de un apósito en una herida quirúrgica?
Seleccione una:
a. Promover la desecación de la herida.
 b. Facilitar la absorción de los fluidos exudativos.
o. Mantener la herida visible para su inspección.
🔾 d. Actuar como barrera mecánica contra el trauma.

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de anestésico local se prefiere en procedimientos que requieren prolongada duración del efecto anestésico?
Seleccione una:
a. Lidocaína.
□ b. Bupivacaína.
c. Procaína.
O d. Mepivacaína.
Pregunta
6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál es la recomendación más apropiada para el manejo de una herida quirúrgica que presenta exudado purulento?
Seleccione una: a. Mantener el vendaje estéril y esperar la cicatrización. b. Retirar suturas y drenar la herida. c. Aplicar una capa gruesa de ungüento antibiótico.
d. Administrar solo antibióticos orales.
Pregunta 7 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al decidir cerrar una herida por primera intención?
Seleccione una: a. Tiempo transcurrido desde la lesión. b. Estado de limpieza de la herida. c. Alineación de los bordes de la herida. d. Todas las anteriores.



Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el manejo de una herida contusa, ¿cuál es el enfoque terapéutico más importante? Seleccione una: oa. Aplicación inmediata de suturas. oc. Uso de vendajes compresivos. od. Aplicación de calor para reducir la inflamación. Pregunta Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué factor es determinante para decidir si una herida se cierra o se deja abierta? Seleccione una: o. Preferencia del paciente. ob. Localización de la herida. ○ c. Presencia de infección o contaminación. Od. Profundidad de la herida. Pregunta Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 ¿Qué tipo de sutura se recomienda para minimizar el riesgo de cicatrices visibles en la cara? Seleccione una: a. Sutura en colchonero vertical. oc. Sutura simple con hilos no absorbibles. od. Sutura en "U" horizontal.

Actividad previa

◀ Prueba de conocimientos Módulo 2

Ir a...

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

https://www.fuden.es