ABORDAJE INTEGRAL EN EL CUIDADO ENFERMERO DE LA PIEL Y DE SUS LESIONES:

MÓDULO 3. ULCERACIONES CUTÁNEAS Y PREVENCIÓN

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MÓDULO 3

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

¿Cuál es la diferencia principal entre las úlceras por presión de Categoría III y Categoría IV?

b. La exposición de hueso, tendón o músculo en Categoría IV.

Pregunta 2

Correcta

¿Qué categoría de úlcera por presión se caracteriza por la pérdida total del espesor de la piel, con hueso, tendón o músculo expuestos?

d. Categoría IV

Pregunta 3

Correcta

¿Qué clasificación evalúa la extensión anatómica y la fisiopatología de las úlceras venosas?

a. Clasificación CEAP

Pregunta 4

Correcta

¿Qué caracteriza al pie de Charcot en el contexto del pie diabético?

b. Deformidad del arco plantar con colapso

Pregunta 5

Incorrecta

¿Qué característica distintiva tiene una úlcera isquémica en el pie diabético en comparación con una neuropática?

a. Presencia de esfacelo abundante no

d. Lecho ulceroso seco y pálido?

Pregunta 6

Correcta

¿Cuál de las siguientes fuerzas es la principal responsable del daño en la unión dermoepidérmica en úlceras por presión?

b. Fuerza de cizallamiento.

Pregunta 7

Correcta

¿Qué papel juega la nutrición en la prevención y tratamiento de las úlceras por presión?

B .La ingesta adecuada de proteínas favorece la reparación tisular.

Pregunta 8

Correcta

¿Qué complicación no está directamente asociada a la insuficiencia venosa crónica?

c. Necrosis isquémica

Pregunta 9

Correcta

¿Cuál es el principal objetivo del uso de colchones y cojines antiescaras?

c. Reducir la presión sobre áreas vulnerables del cuerpo.

Pregunta 10

Correcta

¿En qué etapa de la clasificación de Widmer aparecen las úlceras venosas?

c. Estadio 3

Pregunta 11

Incorrecta

¿Cuál es la primera línea de tratamiento para una úlcera neuropática en un paciente con pie diabético?

a. Desbridamiento quirúrgico NO

b. Administración de antibióticos sistémicos

c. Alivio de presión (offloading)

d. Uso de apósitos hidrocoloides

Pregunta 12

Correcta

¿Cuál es el principal signo clínico de la insuficiencia venosa crónica en la clasificación CEAP?

a. Edema

Pregunta 13

Correcta

¿Cuál es la consecuencia directa de la pérdida del reflejo de Aquiles en el pie diabético?

b. Deformidad de los dedos en garra

Pregunta 14

Correcta

¿Cuál de las siguientes complicaciones del pie diabético es más probable que conduzca a la necesidad de una amputación?

c. Infección de úlceras

Pregunta 15

Correcta

¿Cuál es el principal desafío en el tratamiento de las úlceras cutáneas crónicas?

b. La alta resistencia bacteriana a los antibióticos.

Pregunta 16

Correcta

¿Qué factor contribuye significativamente a la formación de úlceras por presión en pacientes diabéticos?

a. Hiperglucemia persistente.

Pregunta 17

Correcta

¿Cuál es la localización más común de las úlceras venosas?

b.Zona supramaleolar interna

Pregunta 18

Correcta

¿Cuál es la principal función de las válvulas venosas en las extremidades inferiores?

c.Prevenir el retorno de la sangre

Pregunta 19

Correcta

¿Cuál es el principal factor fisiopatológico en la formación de úlceras venosas?

b.Disfunción valvular

Pregunta 20

Correcta

¿Qué técnica se utiliza comúnmente para la detección precoz de neuropatía periférica en pacientes con diabetes?

c.Monofilamento de 10 g