Comenzado el	sábado, 26 de abril de 2025, 09:41
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 26 de abril de 2025, 10:35
Tiempo empleado	53 minutos 54 segundos
Puntos	26,00/30,00
Calificación	**8,67** de 10,00 (**86,67%**)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta en la valoración de la luxación congénita de cadera:

Seleccione una:

a. Aunque las maniobras de Barlow y Ortolani sean negativas no se puede descartar la luxación congénita de cadera.

b. La ecografía de cadera sólo se realiza si existe algún signo de sospecha.

c. La inspección visual no permite apreciar ningún cambio. ✔

d. La maniobra de Barlow se realiza en decúbito supino y con las caderas abducidas 45 grados.

La respuesta correcta es: La inspección visual no permite apreciar ningún cambio.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la respuesta falsa en el tratamiento de las fracturas fisarias?

Seleccione una:

a. Los tipos I y II se tratan quirúrgicamente. ✔

b. Las alteraciones en el crecimiento de la fisis pueden aparecer hasta un año después de la fractura.

c. Hay que respetar el cartílago de crecimiento y evitar que los sistemas de fijación lo atraviesen.

d. En los tipos III y IV puede ser necesario recurrir a la cirugía.

La respuesta correcta es: Los tipos I y II se tratan quirúrgicamente.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique de los siguientes, cuál no es un factor de riesgo en la luxación congénita de cadera:

Seleccione una:

a. Presentación fetal de nalgas.

b. Sexo masculino. ✔

c. Alto peso al nacer.

d. Primípara.

La respuesta correcta es: Sexo masculino.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la artrogriposis múltiple congénita aparecen contracturas musculares congénitas que afectan a las articulaciones y que se caracterizan por:

Seleccione una:

a. Las contracturas sólo aparecen a nivel de los miembros superiores.

b. Puede deberse a una hipotonía muscular o a una postura mantenida en el vientre materno. ✔

c. Las contracturas suelen ser bilaterales y más severas a nivel proximal.

d. No es frecuente la afectación de otros órganos o sistemas.

La respuesta correcta es: Puede deberse a una hipotonía muscular o a una postura mantenida en el vientre materno.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es un tipo de artritis crónica juvenil?

Seleccione una:

- a. AIJ de origen sistémico.
- b. AIJ oligoarticular.
- c. AIJ monoarticular. ✔
- d. AIJ con entesitis.

La respuesta correcta es: AIJ monoarticular.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes se afecta la articulación de la cadera, produciendo:

Seleccione una:

- a. Contracturas en flexión del glúteo medio.
- b. Luxaciones o subluxaciones de la cabeza femoral.
- c. Alteración del ángulo de anteversión femoral, con el cuello femoral apuntando hacia delante con respecto a la diáfisis femoral.
- d. Necrosis de la cabeza femoral. ✔

La respuesta correcta es: Necrosis de la cabeza femoral.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la tortícolis muscular congénita, la cabeza del niño adopta una postura anómala, que se caracteriza por:

Seleccione una:

a. Inclinación y rotación de la cabeza hacia el lado contrario a la lesión.

b. Inclinación de la cabeza hacia el lado afecto y rotación hacia el lado contrario de la lesión. ✔

c. Rotación de la cabeza hacia el lado de la lesión, sin afectación de la inclinación.

d. Inclinación de la cabeza hacia el lado sano y rotación hacia el lado contrario.

La respuesta correcta es: Inclinación de la cabeza hacia el lado afecto y rotación hacia el lado contrario de la lesión.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las fracturas en tallo verde:

Seleccione una:

- a. Son debidas a una tensión longitudinal del hueso.
- b. Se fractura la cortical en la parte cóncava del hueso.
- c. Son frecuentes en huesos con corticales delgadas. ✔
- d. Se produce una fractura completa del hueso.

La respuesta correcta es: Son frecuentes en huesos con corticales delgadas.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué maniobras incluiría en el tratamiento de la tortícolis muscular?

Seleccione una:

- a. Maniobras de masaje para disminuir el tono muscular.
- b. Movilizaciones pasivas de la cabeza.
- c. Estimular al niño para conseguir la movilización activa del músculo.
- d. Todas las anteriores. ✔

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la postura correcta de la cadera en el tratamiento de niños con luxación congénita de cadera?

Seleccione una:

- a. Abducción, flexión y rotación externa de cadera. ✔
- b. Aducción, flexión y rotación externa de cadera.
- c. Aducción, flexión y rotación interna de cadera.
- d. No importa la postura, pero hay que empezar a cargar el miembro cuanto antes.

La respuesta correcta es: Abducción, flexión y rotación externa de cadera.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la maniobra de Barlow:

Seleccione una:

- a. Se realiza con flexión de cadera de 45°.
- b. Abducción la pierna.
- c. Indica que la cadera es luxable. ✔
- d. Indica que la cadera está luxada.

La respuesta correcta es: Indica que la cadera es luxable.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la enfermedad de Osgood-Schlatter, señale la incorrecta:

Seleccione una:

a. Se trata de una inflamación dolorosa en la tuberosidad tibial anterior.

b. Producida por microtraumatismos de repetición sobre el cartílago de crecimiento.

c. Predomina en niños más que en niñas.

d. Se da en edades comprendidas entre los 4 y los 9 años. ✔

La respuesta correcta es: Se da en edades comprendidas entre los 4 y los 9 años.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas órtesis no se utiliza para tratar la displasia congénita de cadera?

Seleccione una:

a. Pañal de Frejka.

b. La férula de Von Rosen.

c. El arnés de Pavlik.

d. Férula de Asch. ✔

La respuesta correcta es: Férula de Asch.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la acondroplasia, señale la falsa:

Seleccione una:

a. Trastorno genético.

b. Caracterizada por una alteración ósea que ocasiona una falta de crecimiento normal de los huesos cortos. ✔

c. Presentan macrocefalia.

d. Se mantiene la longitud de la columna vertebral.

La respuesta correcta es: Caracterizada por una alteración ósea que ocasiona una falta de crecimiento normal de los huesos cortos.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señalar la recomendación incorrecta para pacientes con escoliosis:

Seleccione una:

a. Evitar mantener durante largos periodos de tiempo la misma postura, ya sea en sedestación, bipedestación o en decúbito.

b. En sedestación es muy importante que las sillas tengan respaldo, los reposabrazos no sean muy altos, para no sobrecargar la zona de los hombros, y que los asientos no sean demasiado altos, ni demasiado bajos. Los pies deben estar apoyados en el suelo y las rodillas no deben sobrepasar la altura de los muslos.

c. Evitar los tacones altos.

d. El colchón debe ser blando y elástico, para que se adapte al cuerpo. ✔

La respuesta correcta es: El colchón debe ser blando y elástico, para que se adapte al cuerpo.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La artritis crónica juvenil en la que se pueden afectar hasta 5, 6 y 7 articulaciones, se denomina:

Seleccione una:

a. AIJ sistémica.

b. AIJ psoriásica.

c. AIJ oligoarticular persistente.

d. AIJ oligoarticular extendida. ✔

La respuesta correcta es: AIJ oligoarticular extendida.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta falsa respecto a la plagiocefalia:

Seleccione una:

a. Se evidencia a partir de las 6 semanas tras el nacimiento.

b. La región occipital estará aplanada unilateralmente y habrá prominencia frontal y parietal del lado contrario. ✔

c. Más frecuente el aplanamiento del occipital derecho.

d. La nariz está centrada.

La respuesta correcta es: La región occipital estará aplanada unilateralmente y habrá prominencia frontal y parietal del lado contrario.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El síndrome del niño moldeado se manifiesta por:

Seleccione una:

a. Tortícolis, oblicuidad pélvica, escoliosis y plagiocefalia. ✔

b. Tortícolis, oblicuidad pélvica, escoliosis y craneosinostosis.

c. Tortícolis, displasia de cadera, escoliosis y craneosinostosis.

d. Tortícolis, displasia de cadera, escoliosis y plagiocefalia.

La respuesta correcta es: Tortícolis, oblicuidad pélvica, escoliosis y plagiocefalia.

Pregunta

19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En la valoración de la oblicuidad pélvica encontraremos:

Seleccione una:

a. El miembro inferior del lado afecto estará en aducción de cadera. ✖

b. Test de Ober positivo.

c. Test de Barlow positivo.

d. Limitación de las rotaciones de cadera.

La respuesta correcta es: Test de Ober positivo.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes test no se utiliza para valorar la displasia congénita de cadera?

Seleccione una:

a. Signo de Klisic.

b. Maniobra de telescopaje.

c. Signo de Galeazzi.

d. Test de Patrick Fabere. ✔

La respuesta correcta es: Test de Patrick Fabere.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta falsa sobre las osteocondritis:

Seleccione una:

a. Consiste en la afectación de los centros de osificación de las epífisis y de las estructuras relacionadas.

b. La clasificación de Catteral clasifica en función del grado de afectación de la osteocondritis de la cabeza femoral.

c. La enfermedad de Scheuermann provoca una hipercifosis dorsal que involucra al menos 5 vértebras, y cada una de ellas presenta un acuñamiento anterior mayor a 3º. ✔

d. La enfermedad de Panner asienta en el capitellium radial.

La respuesta correcta es: La enfermedad de Scheuermann provoca una hipercifosis dorsal que involucra al menos 5 vértebras, y cada una de ellas presenta un acuñamiento anterior mayor a 3º.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La osteocondritis del escafoides tarsiano se denomina:

Seleccione una:

- a. Enfermedad de Köhler I. ✔
- b. Enfermedad de Köhler II.
- c. Enfermedad de Freiberg.
- d. Enfermedad de Preiser.

La respuesta correcta es: Enfermedad de Köhler I.

Pregunta

23

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuál de las siguientes no es una característica de la Acondroplasia:

Seleccione una:

- a. Tienen una talla normal al nacer. ✖
- b. Las manos presentan el signo del tridente.
- c. Genu valgo.
- d. Fragilidad cervical.

La respuesta correcta es: Genu valgo.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La artrogriposis múltiple congénita:

Seleccione una:

a. Es un síndrome caracterizado por la existencia de contracturas congénitas no progresivas que afectan a dos o más articulaciones diferentes, especialmente en miembros superiores e inferiores. ✔

b. Es un síndrome caracterizado por la existencia de contracturas congénitas progresivas que afectan a dos o más articulaciones diferentes, especialmente en miembros superiores e inferiores.

c. Es un síndrome caracterizado por la existencia de contracturas congénitas no progresivas que afectan a tres o más articulaciones diferentes, especialmente en miembros superiores e inferiores.

d. Es un síndrome caracterizado por la existencia de contracturas congénitas no progresivas que afectan a dos o más articulaciones diferentes, especialmente en el raquis.

La respuesta correcta es: Es un síndrome caracterizado por la existencia de contracturas congénitas no progresivas que afectan a dos o más articulaciones diferentes, especialmente en miembros superiores e inferiores.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a las características de un vendaje funcional ¿cuál NO es correcta?:

Seleccione una:

a. Realiza una inmovilización selectiva de la articulación afectada.

b. Evita la atrofia muscular, la rigidez articular y la elongación ligamentosa.

c. Con el vendaje funcional es necesario que guarde reposo absoluto. ✔

d. Permite cierto grado de movilidad en aquellas estructuras músculo-tendinosas no lesionadas.

La respuesta correcta es: Con el vendaje funcional es necesario que guarde reposo absoluto.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los vendajes funcionales estarán indicados en entorsis de grado:

Seleccione una:

a. I.

b. I y II. ✔

c. En cualquier grado.

d. En II y III.

La respuesta correcta es: I y II.

Pregunta

27

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las siguientes afirmaciones son indicaciones del vendaje funcional excepto una, señálela:

Seleccione una:

a. Laxitudes ligamentosas.

b. Rotura de fibras musculares. ✖

c. Rotura de ligamentos.

d. Desgarro en los tendones.

La respuesta correcta es: Rotura de ligamentos.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señalar la respuesta correcta sobre la escoliosis:

Seleccione una:

a. La escoliosis es una deformidad de la columna en el plano sagital.

b. Se caracteriza por una o más desviaciones laterales del raquis asociadas o no a una rotación de los cuerpos vertebrales.

c. Es importante diferenciar las escoliosis estructuradas, sin rotación de los cuerpos vertebrales, de las actitudes escolióticas que presentan esa rotación de los cuerpos vertebrales aunque fácilmente corregible.

d. Se nombra escoliosis derecha o izquierda según el lado al que se dirija la covexidad. ✔

La respuesta correcta es: Se nombra escoliosis derecha o izquierda según el lado al que se dirija la covexidad.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señalar la respuesta incorrecta sobre la valoración del paciente con escoliosis:

Seleccione una:

a. Para tomar el valor de las flechas frontales el terapeuta se sitúa detrás del paciente y con la plomada situada desde la espinosa de C7 mide la distancia que hay entre la apófisis espinosa de la vértebra ápex hasta la plomada.

b. El Test de Adams sirve para diferenciar una escoliosis de una actitud escoliótica.

c. En el Test de Adams se pide una flexión anterior del tronco, con las rodillas extendidas y los brazos colgando. El terapeuta se sitúa delante del paciente y observa si aparece un desnivel (giba) lo que indica que es una escoliosis estructurada y no una actitud escoliótica. ✔

d. El Bending Test sirve para ver el grado de corrección de las curvas escolióticas.

La respuesta correcta es: En el Test de Adams se pide una flexión anterior del tronco, con las rodillas extendidas y los brazos colgando. El terapeuta se sitúa delante del paciente y observa si aparece un desnivel (giba) lo que indica que es una escoliosis estructurada y no una actitud escoliótica.

Pregunta

30

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta sobre el efecto del deporte sobre la escoliosis:

Seleccione una:

a. Hay sobrada evidencia científica que demuestra los efectos beneficiosos del deporte como ejercicio para la escoliosis.

b. La Sociedad Científica Internacional de Ortopedia y tratamiento de la escoliosis (SOSORT) actualizó en el año 2011 las directrices sobre el tratamiento conservador de la escoliosis según literatura relevante disponible y recomendó que el deporte no se prescribiera como tratamiento en la escoliosis idiopática. ✖

c. Será importante tener en cuenta que, a partir de los 10 o 12 años, es un período donde el exceso de entrenamiento puede influir negativamente sobre la columna en crecimiento, coincidiendo con el brote puberal.

d. Hay autores que recomiendan que en curvas a partir de 25 grados se realice un estudio cardiopulmonar y proporcionar un programa adaptado de entrenamiento físico.

La respuesta correcta es: Hay sobrada evidencia científica que demuestra los efectos beneficiosos del deporte como ejercicio para la escoliosis.

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

https://www.fuden.es