

AUTOTEST DEL MÓDULO

A continuación vamos a plantear 5 preguntas con varias opciones de respuesta.
Para superarlo deberá obtener una puntuación igual o superior al 70%
¡A por ello!

1

En los ensayos clínicos destinados a la evaluación de fármacos/vacunas los objetivos más importantes para la obtención de conclusiones son:

- ☐ a) Objetivos primarios múltiples, co-primarios y secundarios.
- ☐ b) Objetivos primarios, co-primarios, secundarios y terciarios.
- ☐ c) Objetivos primarios matizados por objetivos terciarios.
- ☐ d) Objetivos terciarios.
- ☐ e) A y B son correctas.

2

Decir que una vacuna es superior a la comparadora por el hecho de que haya demostrado no inferioridad:

- ☐ a) No es correcto.
- ☐ b) Es correcto.
- ☐ c) Depende del margen de no inferioridad establecido.
- ☐ d) Depende del valor p obtenido para el estudio de no inferioridad.
- ☐ e) Todas las respuestas son falsas.

3

Según las guías de la EMA sobre evaluación de ensayos clínicos en vacunas:

- ☐ a) El porcentaje de respondedores que alcanzan un umbral determinado es utilizado como parámetro para evaluar la no-inferioridad respecto a la vacuna comparadora.
- ☐ b) En el contexto de la primovacunación en población pediátrica, se recomienda el mínimo número de dosis necesarias para alcanzar el COP o la máxima respuesta inmunológica (cuando el COP no está establecido).
- ☐ c) Aunque el valor del correlato inmune es el mismo para todos los serotipos determinados estudios indican que podría ser diferente para diferentes serotipos.
- ☐ d) B y C son correctas.
- ☐ e) Todas son correctas.

4 Respecto a la evaluación de vacunas neumocócicas conjugadas, es cierto que:

- ☐ a) Es un proceso relativamente sencillo puesto que existe un correlato inmune de protección que se puede aplicar a todas las edades de la vida.
- ☐ b) Hacer el proceso de evaluación comparando con vacunas ya autorizadas permite comparar datos de inmunogenicidad y seguridad.
- ☐ c) El correlato inmune de protección lo podremos utilizar sólo para las vacunas infantiles pero frente a todas las formas de enfermedad neumocócica.
- ☐ d) No existe un correlato inmune de protección para las vacunas neumocócicas.
- ☐ e) Todas las respuestas son correctas.

5 Señale cuál de los siguientes tipos de evaluación económica es el más utilizado en el ámbito de la Vacunología:

- ☐ a) Coste-beneficio.
- ☐ b) Coste-efectividad.
- ☐ c) Coste-utilidad.
- ☐ d) Maximización de costes.
- ☐ e) B y D son correctas.

¡Enhorabuena!, ha completado el test.

Puntuación: 80%.

¡Buen trabajo!

[SALIR](#)

[REPETIR TEST](#)