

COMUNICACIÓN Y HABILIDADES RELACIONALES CON PACIENTES CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) PARA ENFERMERÍA:

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué edad se considera normal decir “papa” y “mama”?

b. A los 12 meses.

Pregunta 2

El tratamiento de los TEA ha avanzado mucho, de tal manera que:

d. Todas son correctas.

Pregunta 3

El perfil individual de los pacientes con TEA también puede estar condicionado por la aparición de algunas dificultades asociadas:

d. Todas son correctas.

Pregunta 4

Buena parte de las personas con TEA consideran que:

B .Las características que implican un trastorno no suponen algo negativo si no que prefieren hablar de una condición.

Pregunta 5

Las personas con TEA:

a. Pueden mostrar limitaciones para expresar sus sentimientos.

Pregunta 6

Los pacientes con Síndrome de Asperger serán identificados con personas con Trastorno del Espectro del Autista:

a. No tienen discapacidad intelectual asociada.

Pregunta 7

¿A que edad se considera un signo patológico que un/a niño/a no emita palabra alguna?

b. A los 18 meses, no emitir ninguna palabra.

Pregunta 8

En los últimos estudios sobre las causas del TEA se ha determinado:

b. Las causas son multifactoriales.

Pregunta 9

En los TEA se pone de manifiesto trastornos en el funcionamiento cerebral. ¿En que áreas se muestra?

d. Todas son correctas.

Pregunta 10

Los objetivos de la intervención y apoyo a los pacientes con TEA deben ir orientados a:

d. Todas son correctas.

Pregunta 11

¿Qué habilidades no destacaríamos en los pacientes con TEA?

c. Conocimiento impreciso sobre áreas de conocimiento.

Pregunta 12

La participación del niño/a en su contexto educativo y con su grupo de iguales es fundamental. Indique la opción incorrecta.

a. Evaluación psicoeducativa adaptada al entorno del niño.

Pregunta 13

Los TEA son pacientes que sufren:

d. Es una enfermedad genética.

Pregunta 14

Se ha podido demostrar que la vacuna del tétanos inyectada en embarazadas con tiempo de gestación mayor de 20 semanas:

Las vacunas tienen estudios de la fiabilidad de su administración y no provocan TEA.

¿En qué momento se suele manifestar los TEA?

b. A partir de los dos años de vida.

Pregunta 16

¿Hay diferencia entre hombres y mujeres que manifiestan TEA?

a. Hay más hombres.

Pregunta 17

¿Qué habilidades destacaríamos en los pacientes con TEA?

d. Todas son correctas.

Pregunta 18

Existen una serie de necesidades que deben ser tenidas en cuenta a lo largo de toda la vida y en todas las etapas y que están relacionadas con la calidad de vida:

d. Todas son correctas,

Pregunta 19

¿A qué edad se desarrolla la detección específica?

b. Entre los 5-6 años.

Pregunta 20

¿Cuál de los siguientes ítems no corresponde a un método de detección del TEA?

d. Se aíslan y no quieren participar.