

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACCESOS VASCULARES PARA ENFERMERÍA (ZXV09)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA > EXPERTOS 20 ECTS EUNEIZ > ZXV09 > UNIDAD 1 > TEST UNIDAD 1

Comenzado el	lunes, 30 de junio de 2025, 18:41
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 30 de junio de 2025, 19:29
Tiempo empleado	48 minutos 39 segundos
Puntos	98,00/100,00
Calificación	9,80 de 10,00 (98%)
Comentario -	APROBADO

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

133.- La implicación en Comités de calidad es una función del enfermero:

Seleccione una:

- a. Docente.
- b. Gestor.  ¡Bien, correcto!
- c. Investigador.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

107.- En qué fecha se canalizó la primera vía central:

Seleccione una:

- a. 1959.
- b. 1945.  ¡Bien, correcto!
- c. 1952.
- d. 1935.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

408.- Sobre la vía intramuscular, señale la cierta:

Seleccione una:

- a. Nunca podremos utilizar la cara lateral externa del cuádriceps y el deltoides.
- b. Es más rápida que la vía subcutánea. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. El principal punto de punción es el glúteo menor en su cuadrante superior interno.
- d. La administración del fármaco es directamente en el tejido epidérmico.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

423.- Sobre la anticoagulación de las vías venosas:

Seleccione una:

- a. Se puede emplear heparina previamente preparada (con una concentración de 209 UI/ml) o preparar una solución diluida de heparina a partir de heparina sódica al 16%.
- b. Se puede emplear heparina previamente preparada (con una concentración de 20 UI/ml) o preparar una solución diluida de heparina a partir de heparina sódica al 70%.
- c. Se puede emplear heparina previamente preparada (con una concentración de 2000 UI/ml) o preparar una solución diluida de heparina a partir de heparina sódica al 1%.
- d. Se puede emplear heparina previamente preparada (con una concentración de 20 UI/ml) o preparar una solución diluida de heparina a partir de heparina sódica al 1%. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

209.- Es cierto que para la inserción de catéteres arteriales la arteria cubital:

Seleccione una:

- a. Es la más frecuentemente utilizada.
- b. Es de fácil acceso y muy buena perfusión tisular.
- c. Es de muy bajo uso por el riesgo de mala circulación colateral. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Es de muy bajo uso por el riesgo de extravasación.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

103.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Seleccione una:

- a. En 1582 John Lumley donó al Royal College of Physicians los fondos necesarios para contratar un Profesor de Anatomía.
- b. En 1628, en la cuarta lectura del Lumleian, William Harvey describe la circulación arteriovenosa sistémica.
- c. En 1924 se tuvo conocimiento de que el médico de Damasco Ibn an Nafis (1213- 1288) ya había publicado el descubrimiento de la circulación arteriovenosa pulmonar.
- d. Todas las afirmaciones son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

112.- Cuantos artículos tiene esta resolución:

Seleccione una:

- a. Uno.
- b. Cuatro. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Cinco.
- d. Siete.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

545.- En la administración de quimioterápicos, los cambios de bata se harán:

Seleccione una:

- a. Siempre una vez al día.
- b. Después de un uso de media hora o inmediatamente antes de un derrame o una salpicadura.
- c. Antes de un uso de 12 ó 13 horas o inmediatamente después de un derrame o una salpicadura.
- d. Después de un uso de 2 ó 3 horas o inmediatamente después de un derrame o una salpicadura. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

324.- El objetivo principal es la reposición del líquido del interior de la célula. Hablamos de:

Seleccione una:

- a. Soluciones hipertónicas.
- b. Soluciones Acidificantes.
- c. Soluciones Hipotónicas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Soluciones Alcalinizantes.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

525.- En el manejo de la hemorragia masiva, el objetivo principal es mantener una TAS de:

Seleccione una:

- a. 157 mmHg sin controlar el foco hemorrágico.
- b. 190 mmHg hasta controlar el foco ectópico.
- c. 90 mmHg hasta controlar el foco hemorrágico. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas falsas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

201.- Respecto a la vena basilica:

Seleccione una:

- a. Se origina en el plexo venoso dorsal de la mano, y asciende por la superficie la superficie anterolateral del antebrazo
- b. Se origina en el plexo venoso dorsal de la mano, y asciende por la superficie posteromedial del antebrazo. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Se origina en la tabaquera anatómica, asciende por la superficie anterolateral hasta cruzar el codo.
- d. Se origina en la fosa del codo, y es la que conecta las venas basilica y cefálica.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

106.- Que científico realizó estudios con azúcar en animales y provocó que la vía intravenosa fuera propuesta como técnica para fines nutritivos:

Seleccione una:

- a. Alexander Wood.
- b. Charles Gabriel Pravaz.
- c. Claude Bernard. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Semmellweiss.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

520.- Los componentes sanguíneos almacenados en el banco de sangre pueden sufrir alteraciones metabólicas del contenido y pueden provocar:

Seleccione una:

- a. Alteraciones funcionales.
- b. Hipercalcemia.
- c. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Hipotermia.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

415.- Forma parte de la preparación segura y limpia de medicación:

Seleccione una:

- a. Leer y revisar la prescripción médica.
- b. Higienizar y limpiar la superficie.
- c. Preparar y tener disponibles todos los materiales fungibles.
- d. Todas correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

506.- Para la administración de componentes sanguíneos: Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Se hará higiene de manos según las recomendaciones de la OMS.
- b. Se precisa colocar guantes.
- c. No se precisa la colocación de guantes. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Es preciso verificar y asegurarse de contar con todo el material necesario.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

419.- Cuando las manos presentan suciedad evidente o están contaminadas con sangre u otros fluidos corporales, se recomienda lavarlas con:

Seleccione una:

- a. Agua y jabón no antimicrobiano o agua y jabón antimicrobiano. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Agua solamente.
- c. Clorhexidina.
- d. Agua caliente y lejía.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

114.- Que guías recomiendan la disponibilidad de este tipo de terapias y dispositivos:

Seleccione una:

- a. RAO.
- b. CDC.
- c. ERC.
- d. A y B son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

521.- Ante una reacción hipotensiva en las transfusiones:

Seleccione una:

- a. Administrar una carga de 500 – 1.000 ml de nitroglicerina.
- b. Colocar al paciente en posición de Trendelemburg. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Nunca usar drogas vasoactivas.
- d. Todas ciertas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

204.- El principal vaso de la región torácico para la inserción de catéteres centrales es:

Seleccione una:

- a. Vena cava.
- b. Vena cefálica.
- c. Vena subclavia. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Vena axilar.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

318.- Sobre la hipovolemia:

Seleccione una:

- a. Esta sucede cuando se excreta un volumen mayor de líquido extracelular que los líquidos que se ingresan.
- b. Se define como la pérdida de agua y electrolitos en la misma proporción que están presentes en los líquidos corporales.
- c. La formación de un tercer espacio (edema), en quemaduras o ascitis, también produce o provoca un déficit de volumen de líquidos.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

553.- Señale cuál de los siguientes no es antídoto de citostáticos:

Seleccione una:

- a. Metamizol. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Tiosulfato de sodio.
- c. Hialuronidasa.
- d. Dimetilsulfóxido.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

514.- La transmisión de enfermedades infecciosas es una reacción adversa:

Seleccione una:

- a. Retardada no inmune. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Retardada e inmune.
- c. Inmediata no inmune.
- d. Inmediata inmune.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

503.- Dentro de las precauciones en la transfusión, se incluyen aquellas dirigidas a prevenir la:

Seleccione una:

- a. Reacción hemocigótica local.
- b. Reacción hemofóbica crónica.
- c. Reacción hemolítica aguda. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Reacción hemofílica aguda.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

328.- Dentro de las soluciones coloides encontramos.

Seleccione una:

- a. Albúminas.
- b. Dextranos.
- c. Hidroxietilalmidón.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

208.- Para la inserción de catéteres arteriales la arteria más frecuentemente utilizada por su fácil accesibilidad:

Seleccione una:

- a. Arteria cubital
- b. Arteria radial. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Arteria femoral.
- d. Arteria cubital.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

314.- Cual es el motivo principal de la hipopotasemia:

Seleccione una:

- a. Los sistemas de diálisis.
- b. Las pérdidas intestinales mediante el vómito, aspiración gástrica o diarrea. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Uso excesivo de bicarbonato de sodio.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

542.- La sustancia que se suele usar para curar PICC (Peripheral Insertion Central Catheter) es:

Seleccione una:

- a. Nitrato de plata.
- b. Clorhexidina acuosa al 2%. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Efedrina 2%.
- d. Povidona yodada jabonosa siempre.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

322.- Señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Un incremento de 0,9 kg de peso en 24h equivaldría a una retención de casi 1L de líquidos corporales. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Un incremento de 0,8 kg de peso en 24h equivaldría a una retención de casi 1L de líquidos corporales.
- c. Un incremento de 1 kg de peso en 24h equivaldría a una retención de casi 1L de líquidos corporales.
- d. Todas son incorrectas.

Pregunta 29

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

533.- Algunas situaciones en las que la nutrición parenteral no estaría recomendada son: Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Función gastrointestinal intacta.
- b. Trastornos metabólicos inestables. ✗ Mal, debes repasar un poco
- c. Enfermedad aguda leve.
- d. Imposibilidad de acceso venoso seguro.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

302.- Qué órganos son los encargados de regular el equilibrio hidroelectrolítico.

Seleccione una:

- a. Los pulmones.
- b. Los riñones. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Las glándulas suprarrenales.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

312.- Entre las manifestaciones clínicas de la hiponatremia encontramos:

Seleccione una:

- a. Anasarca en fases avanzadas. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Hemorragias subaracnoideas.
- c. Anorexia y nauseas.
- d. Parestesias.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

127.- El marco de actuación viene recogido en:

Seleccione una:

- a. Artículo 1.
- b. Artículo 2.
- c. Artículo 3. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Artículo 4.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

215.- Es cierto que la vena femoral profunda:

Seleccione una:

- a. No se utiliza para la inserción de catéteres venosos centrales.
- b. Se convierte en vena ilíaca externa cuando pasa por debajo del ligamento inguinal. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Es la más utilizada para la inserción de catéteres centrales.
- d. Son todas falsas.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

310.- Sobre el potasio podemos decir:

Seleccione una:

- a. Un 98% del potasio total de nuestro cuerpo se encuentra en el exterior de nuestras células.
- b. La concentración de potasio en el líquido extracelular es de 5,5 mEq/L.
- c. El potasio está estrechamente ligado a la función renal, ya que alrededor de un 80% es excretado diariamente por vía renal mientras que el 20% restante se excreta por heces y sudor. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. 65-70 mEq del total del potasio corporal se encuentra dentro de la célula.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

121.- En qué preámbulo se describen las competencias mínimas que la Enfermería debe tener sobre la base de sus conocimientos y capacidades adquiridas:

Seleccione una:

- a. Preámbulo I.
- b. Preámbulo II.
- c. Preámbulo III. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Preámbulo IV.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

301.- Los órganos reguladores de la homeostasia son:

Seleccione una:

- a. Los pulmones.
- b. El corazón.
- c. Las glándulas suprarrenales.
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

510.- Debemos tomar las constantes:

Seleccione una:

- a. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Antes de comenzar la transfusión.
- c. A los 15 minutos de haber iniciado la transfusión.
- d. En caso de cualquier incidente y al final de la transfusión.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

129.- Dentro de la asistencia, el Enfermero de accesos vasculares no debe:

Seleccione una:

- a. Planificar el informe de alta y realizar el informe de alta.
- b. Ninguna es correcta. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Decidir qué tipo de dispositivo es el más apropiado en cada situación.
- d. Conocer y aplicar los cuidados necesarios para el mantenimiento del catéter, mediante el empleo de las guías de práctica clínica y evidencia disponibles.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

543.- En la implantación del Catéter Hickman:

Seleccione una:

- a. Se recomienda la utilización de clorhexidina acuosa o alcohólica al 25%.
- b. No usar alcohol de 70 ya que puede dañar la silicona del catéter. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Se recomienda la utilización de usar alcohol de 70.
- d. No se debe usar antiséptico alguno.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

331.- Señala la afirmación incorrecta:

Seleccione una:

- a. 20 gotas equivalen a 1 ml.
- b. 1 gota equivale a 3 microgotas.
- c. 60 microgotas equivalen a 1 ml.
- d. 1 gota equivale a 0,5 ml. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

558.- La administración intramuscular de la quimioterapia será mediante inyección:

Seleccione una:

- a. Es indiferente la forma de administración.
- b. Discontinua.
- c. Rápida.
- d. Lenta y continua. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

308.- Señale la afirmación correcta sobre el Magnesio:

Seleccione una:

- a. Su equilibrio es de suma importancia para la función neuromuscular del organismo.
- b. Actúa directamente sobre las arterias y arteriolas periféricas, causando una caída de la resistencia periférica total.
- c. Su principal función es la de activador de multitud de sistemas enzimáticos celulares y también cabe destacar su función en el metabolismo de carbohidratos y proteínas.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

402.- Las interacciones farmacológicas pueden producirse por administración conjunta de:

Seleccione una:

- a. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Fármaco-alimento.
- c. Fármaco bebida.
- d. Fármaco-contaminante ambiental.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

329.- La solución formada por polisacáridos de síntesis bacteriana es:

Seleccione una:

- a. Dextranos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Derivados de la gelatina.
- c. Manitol.
- d. Hidroxietilalmidón.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

338.- ¿Qué afirmación es correcta en referente a los PICC?

Seleccione una:

- a. Son catéteres tunelizados de inserción percutánea.
- b. La vena de elección es la mediana antecubital.
- c. Se requiere de ecoguía para su inserción. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son correctas.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

406.- Es ventaja de la vía tópica:

Seleccione una:

- a. Limita las actividades de la persona.
- b. Puede irritar la piel.
- c. No produce daños a otros órganos. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas falsas.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

504.- En el lavado de eritrocitos siempre que se utilicen eritrocitos en un banco de sangre para cualquier estudio, deben ser lavados:

Seleccione una:

- a. Una vez.
- b. Quince veces.
- c. Diez veces.
- d. Tres veces. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

207.- La vena de elección para la inserción de catéteres centrales en las extremidades inferiores es:

Seleccione una:

- a. Vena cava inferior.
- b. Vena ilíaca.
- c. Vena ilíaca externa.
- d. Vena femoral profunda. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

118.- Dentro de las indicaciones para la inserción de PICC encontramos:

Seleccione una:

- a. Pacientes con enfermedad renal avanzada que puedan ser infundidos por una vía periférica.
- b. Infusiones de cuidados paliativos en situaciones de final de vida. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Flebotomías no frecuentes.
- d. Obtención de muestras sanguíneas.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

536.- La NP puede venir en soluciones:

Seleccione una:

- a. Siempre sin aminoácidos.
- b. Maltosa solamente.
- c. Dextrosa y aminoácidos. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Fructosa y lactosa para pacientes psiquiátricos.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

332.- Si tienes que infundir 1000 ml en 24 horas ¿Qué velocidad de infusión usarías?:

Seleccione una:

- a. 20,83 ml/h
- b. 40,8 microgotas/min. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 6,9 gotas/min.
- d. 3,5 gotas/min.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

410.- Sobre la vía inhalatoria, es falso que:

Seleccione una:

- a. Es muy dolorosa. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Se requieren dosis pequeñas del fármaco.
- c. Los efectos aparecen muy rápidamente.
- d. No tiene efecto sistémico.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

555.- La diarrea se asocia al tratamiento citostático cuando:

Seleccione una:

- a. Existen 3 evacuaciones semiblandas en las 24 horas siguientes a la administración de quimioterapia sin dolor cólico y sin distensión abdominal.
- b. Existen 3 ó más evacuaciones normales en las 24 horas anteriores a la administración de quimioterapia y acompañada de dolor cólico sin distensión abdominal.
- c. Existen 3 ó más evacuaciones líquidas en las 24 horas siguientes a la administración de quimioterapia y acompañada de dolor cólico y distensión abdominal. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Existen 1 ó 2 evacuaciones líquidas en las 24 horas siguientes a la administración de quimioterapia y acompañada de dolor cólico y distensión abdominal.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

116.- Antes del uso de terapia intravenosa se deben tener en cuenta ciertas consideraciones:

Seleccione una:

- a. Paciente.
- b. Tipo de dispositivo.
- c. Tipo de terapia.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

102.- Que autor empleó por primera vez la palabra circulación para describir que la sangre regresaba al punto de partida:

Seleccione una:

- a. Andrea Cesalpino. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Miguel Servet.
- c. John Lumley.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

501.- Si la reacción es contra antígenos de glóbulos rojos se denomina:

Seleccione una:

- a. Aloimmunización antiplaquetaria.
- b. Aloimmunización antieritrocitaria. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Antiplaquetación retrógrada.
- d. Todas falsas.

Pregunta 57

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

316.- En la hipercalcemia:

Seleccione una:

- a. En las manifestaciones clínicas se encuentra la falta de coordinación.
- b. En el tratamiento médico encontramos la administración de diuréticos.
- c. En los cuidados de enfermería el fomento de la deambulacion y el consumo de líquidos pueden prevenir la aparición de hipercalcemia o disminuir su intensidad. ✗ Mal, debes repasar un poco
- d. Todas son correctas.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

138.- Señale la afirmación falsa en los equipos de infusión y acceso vascular:

Seleccione una:

- a. Es un equipo de enfermeros y TCAES expertos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Orientado en la seguridad y la mejora de la calidad de vida del paciente.
- c. Trabaja en colaboración con un equipo multidisciplinar.
- d. Todas las opciones son falsas.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

313.- Entre las manifestaciones clínicas de la hiponatremia podemos ver:

Seleccione una:

- a. Estrechamiento y elevación de la onda T.
- b. Debilidad muscular.
- c. Poliuria.
- d. B y C son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

523.- Al administrar una transfusión a una embarazada:

Seleccione una:

- a. Utilizar un equipo de infusión sin filtro.
- b. No será necesario evaluar la historia clínica de la paciente.
- c. Iniciar la transfusión a una velocidad lenta al principio (10 – 15 ml/min) y observar a la paciente durante los primeros 15 minutos. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Obviar el consentimiento informado de la paciente por escrito.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

546.- Las náuseas y vómitos de pacientes en tratamiento con quimioterapia están presentes en el:

Seleccione una:

- a. 50% aproximadamente. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. 1%.
- c. 12%.
- d. 71%.

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

549.- Son recomendaciones para el estreñimiento de pacientes tratados con quimioterapia:

Seleccione una:

- a. Hacer ejercicio diariamente como andar.
- b. Aumentar ingesta de líquidos.
- c. Alimentos ricos en fibra.
- d. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

211.- La cavidad torácica, está rodeada por la pared del tórax y el diafragma donde encontramos 3 cavidades que son:

Seleccione una:

- a. Cavidad pleural derecha, izquierda y cavidad media.
- b. Cavidad pleural derecha, izquierda y diafragma.
- c. Cavidad pleural derecha, izquierda y mediastino. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Cavidad pleural, mediastino y corazón.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

213.- El cuello se encuentra dividido en 4 compartimentos:

Seleccione una:

- a. Compartimento visceral, 2 compartimentos vertebrales y 1 compartimento vascular.
- b. Compartimento visceral, compartimento vertebral, compartimento vascular y compartimento venoso.
- c. Compartimento visceral, compartimento vertebral y 2 compartimentos vasculares. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Compartimento visceral, compartimento vertebral, compartimento vascular y compartimento arterial.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

140.- Señala la afirmación correcta en la evidencia respecto a equipos de expertos en accesos vasculares:

Seleccione una:

- a. Según una revisión de Chocrane se define equipo de expertos en accesos vasculares (EIAV) como el grupo de personal de asistencia sanitaria que tiene conocimiento y aptitudes avanzadas en la evaluación, inserción y tratamiento de los dispositivos de acceso vascular y equipos de infusión intravenosa de tratamientos.
- b. Las tasas identificadas del fracaso del primer intento de inserción periférica son de un 12% a un 26% en adultos y de un 24% a un 54% en los niños.
- c. Según el Estudio Nacional de Efectos Adversos (ENEAS), la incidencia de pacientes con efectos adversos relacionados con la asistencia hospitalaria es del 8,4%, de los cuales el 25,34% de las infecciones habían sido desarrolladas en el hospital.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

512.- Son consideraciones a tener en cuenta respecto de la transfusión:

Seleccione una:

- a. En caso de transfundir a través de catéter de doble luz, se hará por la luz distal.
- b. Evitar administrar fármacos o sueros simultáneamente con hemoderivados, excepto suero fisiológico que es el único compatible. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Si el paciente tiene instaurado un catéter venoso, no lavar la vía ni antes ni después de la administración.
- d. Cambiar el sistema con cada unidad transfundida, no debiendo permanecer más de 34 horas.

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

502.- Cruzamiento de sangre es:

Seleccione una:

- a. Una medida preventiva donde se mezclan muestras de sangre del donante y receptor. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Una medida paliativa donde se mezclan muestras de sangre y LCR.
- c. Una medida preventiva donde se mezclan plaquetas y linfocitos de diez en diez.
- d. Una medida preventiva donde se mezclan basófilos y eosinófilos sólo.

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

120.- En que preámbulo se hace alusión a la necesidad de especialización de Enfermería en accesos vasculares:

Seleccione una:

- a. Preámbulo I.
- b. Preámbulo II. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Preámbulo III.
- d. Preámbulo IV.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

202.- Diferenciamos 3 grandes regiones anatómicas para la inserción de catéteres venosos centrales que son:

Seleccione una:

- a. Axila, tórax y cuello. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Brazos, tórax y cuello.
- c. Miembros inferiores, axila y cuello.
- d. Miembros inferiores, brazos y tórax

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

315.- Señale la afirmación falsa sobre la hipocalcemia:

Seleccione una:

- a. La tetania es característica tanto en hipocalcemia como en hipomagnesemia.
- b. Dentro de las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia encontramos las convulsiones.
- c. Electrocardiográficamente un acortamiento del intervalo QT. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Puede producir "Torsades de pointes".

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

404.- En la pomada el principio activo se encuentra mezclado con una base de:

Seleccione una:

- a. Lanolina
- b. Vaselina
- c. Otras sustancias grasas.
- d. Todas ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

115.- Que guía establece el marco conceptual para conseguir que el rigor científico en indicaciones clínicas y los tipos de dispositivos utilizados sean adecuados.

Seleccione una:

- a. RNAO.
- b. CDC.
- c. MAGIC. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

337.- ¿Qué catéter contiene el manguito dracon a 1 cm de la salida?

Seleccione una:

- a. Hickman. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. PICC.
- c. Línea media.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

111.- Cuantos preámbulos tiene esta resolución:

Seleccione una:

- a. I y II.
- b. I, II y III.
- c. I, II, III y IV. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. I, II, III, IV y V.

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

531.- Los sistemas de hemovigilancia abarcan:

Seleccione una:

- a. Sólo la donación de sangre.
- b. Desde la donación de sangre hasta el cuidado post-transfusional del paciente. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Sólo el cuidado post-transfusional del paciente.
- d. No abarcan función alguna hasta que se anula la transfusión.

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

540.- El síndrome de realimentación (Síndrome de Refeeding):

Seleccione una:

- a. Puede producirse cuando se inicia la NP demasiado rápido en pacientes que están severamente desnutridos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Siempre se produce cuando se inicia la NP demasiado lento en pacientes que están severamente nutridos.
- c. Se caracteriza por cambios leves en electrolitos y fluidos, pero no disfunción de órganos.
- d. Nunca afecta a electrolitos y fluidos.

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

125.- El ámbito de actuación del Enfermero de accesos vasculares está definido en:

Seleccione una:

- a. Preámbulo II.
- b. Artículo 1.
- c. Artículo 2. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Preámbulo III.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

507.- Al preparar al paciente para administrar hemoderivados es necesario:

Seleccione una:

- a. Colocar al paciente en una postura cómoda que pueda tolerar. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Evitar preservar la intimidad y confidencialidad del paciente.
- c. Obviar la identificación del paciente.
- d. Desinformar al paciente y/o familia sobre el procedimiento.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

320.- Cual de los siguientes desequilibrios electrolíticos sucede en la insuficiencia suprarrenal:

Seleccione una:

- a. Hipocalcemia.
- b. Hiperkalemia. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Hiponatremia.
- d. Hipernatremia.

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

119.- Dentro de las reglas a la hora de la administración de la medicación intravenosa no encontramos:

Seleccione una:

- a. Asegurarse de administrar los fármacos juntos en la misma infusión. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Asegurarse de administrar la dosis correcta en cada momento.
- c. Asegurarse de administrar la medicación a la hora correcta.
- d. Asegurarse de administrar la medicación por la vía correcta.

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

304.- Qué glándula segrega la hormona antidiurética:

Seleccione una:

- a. Las glándulas suprarrenales.
- b. Las glándulas paratiroides.
- c. La hipófisis. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. La glándula tiroidea.

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

518.- Ante una reacción alérgica transfusional:

Seleccione una:

- a. Administrar antihistamínicos V.O en el caso de reacción urticariforme, si cede el cuadro en pocas horas se puede continuar con la transfusión.
- b. Administrar antihistamínicos IV en el caso de reacción urticariforme, si cede el cuadro en pocos minutos se puede continuar con la transfusión. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Administrar antihistamínicos IV en el caso de reacción urticariforme, si cede el cuadro en pocos minutos nunca se puede continuar con la transfusión.
- d. Todas falsas.

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

524.- La hemorragia masiva implica una pérdida de volemia de aproximadamente:

Seleccione una:

- a. El 1 % del peso ideal de un adulto en 24 horas.
- b. El 7 % del peso ideal de un adulto en 24 horas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. El 3 % del peso ideal de un adulto en 24 horas.
- d. El 2 % del peso ideal de un adulto en 24 horas.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

554.- Es necesario que paciente y familia entiendan el proceso de tratamiento con quimioterapia y entre las recomendaciones no están:

Seleccione una:

- a. No entender la razón del tratamiento. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Manejo de efectos secundarios.
- c. Detallar horario y frecuencia de administración.
- d. Seguridad y administración adecuada.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

505.- La prueba de antiglobulina cruzada (Coombs indirecta) se realiza con el propósito de detectar:

Seleccione una:

- a. Todas ciertas.
- b. Posibles anticuerpos anormales en el suero del donante que puedan reaccionar con las plaquetas del donante.
- c. Posibles anticuerpos anormales en el suero del receptor que puedan reaccionar con los glóbulos rojos del donante. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Posibles antígenos normales en el suero del donante que puedan reaccionar con los glóbulos blancos del donante.

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

534.- Nutrición Parenteral Periférica (NPP) está indicada cuando la persona requiere alimentación:

Seleccione una:

- a. Por un periodo inferior a 7-10 horas y/o en pacientes en los que no es posible o está indicada la NPC.
- b. Por un periodo entre 7-10 horas y/o en pacientes en los que no es posible o está indicada la NPC.
- c. Ninguna es cierta.
- d. Por un periodo superior a 7-10 días y/o en pacientes en los que no es posible o está contraindicada la NPC. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

413.- La preparación de medicamentos incluye:

Seleccione una:

- a. a.Reconstitución, la individualización de la dosis, dilución, identificación y desacondicionamiento final del medicamento.
- b. b. Reconstitución, la individualización de la dosis, dilución, identificación y acondicionamiento final del medicamento. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. c. Reconstitución, la generalización de la dosis, dilución, identificación y acondicionamiento final del medicamento.
- d. Todas falsas.

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

430.- La luz proximal del catéter central de tres luces se emplea para:

Seleccione una:

- a. Nutrición parenteral.
- b. Antibióticos.
- c. Diuréticos.
- d. Administración de aminas vasoactivas, sedación y analgesia. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

418.- El primero en vincular el acto de lavarse las manos con la propagación de enfermedades infecciosas fue:

Seleccione una:

- a. Eickoff.
- b. Semmelweis. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Darwin.
- d. Cardoso.

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

325.- Las soluciones hipertónicas:

Seleccione una:

- a. Se suelen emplear en el tratamiento de la hipernatremia, así como otros estados de hiperosmolaridad.
- b. La más común es el cloruro sódico al 0,45%.
- c. Ejercen mayor presión osmótica que el líquido extracelular ✓ ¡Bien, correcto!
- d. El uso indiscriminado puede generar una disminución del líquido intravascular, ocasionando a su vez un edema celular.

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

511.- La duración de la administración de una transfusión de hematíes de 200-300ml debe ser de:

Seleccione una:

- a. 30 min.
- b. 15 min.
- c. 60-120min. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. 6-10min.

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

429.- En un catéter central de tres luces tiene el mayor calibre la luz:

Seleccione una:

- a. Proximal.
- b. Medial.
- c. Distal ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Inicial.

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

104.- Señale el autor al que se debe el comienzo de la terapia intravenosa en humanos:

Seleccione una:

- a. Dr. Tomas Latta.
- b. Ibn an Nafis.
- c. Johann Daniel Mayor. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. John Lumley.

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

401.- Si la sustancia produce un efecto favorable para el organismo, estaremos hablando de:

Seleccione una:

- a. Neutro.
- b. Fármaco. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Tóxico.
- d. Todas falsas.

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

529.- La trombocitopenia es frecuente en el RN, siendo del:

Seleccione una:

- a. 12 % en el neonato sano y se incrementa hasta el 80% en el neonato enfermo.
- b. 1% en el neonato sano y se incrementa hasta el 5 % en el neonato enfermo.
- c. 1-2 % en el neonato sano y se incrementa hasta el 20 – 35 % en el neonato enfermo. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. 24% en el neonato sano y se incrementa hasta el 50 % en el neonato enfermo

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

425.- Son dispositivos usados para administrar varias perfusiones continuas en Y en pacientes de uci:

Seleccione una:

- a. Catéteres sin llaves de tres pasos.
- b. Catéteres con una luz sólo.
- c. Catéteres venosos centrales de múltiples luces y llaves de 3 pasos. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Catéteres de pequeño calibre que son los principalmente usados.

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

203.- La vena axilar:

Seleccione una:

- a. Es la continuación de la vena cefálica.
- b. Es la continuación de la vena braquial.
- c. Es la continuación de la vena basilica y confluyen las venas braquiales y cefálica. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Es la continuación de la vena subclavia.

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

527.- Son fármacos prehemostáticos: Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Vitamina K.
- b. Ácido Tranexámico.
- c. Fibrinógeno.
- d. Azul de metileno. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

309.- Señale la opción correcta si hablamos de Calcio:

Seleccione una:

- a. Influye en acciones de suma importancia como la transmisión de impulsos nerviosos, así como la regulación de la contracción y relajación muscular. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. La concentración sérica normal de calcio en sangre es de 1,1-2,6mmol/L.
- c. Este electrolito puede encontrarse en 2 formas distintas en la sangre: ionizado (50% del calcio sérico) y unido a complejos.
- d. La principal fuente por la cual absorbemos el calcio es a través de los alimentos, y su vía de excreción es el hígado.

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

205.- El principal vaso de la región del cuello para la inserción de catéteres centrales es:

Seleccione una:

- a. Vena yugular externa.
- b. Vena yugular interna. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Vena vertebral.
- d. Vena temporal superficial.