

EXPERTO UNIVERSITARIO EN ACCESOS VASCULARES PARA ENFERMERÍA (ZXV09)

Área personal > MÁSTERES, ESPECIALISTAS Y EXPERTOS > ENFERMERÍA > EXPERTOS 20 ECTS EUNEIZ > ZXV09 > UNIDAD 3 > TEST UNIDAD 3

Comenzado el	martes, 1 de julio de 2025, 20:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 2 de julio de 2025, 20:17
Tiempo empleado	23 horas 47 minutos
Puntos	92,00/100,00
Calificación	9,20 de 10,00 (92%)
Comentario -	APROBADO

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1257.- ¿Qué escala se debe de usar para valorar los síntomas y signos asociados a la flebitis?

Seleccione una:

- a. EVA
- b. Glasgow
- c. VIP  ¡Bien, correcto!
- d. Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1236.- A la hora de canalizar una vía tipo midline, que calibre no debe de exceder el diámetro del catéter.

Seleccione una:

- a. 60%
- b. 2/5
- c. 1/3  ¡Bien, correcto!
- d. Todas son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1415.- En la retirada de la vía venosa central, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Previo la retirada del catéter venoso central debemos de volver a comprobar y asegurarnos que dicho acceso venoso no va a ser necesario. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Se debe de comprobar que el recuento plaquetario es inferior a 50×10^9 litros.
- c. El INR debería de estar en personas sin anticoagulación oral por encima de 1.5 y en paciente con anticoagulantes orales por encima de 3.0 para reducir el riesgo de sangrado y/o hematoma asociado al procedimiento.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1205.- ¿Cuál es de estas NIC se relaciona con la TI pediátrica?

Seleccione una:

- a. Punción intravenosa
- b. Administración de medicación IV
- c. Cuidados del catéter umbilical
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1515.- Respecto a los cuidados en la inserción de catéteres centrales no está indicado:

Seleccione una:

- a. Abordaje estéril.
- b. Siempre utilizar catéteres del menor número de luces posible.
- c. Realizar corte quirúrgico en el punto de inserción. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Fijación apósito transparente semipermeable estéril.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1211.- ¿Qué opción es la correcta con respecto al flujo en la administración de medicación en pediatría?

Seleccione una:

- a. 0.1 mls/hr
- b. 3 mls/hr
- c. 5 mls/hr
- d. Todos son correctos ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1318.- Los microorganismos presentes normalmente en la flora cutánea son:

Seleccione una:

- a. Los responsables de las infecciones relacionadas con el catéter como consecuencia de su capacidad de generar biofilm en el entorno
- b. Los responsables de las infecciones relacionadas con el catéter como consecuencia de su capacidad de generar biofilm en el cateter
- c. Los responsables de las infecciones relacionadas con el catéter como consecuencia de su capacidad de generar biofilm en el entorno cutáneo ✗ Mal, debes repasar un poco
- d. Los responsables de las infecciones relacionadas con el catéter como consecuencia de su capacidad de generar biofilm en la arteria

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1524.- Respecto a la inserción del catéter arterial no es cierto que:

Seleccione una:

- a. Solo puede ser realizada por el facultativo. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Enfermería puede realizar la inserción si posee experiencia.
- c. Este catéter puede tener varias localizaciones: radial, humeral, femoral y axilar.
- d. Es una técnica utilizada en UCI fundamentalmente.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1525.- En los cuidados de inserción del catéter arterial no está recomendado:

Seleccione una:

- a. Lavado de manos con jabón antiséptico y colocación de guantes estériles.
- b. Desinfectar con antiséptico (Clorhexidina alcohólica >0,5 %)
- c. Poner apósito de gasa por el riesgo de sangrado. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Registrar el tipo de catéter, su localización, así como la técnica empleada en la historia clínica del paciente.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1307.- Cuando hablamos del tipo de flebitis más común como consecuencia de una fijación y elección no adecuada del catéter, y al propio traumatismo generado en la vena o arteria durante la punción de la misma, hacemos referencia a:

Seleccione una:

- a. Mecánica o traumática ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Química
- c. Por infusión
- d. Infecciosa o bacteriana

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1333.- La importancia de la higiene de manos, radica en la presencia de dos tipos de flora bacteriana:

Seleccione una:

- a. Flora bacteriana residente o permanente
- b. Flora bacteriana transitoria o contaminante
- c. A y B son falsas
- d. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1238.- En relación al lavado de las vías venosas que significa SAS

Seleccione una:

- a. Servicio Andaluz de Salud
- b. Salinizar-Analizar-Silbar
- c. Salinizar-Administrar-Salinizar ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son correctas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1233.- ¿Dónde se debe de localizar la punta del catéter de una línea media?

Seleccione una:

- a. Vena axilar ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Vena yugular interna
- c. Tercio medio inferior vena cava superior
- d. Vena porta

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1256.- ¿Cuál no es una causa de flebitis?

Seleccione una:

- a. Mecánica
- b. Trombóticas
- c. Infecciosas
- d. Físicas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1514.- Entre los diagnósticos que podemos encontrar en un paciente con un catéter venoso central se encuentran:

Seleccione una:

- a. Riesgo de infección.
- b. Riesgo de sangrado.
- c. Deterioro de la integridad cutánea.
- d. Todos pueden encontrarse. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1208.- ¿Cuál de estas afirmaciones forma parte de los 10 correctos de la administración de la medicación?

Seleccione una:

- a. Paciente correcto
- b. Hora correcta
- c. Comprobar la fecha de caducidad.
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1250.- ¿Cuál es la vena central de elección en pediatría?

Seleccione una:

- a. Subclavia
- b. Yugular Interna ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Yugular Externa
- d. Femoral

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1516.- Respecto a la cura de la zona de inserción de catéteres centrales no está indicado:

Seleccione una:

- a. Retirada atraumática del apósito sin humedecer punto de punción.
✗ Mal, debes repasar un poco
- b. Aplicación del antiséptico (Clorhexidina alcohólica al 2%)
- c. No reintroducir ningún tramo del catéter que se haya exteriorizado.
- d. No utilizar de forma sistemática antibióticos en el punto de inserción.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1239.- Durante la técnica push-stop, ¿Qué periodo de tiempo se debe de dejar entre intervalos?

Seleccione una:

- a. 16 segundos
- b. 0.4 segundos **✓ ¡Bien, correcto!**
- c. 0.4 minutos
- d. 4 segundos

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1314.- Podemos considerar eritema como:

Seleccione una:

- a. Salida del fluido administrado por acceso vascular al tejido circundante
- b. Aparición de nuevo de la infección por el mismo agente una vez finalizado el tratamiento
- c. Salida del fluido administrado por acceso vascular
- d. Enrojecimiento de la piel y más en concreto a lo largo del recorrido de vena como consecuencia de la irritación o congestión vascular. **✓ ¡Bien, correcto!**

Pregunta 21

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1325.- ¿Qué zona se debe evitar para canalizar catéteres venosos periféricos?

Seleccione una:

- a. Antebrazo
- b. Mano
- c. Flexuras
- d. Pie **✗ Mal, debes repasar un poco**

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1249.- ¿Cómo se puede observar un trombo a nivel ecográfico?

Seleccione una:

- a. Como un grano de café
- b. Como una mancha que ocupa toda la luz del vaso ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Como una aceituna
- d. Todas son falsas

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1522.- Entre las recomendaciones de retirada del catéter venoso central no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Realizar recambio con guía cuando existe evidencia de infección relacionado con catéter. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Retirar cualquier catéter que no sea absolutamente imprescindible.
- c. Cambiar un catéter de múltiple luz por uno de menos luces cuando estas ya no sean imprescindibles.
- d. Vigilar signos locales y sistémicos de infección.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1503.- Uno de los diagnósticos más utilizados en personas que tienen insertado un catéter corto periférico es:

Seleccione una:

- a. Riesgo de lesión.
- b. Riesgo de infección. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Exceso de volumen de líquidos.
- d. Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1320.- Señala cuales son las vías de colonización de un catéter central:

Seleccione una:

- a. Extraluminal
- b. Intraluminal
- c. Hematógena
- d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1214.- ¿Cuál es la concentración máxima que tolera un catéter venoso periférico?

Seleccione una:

- a. Solo y exclusivamente depende del pH.
- b. La osmolaridad máxima que tolera es de 600 -700 mOs/L ✓
¡Bien, correcto!
- c. La osmolaridad máxima que soporta es de 1000 mOs/L
- d. Todas son correctas

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1245.- ¿Cuál no es una indicación para el PICC en población pediátrica?

Seleccione una:

- a. Posibilidad de canalizar una vía venosa periférica ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Administración de medicación irritante
- c. Monitorización hemodinámica
- d. Imposibilidad de canalizar una VVP

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1331.- Valoraremos la posibilidad de canalizar una línea media o catéter centra de inserción periférica si el tratamiento es superior a:

Seleccione una:

- a. 6 días ✓ ¡Bien, correcto!
- b. 7 días
- c. 10 días
- d. 2 semanas

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1533.- En pacientes con catéteres arteriales respecto al diagnóstico enfermero Riesgo de deterioro de la integridad cutánea y en relación a la NIC "Vigilancia de la piel" incluiremos actividades, excepto:

Seleccione una:

- a. Observar si hay zona de decoloración, hematomas y pérdida de integridad en la piel.
- b. Observar si hay erupciones y abrasiones en la piel.
- c. Observar si hay enrojecimiento, calor extremo...
- d. Aplicar las actividades de reducción del riesgo. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1322.- Señala cuál de las siguientes es una complicación de la flebitis:

Seleccione una:

- a. Dificultad para canalizar la vía
- b. Posición del brazo
- c. Fragilidad del paciente
- d. Septicemia ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 31

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1417.- Señale la afirmación incorrecta en el procedimiento de retirada del acceso venoso central:

Seleccione una:

- a. Para disminuir la contaminación del catéter tras su extracción se le pedirá al paciente en caso necesario que mire hacia el mismo lado de la localización del catéter.
- b. La gran mayoría de los autores señalan que el paciente tiene que encontrarse como mínimo con una ligera posición de trendelenburg para evitar embolias gaseosas asociadas al procedimiento.
- c. En caso de que la vía que se vaya a retirar se encuentre a nivel femoral, se colocará a la persona en decúbito prono. ✗ Mal, debes repasar un poco
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1223.- ¿Qué técnicas aumentan la tasa de éxito de canalización venosa?

Seleccione una:

- a. Ecografía
- b. Ultrasonografía
- c. Trasluminación
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1521.- Respecto al lavado del catéter venoso central no es cierto que:

Seleccione una:

- a. El catéter debe lavarse con Suero Fisiológico estéril previa y posteriormente a la administración de medicación.
- b. El lavado y sellado deben realizarse asegurando una técnica de presión positiva.
- c. La mínima cantidad de Suero Fisiológico para el lavado de CVC será el doble del volumen de cebado del catéter (+/- 5 ml).
- d. Solo se recomienda la técnica de presión positiva en el sellado. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1334.- La flora en la cual los microorganismos multirresistentes que se transmiten a través de las manos de los profesionales sanitarios como consecuencia del contacto con objetivos contaminados siendo fácilmente eliminables son:

Seleccione una:

- a. Transitoria o contaminante ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Residente
- c. Permanente
- d. Ocasional

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1304.- Señala la opción correcta

Seleccione una:

- a. Se entiende flebitis a la inflamación de la pared de la vena debido a la alteración endotelial ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Se entiende flebitis a la inflamación de la pared de la arteria debido a la alteración endotelial
- c. Se entiende flebitis a la disminución de la pared de la arteria debido a la alteración endotelial
- d. Se entiende flebitis a la disminución de la pared de la vena debido a la alteración endotelial

Pregunta 36

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1235.- ¿Qué técnica se recomienda en lactantes para la inserción del midline?

Seleccione una:

- a. Seldinger
- b. MicroSeldinger ✗ Mal, debes repasar un poco
- c. Punción tradicional
- d. Todas son correctas

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1237.- Con respecto a los catéteres periféricos....

Seleccione una:

- a. Se debe de usar pomadas antibióticas
- b. Se debe de usar crema o ungüentos en el punto de punción
- c. No se debe de usar cremas o ungüentos en el punto de punción ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son falsas

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1413.- Entre los dispositivos venosos centrales de acceso periférico encontramos:

Seleccione una:

- a. PICC.
- b. Midline.
- c. A y B son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son incorrectas.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1255.- ¿Por qué una vez que se canaliza una Vía Venosa Central a nivel de la vena subclavia se debe de buscar signos de enfisema subcutáneo?

Seleccione una:

- a. Neumotórax
- b. Hemotórax
- c. Hemo-Neumotórax ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Todas son falsas

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1315.- Podemos considerar extravasación como:

Seleccione una:

- a. Salida del fluido administrado por acceso vascular al tejido circundante ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Aparición de nuevo de la infección por el mismo agente una vez finalizado el tratamiento
- c. Salida del fluido administrado por acceso venoso
- d. Enrojecimiento de la piel y más en concreto a lo largo del recorrido de vena como consecuencia de la irritación o congestión vascular.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1505.- Entre las medidas de asepsia antes de canalizar una vía venosa periférica no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Lavado de manos.
- b. Colocación de guantes no estériles aunque tengamos que palpar punto de inserción una vez desinfectado. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Desinfección de la zona elegida y dejar secar el antiséptico 2 minutos.
- d. Como antiséptico se recomienda clorhexidina alcohólica >0,5% en alcohol isopropílico al 70%.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1311.- Señala cuales se identificar como bacteriemia:

Seleccione una:

- a. Bacteriemia relacionada con el catéter.
- b. Bacteriemia primaria
- c. Bacteriemia relacionada con infusiones
- d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1330.- Pasadas cuantas horas es recomendable retirar aquellos catéteres que han sido insertados de manera urgente por su alta posibilidad de infección:

Seleccione una:

- a. 24h
- b. 48h ✓ ¡Bien, correcto!
- c. 72h
- d. 18-24h

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1247.- Al canalizar a un paciente pediátrico con un PICC usted ha utilizado un dispositivo de poliuretano siliconado, ¿Cuál es el tiempo máximo de uso del mismo?

Seleccione una:

- a. 15 días
- b. 1 año
- c. 6 semanas ✓ ¡Bien, correcto!
- d. 1 semana

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1510.- En los catéteres venosos periféricos no se recomienda:

Seleccione una:

- a. Cambiar el apósito y curar con antiséptico: cada 48 h (gasa)
- b. Cambiar el apósito y curar con antiséptico: cada 48 h. En apósitos transparentes. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Cambiar el apósito y curar con antiséptico: cada 7 días en apósitos transparentes.
- d. Cambiar el apósito y curar con antiséptico si se moja, despegar o ensucia.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1252.- ¿Cuál de las siguientes no es considerada una complicación mayor?

Seleccione una:

- a. Celulitis
- b. Flebitis extensa
- c. Hematomas ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Necrosis

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1329.- Una de las consecuencias de apretar en exceso el compresor es:

Seleccione una:

- a. Mejor visualización de la vena para su canalización
- b. Eliminar el riesgo de comprometer riesgo arterial
- c. Calor distal
- d. Coloración oscura del miembro ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1530.- En relación a los cuidados del catéter arterial no es necesario:

Seleccione una:

- a. Vigilar signos locales y sistémicos de infección y cambiar si se observan estos.
- b. Vigilar que la circulación en la extremidad distal al punto de inserción sea adecuada.
- c. Comprobar la piel de la zona de punción en busca de signos de palidez, cianosis o induración.
- d. Retirar apósito con guantes estériles. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1506.- Respecto a la fijación del catéter venoso periférico:

Seleccione una:

- a. Se recomienda apósito transparente dejando visible el punto de inserción.
- b. Se puede usar corbata (lazo envolviendo el catéter).
- c. Se podrá utilizar apósito de gasa en caso de alergia, sudoración profusa o sangrado.
- d. "a" y "c" son ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1327.- Se debe evitar realizar la punción en la cara interna de la muñeca debido al elevado riesgo de punción de la arteria:

Seleccione una:

- a. Cubital
- b. Radial
- c. Yugular
- d. A y B son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1224.- Con respecto a la canalización venoso no es cierto que...

Seleccione una:

- a. Lo niños sientan dolor
- b. Los niños sientan ansiedad
- c. Le genere estrés
- d. Todas son falsas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1332.- Respecto al lavado e higiene de manos, señale la opción correcta

Seleccione una:

- a. Su grado de cumplimiento es muy alto
- b. No llega ni al 30% de los profesionales que la aplica
- c. A y B son verdaderas
- d. A y B son falsas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1251.- ¿Cuál es la población más vulnerable ante las complicaciones de las vías venosas?

Seleccione una:

- a. Neonatos ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Adolescentes
- c. Jóvenes
- d. Niños en general

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1324.- A la hora de seleccionar el tipo de catéter se debe tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Tiempo de permanencia
- b. Objetivo del mismo
- c. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son falsas

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1326.- Señala que dirección es la adecuada para realizar la canalización del acceso venoso:

Seleccione una:

- a. Proximal a distal
- b. Proximal a lateral
- c. Distal a proximal ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Distal a lateral

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1222.- ¿Qué factor influye en la canalización venosa?

Seleccione una:

- a. Destreza del profesional
- b. Calidad y calibre del acceso venoso
- c. Características del catéter
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1240.- ¿Quién describió por primera vez el acceso venoso por la cabeza?

Seleccione una:

- a. Flemming
- b. Jonathan Shaw ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Richmon
- d. Todas son correctas

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1419.- Es cierto en un catéter radial:

Seleccione una:

- a. Este tipo de catéter suele usarse de manera diagnóstica en el caso de los diferentes tipos de cateterismos o para mediciones hemodinámicas invasivas.
- b. Este tipo de acceso además de permitirnos realizar procedimientos diagnósticos, obtener mediciones invasivas, también nos permite obtener muestras sanguíneas.
- c. Tanto si el catéter es para medición invasiva como para realizar un procedimiento diagnóstico en sala de hemodinámica, el procedimiento de retirada es prácticamente lo mismo.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1536.- La vía venosa periférica si no se utiliza está recomendado:

Seleccione una:

- a. Heparinizar con 10 cc de heparina 20 ui/ml.
- b. Heparinizar con 5 cc de heparina al 2%.
- c. Salinizar con 10 cc de suero fisiológico. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Heparinizar con 3 cc de heparina al 5%.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1337.- Las dos acciones principales que ejerce la clorhexidina sobre los microorganismos son:

Seleccione una:

- a. Acción bacteriostática
- b. Acción bactericida
- c. Acción antifúngica
- d. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1317.- La aparición de nuevo de la infección por el mismo agente una vez finalizado el tratamiento es:

Seleccione una:

- a. Eritema
- b. Extravasación
- c. Tromboflebitis
- d. Recidiva ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1302.- En que tanto porciento se produce flebitis en el acceso venoso periférico

Seleccione una:

- a. 3 y 5%
- b. 10 y 30 %
- c. 2 y 60 % ✓ ¡Bien, correcto!
- d. 80%

Pregunta 63

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1529.- En relación a la retirada de catéteres arteriales está recomendado:

Seleccione una:

- a. No se debe realizar recambio con guía cuando existe evidencia de infección
- b. Cuando la inserción del catéter se ha realizado de forma urgente y sin poder utilizar una técnica estéril, se recomienda el cambio de catéter antes de las 96 horas y la colocación de uno nuevo en lugar diferente. ✗ Mal, debes repasar un poco
- c. Conservar el catéter que no se usa mientras el enfermo esté en UCI.
- d. Los catéteres arteriales deben ser reemplazados de forma rutinaria por el alto riesgo de infección.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1308.- Cuando nos referimos a la consecuencia de la administración de sustancias muy ácidas o alcalinas y a soluciones hipertónicas, hablamos de flebitis:

Seleccione una:

- a. Química o por infusión ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Infecciosa o bacteriana
- c. Mecánica o traumática
- d. Todas son falsas

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1231.- ¿Cuándo se usará una palomita metálica? (indicar la correcta)

Seleccione una:

- a. Medicación poca irritativa ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Medicación muy irritativa
- c. Tratamientos largos
- d. Todas son correctas

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1535.- En relación al catéter venoso periférico es cierto que:

Seleccione una:

- a. Utilizar brazos superiores para su inserción da igual si es el brazo dominante.
- b. En miembros inferiores no existe más riesgo de trombosis venosa profunda que en los superiores.
- c. Desinfectar la piel con clorhexidina acuosa para su inserción.
- d. En cirugía que precise sangre cruzada canalizar cánula de calibre grueso (18G o superior). ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1537.- Entre los motivos de retirada del catéter venoso periférico no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Flebitis.
- b. Fin de tratamiento.
- c. Extravasación.
- d. Escala Maddox 0 ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1207.- ¿Cuál de estas afirmaciones no forma parte de los 10 correctos de la administración de la medicación?

Seleccione una:

- a. Paciente correcto
- b. Hora correcta
- c. Comprobar la fecha de caducidad.
- d. No prestar atención al proceso ya que, los 10 correctos no sirven para nada ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1309.- Respecto a la flebitis infecciosa o bacteriana:

Seleccione una:

- a. Es la más frecuente
- b. Es consecuencia de una fijación y elección no adecuada del catéter
- c. Consecuencia de la administración de sustancias muy ácidas
- d. Todas son falsas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1305.- Clasificamos la flebitis según su etiología en:

Seleccione una:

- a. Mecánica o traumática
- b. Química o por infusión
- c. Infecciosa o bacteriana
- d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1323.- ¿En qué tanto por ciento % podemos evitar la aparición de flebitis?

Seleccione una:

- a. 0,1
- b. 0,2
- c. 0,45
- d. 0,5 ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1218.- ¿Cuál no es una indicación para la canalización de una vía umbilical?

Seleccione una:

- a. Duración de 7 a 10 días
- b. Duración de más de 18 días ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Prematuros de menos de 1kg
- d. Medición de la presión venosa central

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1518.- En los cuidados del catéter venoso central utilizaremos apósito de gasa:

Seleccione una:

- a. Nunca, todas las guías de práctica clínica recomiendan apósitos transparentes.
- b. En caso de que el punto de punción presente hemorragia.
- c. En caso de exceso de sudoración del enfermo.
- d. "b" y "c" son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1204.- ¿Qué indica la última evidencia con respecto a la terapia intravenosa neonatal?

Seleccione una:

- a. Enfoque holístico
- b. Se debe de tener en cuenta los aspectos emocionales
- c. Se debe de tener en cuenta los aspectos psicosociales
- d. Todos son correctos ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1513.- Entre los catéteres venosos centrales el que es de acceso periférico es:

Seleccione una:

- a. Catéter venoso central femoral.
- b. Catéter venoso central subclavia.
- c. Catéter venoso central PICC. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Catéter venoso central yugular.

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1301.- A nivel global, ¿se ha observado que las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria son un problema de salud pública?:

Seleccione una:

- a. VERDADERO ✓ ¡Bien, correcto!
- b. FALSO
- c. Son un problema de salud privada
- d. Es una combinación pública y privada

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1517.- Respecto a los cuidados de mantenimiento del catéter venoso central (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Se cambiará el apósito transparente una vez por semana.
- b. Vigilar diariamente el punto de inserción de los catéteres vasculares sin retirar el apósito buscando signos de alarma.
- c. Utilizar guantes estériles para realizar cambio de apósitos.
- d. Se cambiará el apósito de gasa una vez por semana. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1534.- En relación a la administración de nutrición parenteral total por catéteres venosos centrales está recomendado:

Seleccione una:

- a. Si tiene Nutrición Parenteral Total (NPT) dejar una luz en exclusiva para su uso.
- b. Dejar una luz para la administración de nutrición parenteral aunque se pueden poner medicamentos en bolo.
- c. "a" y "d" son ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Cambiar los equipos de Nutrición Parenteral cada 12-24 horas.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1219.- ¿Qué indicación tiene el catéter arterial?

Seleccione una:

- a. Duración máxima de 7 días
- b. Indicado en prematuros de más de 1500 gr
- c. Extracción de gases
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1313.- Cuando hablamos de cuadro séptico sin otro foco de infección con hemocultivos positivos, hablamos de:

Seleccione una:

- a. Bacteriemia relacionada con el catéter
- b. Bacteriemia primaria ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Bacteriemia relacionada con infusiones
- d. Bacteriemia secundaria

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1246.- ¿Cuál es una indicación para la inserción del PICC en población pediátrica?

Seleccione una:

- a. Imposibilidad de canalización de una vía venosa periférica
- b. Administración de medicación irritante
- c. Monitorización hemodinámica
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1339.- Cuando se retire cualquier tipo de catéter a un paciente es muy importante:

Seleccione una:

- a. Observar la integridad del mismo
- b. Registrar la fecha
- c. Registrar la hora
- d. Todas son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1528.- No está recomendado en los cuidados de los catéteres arteriales:

Seleccione una:

- a. Uso de bioconectores. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Mantener presión de presurizado de 300 mmHg.
- c. Accederemos a la llave de tres vías solo con dispositivo estériles.
- d. Mantener sistema de presiones libre de cualquier burbuja de aire.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1520.- Para el lavado del catéter venoso central se recomienda:

Seleccione una:

- a. Jeringas menores de 10 cc.
- b. Jeringas de 5 cc.
- c. Jeringas de 10 cc. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Es igual el tamaño de la jeringa haciendo la técnica correcta.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1232.- Con respecto a los catéteres de tipo midline.....(señalar la correcta)

Seleccione una:

- a. La cánula puede oscilar de 14 a 21 G.
- b. La longitud varia de 6 a 28 cm
- c. Se recomiendan para terapia de más de 7 días que no sean irritativas
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1303.- Dentro de las complicaciones intrahospitalarias, ¿en qué posición encontramos la flebitis?:

Seleccione una:

- a. Primer puesto
- b. Segundo puesto
- c. Tercer puesto ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Cuarto puesto

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1526.- Respecto a los cuidados del catéter arterial está recomendado (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Limpieza y retirada de restos hemáticos con gasa estéril y suero fisiológico.
- b. Aplicación de antiséptico (Clorhexidina acuosa al 2%).
- c. Para el cambio de apósito se recomienda lavado de manos y guantes no estériles. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Comprobar la piel de la zona de punción en busca de signos de palidez, cianosis o induración.

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1316.- Podemos considerar precauciones barrera:

Seleccione una:

- a. Salida del fluido administrado por acceso vascular al tejido circundante
- b. Métodos tanto directos como indirectos empleados para la prevención de la transmisión de microorganismos ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Salida del fluido administrado por acceso vascular
- d. Enrojecimiento de la piel y más en concreto a lo largo del recorrido de vena como consecuencia de la irritación o congestión vascular.

Pregunta 89

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1217.- ¿Cuál es la duración máxima que se puede mantener un catéter venoso umbilical?

Seleccione una:

- a. 10 días
- b. 1 mes
- c. 5 días
- d. Todas son incorrectas ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1504.- Respecto a la inserción del catéter venoso periférico no es cierto que:

Seleccione una:

- a. Es indistinto el brazo a utilizar. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Seleccionar la vena según la finalidad del acceso vascular.
- c. Elegir la longitud y tamaño del catéter adecuado a la vena elegida y a la indicación.
- d. Preferiblemente utilizar los miembros superiores a los inferiores.

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1507.- Para la valoración de la flebitis en los accesos venosos se utiliza:

Seleccione una:

- a. Escala Tinetti.
- b. Escala Norton.
- c. Escala Maddox. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. Escala Fast.

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1340.- Señale la opción falsa respecto al uso de medidas barrera en la inserción de los catéteres venosos centrales:

Seleccione una:

- a. Se debe realizar de la manera más aséptica posible
- b. Seleccionar la vena subclavia como última opción ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Retirada precoz de catéter innecesarios
- d. Manejo higiénico del catéter limpiando con alcohol isopropílico al 70°

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1416.- En los materiales para la retirada del acceso venoso central se encuentra:

Seleccione una:

- a. Marquesita estéril y/o torunda estéril para el envío de muestra en caso necesario.
- b. Clorhexidina acuosa al 2%*.
- c. Apósito oclusivo.
- d. Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1306.- Clasificamos la flebitis según su etiología en:

Seleccione una:

- a. Mecánica o traumática
- b. Química o por infusión
- c. A y B son verdaderas ✓ ¡Bien, correcto!
- d. A y B son falsas

Pregunta 95

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

1401.- Los motivos por el cual según las guías de práctica clínica debemos retirar los accesos vasculares son:

Seleccione una:

- a. Se ha finalizado el tratamiento o motivo por el cual se decidió canalizar dicho acceso vascular.
- b. Oclusión y/o malfuncionamiento del catéter.
- c. Deterioro del catéter.
- d. Todas son correctas. ✗ Mal, debes repasar un poco

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1338.- Cuando una enfermera responsable y su equipo proporcionan cuidados estandarizados y validados científicamente se produce una reducción del:

Seleccione una:

- a. 20% en el índice de infección ✓ ¡Bien, correcto!
- b. 30% en el índice de infección
- c. 25% en el índice de infección
- d. 15% en el índice de infección

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1312.- Respecto a la bacteriemia con infusiones:

Seleccione una:

- a. Es debida a la presencia del mismo microorganismo tanto en muestra sanguínea como en la infusión administrada ✓ ¡Bien, correcto!
- b. Se aísla el germen tanto en la sangre del paciente como de la sangre obtenida del catéter venoso central
- c. Cuadro séptico sin otro foco de infección con hemocultivos positivos.
- d. Todas son falsas

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1310.- Entendemos por bacteriemia:

Seleccione una:

- a. Presencia de un determinado microorganismo en sangre, por regla general un hongo
- b. Presencia de un determinado microorganismo en sangre, por regla general una bacteria ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Presencia de un determinado microorganismo en sangre, por regla general un virus
- d. Presencia de un determinado microorganismo en sangre, por regla general un protozoo

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1259.- ¿Qué complicación mayor puede generar las siguientes consecuencias infantiles debido a la extravasación?

Seleccione una:

- a. Taponamiento cardiaco
- b. Hidrotórax
- c. Parálisis diafragmáticas
- d. Todas son correctas ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

1254.- ¿Cuál no es una complicación tardía?

Seleccione una:

- a. Extravasación
- b. Neumotórax ✓ ¡Bien, correcto!
- c. Infección sistémica
- d. Aparición de trombos