

Curso: Valoración y cuidados de enfermería al niño con deterioro de la piel

1. [AV.P036 TFN 25](#)
2. Curso: Valoración y cuidados de enfermería al niño con deterioro de la piel

Comenzado el	jueves, 17 de julio de 2025, 09:44
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 17 de julio de 2025, 09:47
Tiempo empleado	3 minutos 39 segundos
Puntos	30,00/30,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Lucía es una niña de 8 años que acude a la consulta de su enfermera de Atención Primaria tras recibir el alta hospitalaria por apendicectomía. Presenta una herida en el abdomen considerada contaminada limpia. Según el grado y la probabilidad de contaminación, una herida es de tipo contaminada limpia cuando:

Pregunta 1 Seleccione una:

a.
Tiene tejido muerto.

b.
Son heridas quirúrgicas que han afectado a vías respiratorias, alimentarias, genitales o urinarias y no presentan signos de infección.

c.
Son heridas quirúrgicas en las que se ha violado de manera importante el campo estéril.

d.
Muestran signos de inflamación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son heridas quirúrgicas que han afectado a vías respiratorias, alimentarias, genitales o urinarias y no presentan signos de infección.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La herida en la que los tejidos se rasgan con bordes irregulares, es la producida por:

Pregunta 2 Seleccione una:

a.
Laceración.

b.
Contusión.

c.
Abrasión.



d.
Incisión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Laceración.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los cuidados de prevención de úlceras por presión está CONTRAINDICADO:

Pregunta 3 Seleccione una:



a.
Incrementar la ingesta de proteínas.



b.
Mojar la piel.



c.
Proporcionar alimentos azucarados.



d.
Masajear las prominencias óseas con jabón.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Masajear las prominencias óseas con jabón.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Alfredo tiene una úlcera por presión irregular, con gran cantidad de exudado y sin tejido necrótico. Señale que apósito estaría indicado para absorber el exudado y rellenar el espacio muerto:

Pregunta 4 Seleccione una:



a.
Hidrogel.



b.
Alginato.



c.
Hidrocoloide.

d.
Gasas vaselinadas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alginato.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La úlcera por presión de un paciente que está cavitada, presenta una gran cantidad de exudado y apenas hay tejido necrótico. El apósito indicado es:

Pregunta 5 Seleccione una:

a.
Hidrocoloide.

b.
Alginato.

c.
Transparente semipermeable.

d.
Acrílico absorbente trasparente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alginato.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al valorar la úlcera por presión de Ana, observa una serie de características que la hace susceptible de ser tratada con un apósito hidrocoloide EXCEPTO por una de ellas:

Pregunta 6 Seleccione una:

a.
La úlcera es dolorosa.

b.

Tiene ligero olor.

c.

El drenaje es lento y moderado.

d.

Está infectada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está infectada.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de las siguientes suturas quirúrgicas es absorbible:

Pregunta 7 Seleccione una:

a.

Seda.

b.

Ácido poliglicólico.

c.

Poliéster.

d.

Polipropileno.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ácido poliglicólico.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los factores que promueven la cicatrización de una herida quirúrgica es:

Pregunta 8 Seleccione una:

a.

Actividad intensa del paciente.

b.

Aplicación de compresas calientes en incisiones edematosas.



c.

Respiraciones profundas periódicas.



d.

Administración de esteroides.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Respiraciones profundas periódicas.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes acciones para eliminar el vello favorece una mayor incidencia de infección de la herida quirúrgica?:

Pregunta 9 Seleccione una:



a.

Rasurar la piel con cuchilla inmediatamente antes de la cirugía.



b.

Rasurar la piel con cuchilla el día anterior a la cirugía.



c.

Rasurar la piel con maquinilla eléctrica inmediatamente antes de la cirugía.



d.

Aplicar crema depilatoria inmediatamente antes de la cirugía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Rasurar la piel con cuchilla el día anterior a la cirugía.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la historia clínica de un paciente postquirúrgico se cita “cicatrización por tercera intención”. La interpretación es que se trata de:

Pregunta 10 Seleccione una:



a.

Una herida contaminada que se deja abierta y se sutura después de controlar la infección.

b.

Una herida irregular con separación amplia de bordes, en la que el proceso de cicatrización es lento y la granulación se hace desde el fondo hacia la superficie, resultando cicatriz aparente.

c.

Una cicatriz con profusión de tejido que se extiende más allá de los bordes de la herida.

d.

Una separación de los bordes de una herida previamente unida.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una herida contaminada que se deja abierta y se sutura después de controlar la infección.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la clasificación-estadaje de las úlceras por presión, el GNEAUPP y el NPUAP-EPUAPPPPIA refieren una categoría denominada “lesión de tejidos profundos” con unas características muy definidas. ¿A qué son debidas este tipo de lesiones?:

Pregunta 11 Seleccione una:

a.

A la acción de la presión.

b.

A la acción combinada de la presión y la humedad.

c.

A la acción combinada de presión y cizalla.

d.

A la acción de la fricción en combinación con la presión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A la acción combinada de presión y cizalla.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La localización de úlceras por presión en niños cambia en función de la edad. ¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo de presentar lesiones en menores de 3 años?:

Pregunta 12 Seleccione una:



a.
Occipucio y orejas.



b.
Talones y zona sacra.



c.
Nariz y talones.



d.
Cara y talones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Occipucio y orejas.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la opción correcta, en relación a la retirada de una garrapata anclada a la piel:

Pregunta 13 Seleccione una:



a.
Aplicaremos una solución sobre la garrapata que no permita que respire, alcohol o vaselina, y esperaremos a que se desprenda, aplicando posteriormente desinfectante.



b.
Desinfectaremos previamente la zona de trabajo y con pinzas de borde romo giraremos y traccionaremos de la garrapata, aplicando posteriormente desinfectante.



c.
Sujetaremos el cuerpo de la garrapata con pinzas de borde romo, apretándola ligeramente con el fin de desprenderla, mientras giramos y traccionamos de ella, aplicando posteriormente desinfectante.



d.
Mediante pinzas de borde romo, sujetaremos la garrapata lo más cerca de la piel, traccionaremos lentamente de forma constante, aplicando posteriormente desinfectante.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mediante pinzas de borde romo, sujetaremos la garrapata lo más cerca de la piel, traccionaremos lentamente de forma constante, aplicando posteriormente desinfectante.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente con epidermólisis bullosa que presenta heridas altamente exudativas se recomienda proteger la piel perilesional mediante:

Pregunta 14 Seleccione una:

a.
Películas barrera no irritantes o pomadas a base de óxido de zinc.

b.
Apósitos hidrocoloides.

c.
Apósitos de film de poliuretano.

d.
Povidona iodada en solución.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Películas barrera no irritantes o pomadas a base de óxido de zinc.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué no está recomendado para prevenir la dermatitis del pañal?:

Pregunta 15 Seleccione una:

a.
Uso de cremas barrera ante leves irritaciones.

b.
Uso de pañales de tela.

c.
Aírear la zona de pañal entre cambios de pañal.

d.
Disminuir la ingesta hídrica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Uso de pañales de tela.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el sistema de clasificación de las Úlceras por presión propuesto por el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP) y el Panel Consultivo Nacional para las Úlceras por Presión (NPUAP) y el Panel Consultivo Europeo para las Úlceras por Presión (EPUAP), se define como Úlcera por presión de categoría II:

Pregunta 16 Seleccione una:

a.

La pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta como una úlcera abierta muy profunda con un lecho de la herida entre rosado y rojizo, con esfacelos. También puede presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento.

b.

La pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida abierta entre rosado y rojizo, sin esfacelos. También puede presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento.

c.

La pérdida completa del grosor del tejido. La grasa subcutánea puede resultar visible, pero los huesos, tendones o músculos no se encuentran expuestos. Pueden aparecer esfacelos. Puede incluir cavitaciones y tunelizaciones.

d.

La pérdida total del espesor del tejido con hueso, tendón o músculo expuestos. Pueden aparecer esfacelos o escaras. Incluye a menudo cavitaciones y tunelizaciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La pérdida de espesor parcial de la dermis que se presenta como una úlcera abierta poco profunda con un lecho de la herida abierta entre rosado y rojizo, sin esfacelos. También puede presentarse como una ampolla intacta o abierta/rota llena de suero o de suero sanguinolento.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué aspectos hemos de tener en cuenta a la hora de valorar la piel del niño en riesgo de desarrollar Úlceras por Presión?:

Pregunta 17 Seleccione una:

a.
La textura, coloración, presencia de lesiones.

b.
Valorar la piel sobre las prominencias óseas, decoloración de la piel, aumento de temperatura.

c.
Ausencia de dolor, dureza en la zona y eritema no blanqueable.

d.
Presencia de eritema, calor, edema, induración, dolor y localización.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Presencia de eritema, calor, edema, induración, dolor y localización.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la opción correcta ante la actitud a tomar frente a una herida con tejido desvitalizado que va a ser sometida a desbridamiento cortante:

Pregunta 18 Seleccione una:

a.
Debemos retirar los restos del antiséptico utilizado con agua bidestilada, solución salina o ringer lactato.

b.
No existen evidencias que justifiquen el uso de anestésicos locales a la hora de realizar un desbridamiento cortante.

c.
Debemos realizar cortes por planos comenzando por los bordes de la herida y avanzar hacia el centro de esta.

d.
El sangrado facilita la recuperación de la herida al permitir la llegada de sustancias reparadoras al lecho.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debemos retirar los restos del antiséptico utilizado con agua bidestilada, solución salina o ringer lactato.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) y la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), a través del proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España, coordinado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, recomiendan:

Pregunta 19 Seleccione una:

a. Realizar masajes sobre prominencias óseas con piel integra para la prevención de las úlceras por presión.

b. No utilizar flotadores para la prevención de las úlceras por presión.

c. Utilizar de forma rutinaria povidona yodada en niños menores de dos años como antiséptico de elección frente a otros de carácter fungicida.

d. Aplicar de manera habitual clorhexidina para limpiar las heridas crónicas para disminuir la carga bacteriana.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No utilizar flotadores para la prevención de las úlceras por presión.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un anestésico local está indicado en el tratamiento de las arritmias ventriculares, como aquellas que resultan de un infarto agudo de miocardio, toxicidad por digital, cirugía cardíaca o cateterismo cardíaco. Se trata de:

Pregunta 20 Seleccione una:

a. Bupivacaína.

- b.
Lidocaína.
- c.
Mepivacaína.
- d.
Procaína.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lidocaína.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta. Cuando se aplican apósitos de plata en el tratamiento de las heridas, ¿cuál es la función principal de los mismos entre las siguientes respuestas?:

Pregunta 21 Seleccione una:

-
- a.
Reducir la carga microbiana en heridas agudas o crónicas infectadas.
- b.
Impedir la barrera antimicrobiana en heridas agudas o crónicas infectadas.
- c.
Eliminar el olor de las heridas crónicas.
- d.
Eliminar el exudado de las heridas crónicas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reducir la carga microbiana en heridas agudas o crónicas infectadas.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Elija respuesta correcta en relación al desbridamiento autolítico:

Pregunta 22 Seleccione una:

-
- a.

Las células encargadas del desbridamiento autolítico son los macrófagos y fagocitos.

b.

Ocurre de forma natural en todas las heridas, pero puede inhibirse por el uso de hidrogeles de estructura amorfa.

c.

Una de las ventajas es que presenta una acción más corta en el tiempo.

d.

Constituye un tipo de desbridamiento traumático y poco selectivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las células encargadas del desbridamiento autolítico son los macrófagos y fagocitos.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué profilaxis antitetánica indicaría a un adolescente de 12 años que ha sufrido un pinchazo accidental con un clavo en la calle, si el paciente ya está vacunado con 4 dosis de vacuna antitetánica (última dosis hace 7 años)?

Pregunta 23 Seleccione una:

a.

No precisa profilaxis antitetánica.

b.

Requiere una dosis de vacuna antitetánica (dT/dTpa).

c.

Requiere una dosis de vacuna antitetánica (dT/dTpa) y una dosis de inmunoglobulina antitetánica.

d.

Solo requiere inmunoglobulina antitetánica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Requiere una dosis de vacuna antitetánica (dT/dTpa).

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación correcta en relación a las úlceras por presión:

Pregunta 24 Seleccione una:

a.

En la escala de Norton, puntuaciones altas indican un mayor riesgo de desarrollar úlceras por presión.

b.

La única escala validada para población pediátrica es la escala NSRAS de riesgo neonatal.

c.

Se ha de realizar la cura en ambiente húmedo (CAH), ya que los materiales empleados han demostrado una mejor reparación de la integridad cutánea que el tratamiento en ambiente seco, además de ser más costo-efectivos y gestionar mejor el exudado.

d.

Como norma, se debe limpiar la úlcera por presión con antisépticos locales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se ha de realizar la cura en ambiente húmedo (CAH), ya que los materiales empleados han demostrado una mejor reparación de la integridad cutánea que el tratamiento en ambiente seco, además de ser más costo-efectivos y gestionar mejor el exudado.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las suturas, cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

Pregunta 25 Seleccione una:

a.

Hay que tener en cuenta que mayor grosor no siempre implica mayor resistencia; sólo será más resistente si se trata del mismo material.

b.

Debe utilizarse el grosor mínimo de sutura que permita asumir la tensión del procedimiento. Cada sutura, en función del material que la compone, soportará tensiones mayores o menores. Cuanto menor sea el grosor, menor será el traumatismo tisular.

c.

La resistencia se mide según la tensión que la sutura es capaz de soportar, tras ser anudada, antes de romperse.

d.

El grosor de la sutura se mide por un sistema de ceros. La sutura de menor diámetro es aquella que menor número de ceros contiene en su numeración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El grosor de la sutura se mide por un sistema de ceros. La sutura de menor diámetro es aquella que menor número de ceros contiene en su numeración.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál no es una característica utilizada en la valoración de la cicatrización por segunda intención en una herida quirúrgica?:

Pregunta 26 Seleccione una:

a.
Exudado o tejido necrótico.

b.
Bordes de la herida.

c.
Tipo de sutura.

d.
Tejido de granulación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tipo de sutura.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué escala no usarías para valorar el grado de dolor durante la cura de una herida quirúrgica en un niño?:

Pregunta 27 Seleccione una:

a.
Escala de caras.

b.
Sistema de puntuación FLACC.

c.
Escala Likert.



d.
Score de Finnegan.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Score de Finnegan.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la dermatitis del pañal, indique la respuesta correcta:

Pregunta 28 Seleccione una:



a.
Las lesiones eritematosas aparecen inicialmente en las zonas convexas que tienen un contacto más directo con el pañal, como son: los genitales externos, las nalgas, los muslos y el periné.



b.
Es conveniente el uso profiláctico de cremas con corticoides suaves.



c.
El número de cambios de pañal NO tiene repercusión en el desarrollo de la dermatitis del pañal.



d.
Usar siempre productos barrera para la protección de la piel sana.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las lesiones eritematosas aparecen inicialmente en las zonas convexas que tienen un contacto más directo con el pañal, como son: los genitales externos, las nalgas, los muslos y el periné.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

Pregunta 29 Seleccione una:



a.

El granuloma piógeno es un tumor vascular pedunculado, que suele sangrar con pequeños roces.

b.

Las verrugas están producidas por el VPH y son frecuentes en la infancia.

c.

Existen enfermedades y síndromes genéticos que se manifiestan con lesiones cutáneas.

d.

Los hemangiomas infantiles están presentes desde el nacimiento y hasta la edad adulta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los hemangiomas infantiles están presentes desde el nacimiento y hasta la edad adulta.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta respecto al gel LAT:

Pregunta 30 Seleccione una:

a.

Está indicado su uso en heridas pequeñas evitando partes acras (labios, dedos, párpados).

b.

Tiene un inicio de acción de pocos minutos.

c.

Se aplica en el lecho de la herida y tapa con apósito oclusivo.

d.

Se debe realizar la limpieza e inspección de la herida antes de aplicarlo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está indicado su uso en heridas pequeñas evitando partes acras (labios, dedos, párpados).