

CURSO DIOTEC MÓDULO 2:

Test de evaluación

1 / 11

1. La incidencia de diabetes tipo 2 en España es:

A. 13.8 casos/1000 personas/año.

B. 6%

C. 11.6 casos /1000 personas/año.

D. 13,8%

2. La diabetes tipo 2:

A. Representa más del 90% de todas las diabetes en el mundo.

B. Es un problema tanto países en vías de desarrollo como desarrollados.

C. Afecta a personas de todas las edades.

D. Todas son correctas.

3. La diabetes tipo 2:

A. Es una enfermedad multifactorial.

4. Para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, no es cierto que hay:

A. Disminución de la secreción de insulina.

B. Aumento de la reabsorción tubular de glucosa.

C. Efecto incretínico aumentado a nivel intestinal.

D. Disminución de la captación muscular de glucosa.

5. La inercia terapéutica:

A. Es la falta de intensificación del tratamiento.

B. Depende mayoritariamente del sistema sanitario.

C. Hay tres factores influyentes: paciente, médico y sistema sanitario.

D. A y C son ciertas.

6. En el diagnóstico de la diabetes tipo 2:

A. El inicio suele ser muy brusco.

B. La reducción de la función de las células beta probablemente comienza 10 años antes.

C. Es una enfermedad que no progresa.

D. La hiperglucemia está presente solo en el diagnóstico.

7. En el tratamiento de la diabetes tipo 2:

A. El tratamiento no farmacológico es imprescindible.

B. Se requiere de un enfoque multifactorial para reducir el riesgo de complicaciones.

C. La insulina suele ser el paso final en la escala de tratamiento.

D. Todas son correctas.

8. De los siguientes fármacos, señala cual es la incorrecta:

A. La metformina no hay que suspenderla en caso de intervención quirúrgica.

9. Los agonistas del péptido similar al glucagón (arGLP1):

B. Disminuyen la secreción de glucagón.

10. Las complicaciones en la diabetes tipo 2:

A. El cribado habitual permite una detección precoz de las mismas.

B. Las complicaciones microvasculares incluyen la enfermedad renal, la retinopatía y la neuropatía.

C. Se tratarán teniendo en cuenta la calidad de vida del paciente.

D. Todas son correctas.

11. Para derribar las barreras para el inicio de una insulinización en pacientes y profesionales, cuál es la incorrecta:

A. Enfatizar la educación terapéutica en diabetes.

B. Proporcionar toda la información posible y amenazar con el inicio de insulina.