

"CUIDADOS EN EL RECIÉN NACIDO Y SEGUIMIENTO DEL NIÑO SANO":

-EN CUANTO A LAS ESTRUCTURAS VASCULARES DE LA CIRCULACIÓN FETAL, ¿QUÉ AFIRMACIÓN ES CORRECTA SOBRE EL CONDUCTO VENOSO O DE ARANCIO?:

D El conducto venoso o de Arancio se oblitera y gradualmente se convierte en un rudimento fibroso denominado Ligamento Venoso del hígado.

-DE LAS SIGUIENTES RESPUESTAS EN CUANTO A VACUNAS EN LA EDAD INFANTIL, SEÑALE LA CORRECTA:

C La vacuna conjugada frente al Haemophilus influenzae tipo b (Hib) incluye 3 dosis a los 2 y 4 meses más un refuerzo a los 11 meses.

-EL TEST DE APGAR VALORA LA ESTABILIDAD DEL RECIÉN NACIDO LOS PRIMEROS MINUTOS DESPUÉS DEL NACIMIENTO. CUANDO VALORAMOS A UN RN QUE PRESENTA ACROCIANOSIS, UNA FC DE 120 LPM, TIENE UN TONO MUSCULAR ACTIVO, LLORA CON FUERZA Y ESTORNUDA, DAREMOS LA SIGUIENTE PUNTUACIÓN:

D 9- Ausencia de dificultades

-¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES VENTANAS DE TIEMPO SE DA EL SEGUNDO PERÍODO DE REACTIVIDAD DEL RECIÉN NACIDO?

B De la segunda a la sexta hora tras nacer.

-EL PERÍODO NEONATAL TARDÍO COMPRENDE:

C Desde el 8º día de vida hasta el 28º día de vida.

-EN LOS VARONES, LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LA URETRA SUELEN ASOCIARSE A ANOMALÍAS ANATÓMICAS DEL PENE Y VICEVERSA. EN LAS NIÑAS, LAS ANOMALÍAS URETRALES PUEDEN EXISTIR SIN OTRAS MALFORMACIONES DE LOS GENITALES EXTERNOS. SE REQUIERE LA REPARACIÓN QUIRÚRGICA CUANDO HAY UNA ALTERACIÓN FUNCIONAL O CUANDO SE DESEA UNA CORRECCIÓN ESTÉTICA. LA DESEMBOCADURA DEL MEATO URINARIO EN LA SUPERFICIE VENTRAL DEL PENE SE CONOCE COMO:

C Hipospadias

-ESTÁS REPASANDO EL TEMA DE PEDIATRÍA CON TU COMPAÑERA DE PISO, CUANDO LE HABLAS DE LA EXPLORACIÓN DEL RECIÉN NACIDO, LE DICES QUE UNO DE LOS PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE EN SU CABEZA ES EL TAMAÑO Y FORMA DE LAS FONTANELAS. TRAS TU EXPLICACIÓN SOBRE LA FONTANELA ANTERIOR, TU COMPAÑERA TE DICE QUE DEBES REPASAR UNA COSA QUE HAS DICHO MAL, ¿CUÁL ES?

D También recibe en nombre de lambdoidea

-¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS CARDIOVASCULARES NO SERÍAN FISIOLOGICOS EN UN RECIÉN NACIDO?

B Volemia de 50ml/kg

-A MARTA DE 5 DÍAS LE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE POTENCIALES EVOCADOS DE TRONCO CEREBRAL AUTOMATIZADOS ANTES DE SALIR DEL HOSPITAL DONDE HA NACIDO ¿QUÉ TIPO DE PREVENCIÓN ESTÁN REALIZANDO EN ESA ACTIVIDAD?

A Prevención Secundaria.

-LAS ENFERMERAS DE PEDIATRÍA TRABAJAMOS CON NIÑOS A LO LARGO DE TODA LA INFANCIA, DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA ADOLESCENCIA. PARA PODER ADAPTAR NUESTROS CUIDADOS A LA EDAD DE NUESTRO PEQUEÑO PACIENTE TENEMOS QUE CONOCER QUÉ HITOS DEL NEURODESARROLLO DEBEN IR ADQUIRIENDO; PARA VALORAR ESTO, TENEMOS VARIOS TEST, COMO EL TEST DE HAIZEA LLEVANT O EL TEST DE DENVER. EN LO QUE SE REFIERE A ÉSTE ÚLTIMO, EL TEST DE DENVER VALORA 4 ÁREAS, ENTRE LAS QUE NO ENCONTRAMOS:

B Comportamiento familiar

NIVEL: 1

A LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA ACUDE UNA MADRE CON SU HIJO DE 5 AÑOS Y COMPROBAMOS QUE EL ESTADO DE VACUNACIÓN ES INADECUADO. PARA COMENZAR LA INMUNIZACIÓN DE RESCATE ACELERADA, TENEMOS QUE TENER EN CUENTA QUE:

C El objetivo es llegar a la vacunación correcta para su edad, o alcanzar, en cualquier caso, una cobertura suficiente en el menor tiempo posible, priorizando las enfermedades evitables de mayor riesgo para el niño en ese momento.

-EN CUANTO A LA EXPLORACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DE UN NIÑO DE 4 AÑOS, DEL ÁREA DEL LENGUAJE ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES HALLAZGOS SE PUEDE CONSIDERAR UN SIGNO DE ALARMA EN EL PROCESO DE MADURACIÓN?

A No pregunta el porqué de las cosas.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: UN RECIÉN NACIDO A TÉRMINO DESARROLLA POLIGLOBULIA. ¿QUÉ COMPLICACIÓN PODRÍA OCURRIR?

B Ictericia neonatal.

-SEGÚN LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA, RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA PRIMERA INFANCIA, INDIQUE LA OPCIÓN CORRECTA:

C Se recomienda no introducir acelgas ni espinacas en los purés antes del primer año.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ REFLEJO DESAPARECE NORMALMENTE ALREDEDOR DE LOS 4-6 MESES DE VIDA?

A Reflejo de Moro.

-P. C. ES UNA MUJER DE 27 AÑOS QUE HACE 3 SEMANAS LE ADMINISTRARON LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA DE VHB. LE ACABAN DE DAR LOS RESULTADOS DE LOS MARCADORES SEROLÓGICOS DE LA RUBEOLA: AC ANTI RUBEOLA NEGATIVOS. TENIENDO EN CUENTA LA SITUACIÓN VACUNAL, ¿QUÉ INTERVENCIÓN ES ADECUADA?

C Vacunar de la triple vírica en el momento de la consulta y esperar una semana para la administración de la 2ª dosis de la vacuna VHB.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ CONDICIÓN REQUIERE SEGUIMIENTO ESTRECHO EN NEONATOS PREMATUROS QUE RECIBEN OXÍGENO PROLONGADO?

A Retinopatía del prematuro.

CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ MEDIDA ES PRIORITARIA EN UN RECIÉN NACIDO CON ASPIRACIÓN DE MECONIO?

C Intubación y aspiración de las vías respiratorias si es necesario.

-ANTE UNA PUNTUACIÓN 7 EN EL TEST DE APGAR AL MINUTO DE VIDA DE UN RECIÉN NACIDO, CABE ESPERAR:

C Frecuencia cardíaca >100, respiración regular, sonrosado, sin respuesta a estímulos y flexión moderada de las extremidades.

NIVEL: 2

-CASO CLÍNICO SIMULADO: EN UN RECIÉN NACIDO PREMATURO, ¿QUÉ CONDICIÓN PUEDE PREVENIRSE ADMINISTRANDO SURFACTANTE EXÓGENO?

D Síndrome de dificultad respiratoria neonatal.

-CUÁL DE LOS SIGUIENTES SIGNOS NO CORRESPONDE A LA VALORACIÓN DE LA MADUREZ NEUROMUSCULAR DEL RECIÉN NACIDO?

B Signo del arlequín.

-ESTÁS HACIENDO UNA REVISIÓN DEL NIÑO SANO A FELIPE, DE 11 AÑOS. CUANDO VALORAS EL DESARROLLO DE LOS CARÁCTERES SEXUALES SECUNDARIOS, OBSERVAS QUE TIENE LA PIEL DEL ESCROTO ENROJECIDA Y ARRUGADA, CON ALGO DE VELLO EN LA BASE DEL PENE, QUE ES TODAVÍA INFANTIL. ¿EN QUÉ ESTADIO DE TANNER DE DESARROLLO PUBERAL INCLUIRÍAS A FELIPE?

C Estadio 2

-LA AGUDEZA VISUAL VA AUMENTANDO CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA VISUAL Y HACIA LOS 4 MESES SE ESTIMA EN 20/200 Y A LOS 4 AÑOS, ENTRE 20/40 Y 20/20, PERO ALGUNOS NIÑOS PUEDEN NO ALCANZAR LA NORMALIDAD (20/20) HASTA LOS 7 AÑOS DE EDAD. CON LA EXPLORACIÓN SIMPLE DE LA AGUDEZA VISUAL EN UN NIÑO, MEDIANTE LAS ESCALAS DE OPTOTIPOS A UN MÍNIMO DE CINCO METROS, SE PUEDEN DIAGNOSTICAR:

B Miopías.

NIVEL: 3

-¿CÓMO SE DENOMINA LA SUTURA QUE SEPARA LOS TEMPORALES DE LOS PARIETALES?

B Sutura escamosa.

-MARIVÍ LE PREGUNTA SI PUEDE OFRECER “TROCITOS” A SU BEBÉ DE SEIS MESES. USTED LE DICE QUE A PARTIR DE ESA EDAD SE PUEDE EMPEZAR A DAR ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PERO QUE PARA HACERLO MEDIANTE EL MÉTODO BABY LED-WEANNING (BLW), EL NIÑO DEBE CUMPLIR UNA SERIE DE REQUISITOS, ¿CUÁL DE ELLOS NO ES NECESARIO?

A Que mantenga el reflejo de extrusión.

-CUÁL DE LOS SIGUIENTES REFLEJOS DEL RECIÉN NACIDO NO SE EXPLORARÍA COLOCÁNDOLE EN DECÚBITO SUPINO?

D Reflejo de galant.

-USTED ES RESIDENTE EN EL HOSPITAL DE SU CIUDAD, MAÑANA EMPIEZA SU ROTACIÓN EN LA PLATA DE MATERNIDAD Y QUIERE

REPASAR LOS CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO, DE LOS SIGUIENTES, ¿CUÁL NO SE APLICA LAS PRIMERAS 24 H DE VIDA?

D Realizar el cribado endocrino-metabólico.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: UN RECIÉN NACIDO A TÉRMINO MUESTRA CIANOSIS DISTAL EN LAS EXTREMIDADES. ¿CÓMO SE CLASIFICA ESTE SIGNO?

D Acroclanosis fisiológica.

NIVEL: 4

-CASO CLÍNICO SIMULADO: UN RECIÉN NACIDO A TÉRMINO PRESENTA CIANOSIS GENERALIZADA. ¿QUÉ PRUEBA ES PRIORITARIA?

A Gasometría arterial.

-ROCÍO ES UNA RECIÉN NACIDA QUE ACABA DE INGRESAR EN SU UNIDAD CON UNA HIPOGLUCEMIA SEVERA. TRAS ESTABILIZAR A LA PACIENTE, USTED DECIDE REALIZAR UNA VALORACIÓN FÍSICA COMPLETA Y OBSERVA QUE EN SU CABECITA TIENE UN CEFALOHEMATOMA, ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO ES UNA CARACTERÍSTICA DEL CEFALOHEMATOMA QUE PADECE ROCÍO?

D Es una colección serosanguinolenta subcutánea.

-SEÑALE EL SIGNO SUGESTIVO DE HIPERTENSIÓN INTRACRANEA:

C Fontanela anterior tensa y abombada.

CASO CLÍNICO SIMULADO: UN RECIÉN NACIDO PRESENTA HERNIA UMBILICAL PEQUEÑA SIN SIGNOS DE COMPROMISO. ¿QUÉ MANEJO INICIAL ES ADECUADO?

A Observación y seguimiento.

-¿CUÁL DE ESTAS RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS DE LA DIETA DE NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS ES FALSA?

B Por su contenido en mercurio, en niños menores de tres años hay que evitar el consumo de salmón, dorada y lubina.

-UNA MADRE DE SU CONSULTA ESTÁ PREOCUPADA PORQUE HA LEÍDO QUE LA LACTANCIA MATERNA ESTÁ RECOMENDADA HASTA LOS 2 AÑOS O MÁS, PERO LE DA MIEDO QUE SU BEBÉ LE HAGA DAÑO CON LOS DIENTES. ANTE ESTO USTED CONTESTA QUE NO PASA NADA PORQUE EL NIÑO TENGA DIENTES, PODRÁ MAMAR SIN PROBLEMA HASTA QUE AMBOS DESEEN. A ESTA INFORMACIÓN AÑADE QUE LA DENTICIÓN COMIENZA:

B A los 6 meses y a los 2 años y medio se ha completado la dentición caduca.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: UN BEBÉ PREMATURO DE 28 SEMANAS ES EVALUADO CON EL TEST DE BALLARD. ¿QUÉ ASPECTO VALORA ESTE TEST?

A La madurez física y neurológica.

NIVEL: 5

EL DESARROLLO DEL ORGANISMO DURANTE LA EDAD PEDIÁTRICA AFECTA A LA FARMACOCINÉTICA DE LOS MEDICAMENTOS; INDIQUE LA OPCIÓN INCORRECTA RESPECTO A

LOS FACTORES QUE PUEDEN MODIFICAR LA RESPUESTA A LOS FÁRMACOS:

B El pH gástrico es más ácido y el vaciado gástrico se encuentra aumentado hasta los tres meses de edad

-LOS NÓDULOS DE BOHN SE SITÚAN EN:

B El margen gingival.

-LAS VACUNAS PUEDEN CLASIFICARSE EN FUNCIÓN DEL ANTÍGENO QUE LAS COMPONE EN VACUNAS INACTIVADAS O VIVAS ATENUADAS. DENTRO DEL GRUPO DE LAS INACTIVADAS, PUEDEN SER ENTEROS O DE SUBUNIDADES. EN ESTE ÚLTIMO GRUPO, SEÑALE LA QUE NO CORRESPONDE:

C Conjugada: microorganismos enteros inactivados químicamente, por calor o por otros mecanismos.

-LA TRANSFERENCIA DEL CALOR CORPORAL DEL RECIÉN NACIDO HACIA LAS SUPERFICIES FRÍAS DEL AMBIENTE QUE NO ESTÁN EN CONTACTO CON EL CUERPO, SE DENOMINA:

A Radiación, y supone un 60% de la pérdida de calor.

-DIEGO, HOMBRE DE 31 AÑOS Y ENFERMERO, ACUDE A CONSULTA CON UN INFORME QUE EXPONE: SARAPIÓN NEGATIVO; RUBEOLA NEGATIVA; PAROTIDITIS POSITIVA. SE DESCONOCE SU HISTORIAL VACUNAL Y NO PRESENTA NINGÚN PROCESO DE SALUD CRÓNICO NI AGUDO. SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA ENTRE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

B Ante esta situación, la recomendación sería la administración de dos vacunas triple vírica con separación de al menos cuatro semanas entre ambas.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ REFLEJO ESTÁ AUSENTE EN NEONATOS CON HIPOTONÍA SEVERA?

A Reflejo de Moro.

-DE LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS A LA FAMILIA SOBRE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD, SEÑALE CUÁL NO ES RECOMENDABLE:

A Picar entre comidas para evitar tener mucha hambre en las comidas principales. Se recomiendan zumos enriquecidos.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: UN BEBÉ DE 3 DÍAS MUESTRA ICTERICIA CON BILIRRUBINA TOTAL DE 14 MG/DL. ¿QUÉ TIPO DE ICTERICIA ES MÁS PROBABLE?

C Ictericia fisiológica

NIVEL: 6

-LA “PRUEBA DEL CRIBADO DE DENVER” O “TEST DE DENVER” (DDST II) ES UNA HERRAMIENTA UTILIZADA EN EL SEGUIMIENTO DEL NIÑO SANO EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA. ¿QUÉ ÁREAS EVALUAREMOS SEGÚN LA APLICACIÓN DE DICHA PRUEBA?

A Lenguaje, motor grueso, motor fino adaptativo y personal-social.

-ES UN HALLAZGO NORMAL EN EL RECIÉN NACIDO DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DE VIDA:

D Con el llanto hasta 180 latidos por minuto.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ MECANISMO EVITA LA PÉRDIDA DE CALOR POR RADIACIÓN EN EL RECIÉN NACIDO?

C MANTENER AL BEBÉ EN CONTACTO PIEL CON PIEL

-AL DEFECTO CONGÉNITO DE LA PARED ABDOMINAL, LOCALIZADO HABITUALMENTE EN LA DERECHA DEL CORDÓN UMBILICAL, CON EXPOSICIÓN DEL INTESTINO Y SIN MEMBRANA DE RECUBRIMIENTO SE LE DENOMINA:

C GASTROSQUÍSIS.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: EN UN RECIÉN NACIDO CON ENTEROCOLITIS NECROSANTE, ¿CUÁL ES EL MANEJO INICIAL?

B AYUNO Y NUTRICIÓN PARENTERAL.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ PARÁMETRO NO FORMA PARTE DEL TEST DE APGAR?

B Tensión arterial.

NIVEL: 7

-CON ELACIÓN AL CRIBADO DE AMBLIOPÍA, ESTRABISMO Y TRASTORNOS DE LA REFRACCIÓN, IDENTIFIQUE LA OPCIÓN CORRECTA SI EN LA REVISIÓN LE TAPAMOS UN OJO CON LA MANO Y OBSERVAMOS AL OTRO Y AL NIÑO FIJA SU MIRADA EN UN OBJETO SITUADO A UNOS 40 CM:

B La prueba de Cover.

-CUÁL ES LA OPCIÓN INCORRECTA RESPECTO AL PIE ZAMBO?:

D DA LUGAR A UNA ELEVACIÓN DEL ARCO LONGITUDINAL DEL MEDIAL DEL PIE.

-TENIENDO PRESENTE LOS PRINCIPIOS GENERALES EN CUANTO AL INTERVALO MÍNIMO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NO

SIMULTÁNEA DE VACUNAS DISTINTAS, IDENTIFIQUE EL INTERVALO MÍNIMO ENTRE UNA VACUNA INACTIVADA Y OTRA ATENUADA:

B Ninguno.

-SEGÚN EL PROTOCOLO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A LA EDAD PEDIÁTRICA, ¿CUÁNTAS PIEZAS DENTALES DEBERÍA TENER UN NIÑO DE 8 AÑOS SEGÚN EL CALENDARIO DE DENTICIÓN?

B 24

-LA CIRCULACIÓN FETAL TIENE UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS QUE LA DIFERENCIAN DE LA CIRCULACIÓN POSNATAL, Y QUE ES IMPORTANTE CONOCER PARA IDENTIFICAR PRECOZMENTE PROBLEMAS EN EL PERÍODO NEONATAL. POR ESTE MOTIVO, USTED SABE QUE, EN EL FETO, EL PORCENTAJE DEL VOLUMEN SANGUÍNEO QUE PASARÁ POR LA ARTERIA PULMONAR A LA CIRCULACIÓN PULMONAR Y TIENE LA FUNCIÓN DE NUTRIR A LOS PULMONES ES:

A 0,08

-CASO CLÍNICO SIMULADO: UN RECIÉN NACIDO MUESTRA LANUGO PROMINENTE EN HOMBROS Y ESPALDA. ¿QUÉ FACTOR PODRÍA ASOCIARSE A ESTE HALLAZGO?

C Prematuridad.

-CUÁL DE LAS SIGUIENTES SE CONSIDERA UNA VERDADERA CONTRAINDICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE UNA VACUNA SISTEMÁTICA?

C Reacción alérgica grave a esa vacuna o a uno de sus componentes.

EN LA REVISIÓN DE 12 MESES DEL NIÑO SANO, USTED DETECTA UN SIGNO DE ALARMA, POR LO QUE DECIDE CONSULTAR A UN PEDIATRA. ¿CUÁL ES?

C No pasa juguetes de una mano a otra.

NIVEL: 8

CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ MEDIDA PREVIENE LA BRONQUIOLITIS GRAVE EN BEBÉS DE ALTO RIESGO?

D Inmunización con palivizumab.

-MARTA SIEMPRE SE HACE UN LÍO AL REPASAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL CRÁNEO DEL RECIÉN NACIDO, ASÍ QUE ESTÁ REPASANDO LOS TEST DE PEDIATRÍA PARA AFIANZAR LOS CONCEPTOS. UNA VEZ QUE HA TERMINADO EL REPASO YA TIENE CLARO QUE, LA PROTUBERANCIA EDEMATOSA DEL TEJIDO BLANDO DEL CUERO CABELLUDO, QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DE LOS BORDES DEL PROPIO HUESO DEL CRÁNEO SOBRE EL QUE APARECE Y ES BLANDO PERO NO FLUCTUANTE, SE CORRESPONDE CON:

D Caput succedaneum

-TRAS UN PARTO NORMAL A TÉRMINO SE OBSERVA QUE EL BEBÉ TIENE UN LATIDO CARDÍACO DE 130 LATIDOS POR MINUTO, RESPIRA CON ARMONÍA Y TRANQUILIDAD, TIENE MOVIMIENTOS ESPONTÁNEOS, COLOR ROSADO Y BUENA RESPUESTA AL ESTÍMULO DE SUCCIÓN. ¿QUÉ VALOR RESULTARÁ EN LA REALIZACIÓN DEL TEST DE APGAR?

D Apgar 9. Estado satisfactorio

-CASO CLÍNICO SIMULADO: UN RECIÉN NACIDO TIENE FONTANELAS ABULTADAS Y VÓMITOS FRECUENTES. ¿QUÉ DIAGNÓSTICO SE DEBE CONSIDERAR?

A Hidrocefalia.

-IRATXE SE VA A INCORPORAR A TRABAJAR DESPUÉS DE SU BAJA MATERNA Y NOS PREGUNTA CÓMO PUEDE SEGUIR ALIMENTANDO A SU BEBÉ CON LECHE MATERNA. NOSOTROS LE INFORMAMOS DEL PROCEDIMIENTO, DICIÉNDOLE TODO LO SIGUIENTE EXCEPTO:

D Cuando tenga que descongelar la leche, debe hacerlo de forma gradual, pudiendo utilizar el microondas a baja potencia.

NIVEL: 9

-EN EL ESQUEMA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO PUBERAL DE TANNER, EL ESTADIO O NIVEL 5 EN LAS MUJERES SE CORRESPONDE CON:

A Desarrollo completo de la mamá y triángulo de vello público completo como en mujeres adultas.

-SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA EN RELACIÓN CON LA VACUNA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH):

D No se recomienda la vacunación frente a VPH en mujeres tratadas por lesiones cervicales premalignas.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ INTERVENCIÓN ES CRUCIAL EN UN NEONATO CON HIPOGLUCEMIA ASINTOMÁTICA?

C Iniciar alimentación enteral inmediata

-CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ CARACTERÍSTICA DISTINGUE EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO FISIOLÓGICO EN NEONATOS?

A Regurgitaciones sin impacto en el crecimiento.

-PARA DETECTAR ENFERMEDADES METABÓLICAS CONGÉNITAS EN EL RECIÉN NACIDO, LA MUESTRA OBTENIDA CON LA PUNCIÓN DEL TALÓN (GOTAS DE SANGRE) SERÁ DEPOSITADA EN:

D Papeles de filtro Wathman.

NIVEL: 10

EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN QUE DEBEN REALIZAR LAS ENFERMERAS EN LOS PROGRAMAS DE SALUD INFANTIL, SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

C En los controles de salud del primer año de vida debe aconsejarse el uso de andadores.

-USTED SE ENCUENTRA EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA DONDE VA A VACUNAR A UNA PERSONA. OBSERVE EN EL PROSPECTO QUE ENTRE LOS COMPONENTES DE LA VACUNA SE ENCUENTRA UN ADYUVANTE. ¿A QUÉ SE REFIERE DICHO COMPONENTE?

D Un adyuvante es una sustancia que incrementa la inmunogenicidad del antígeno vacunal.

-INDICA CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES NO SUPONE UNA RESPUESTA NORMAL DEL DESARROLLO MOTOR DEL NIÑO EN SU PRIMER AÑO DE VIDA:

A Hacia los 12 meses, aparece el acto de correr.

-¿CUÁL NO ES UN SIGNO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL NEONATO?:

D Cianosis.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: ¿QUÉ FACTOR AUMENTA EL RIESGO DE HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR EN LOS RECIÉN NACIDOS?

D Fragilidad de la matriz germinal.

-CASO CLÍNICO SIMULADO: UN RECIÉN NACIDO TIENE UN CEFALOHEMATOMA. ¿QUÉ INTERVENCIÓN ES NECESARIA?

B Vigilancia y control clínico.

ENTRE QUE HUESOS DEL CRÁNEO SE SITÚA LA SUTURA CORONAL?

D Entre parietal y frontal.

ESTÁS VALORANDO A MOHAMED, DE UN AÑITO, JUNTO A TU TUTORA. EN LA CONSULTA NOS ENCONTRAMOS CON BARRERAS IDIOMÁTICAS ASÍ QUE PARA VALORAR SU DESARROLLO PSICOMOTOR, SE TE OCURRE PONER AL NIÑO EN DISTINTAS SITUACIONES PARA VER QUÉ HACE, EN LUGAR DE PREGUNTAR A SU MADRE. DE LOS SIGUIENTES HITOS, HAY UNO QUE NO ESPERAS ENCONTRAR, ¿CUÁL ES?

A Sube escalones.

-DE LAS SIGUIENTES, HAY UNA CARACTÉRISTICA QUE CONSIDERAMOS PATOLÓGICA EN EL RECIÉN NACIDO, ¿CUÁL ES?

B Pliegue palmar único.

SOBRE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE UN NIÑO SANO EN LOS PRIMEROS 18 MESES DE VIDA. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES HALLAZGOS SE CONSIDERARÍA COMO UN SIGNO DE ALARMA?:

C Ausencia de transferencia contralateral de objetos a los 12 meses.

-LA GASTROSQUISIS CONSISTE EN:

C Evisceración del paquete abdominal sin revestimiento peritoneal.

-¿QUÉ PARÁMETRO NO INDICA UN BUEN INICIO E INSTALACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA?

B Se escuchan sonidos de chupeteo.

-DE LAS SIGUIENTES OPCIONES INDIQUE QUÉ OPCIÓN ES CIERTA COMO CONTRAINDICACIÓN EN VACUNACIÓN:

A Cardiopatías descompensadas.