

IT.Q009 > Caso práctico: Servicios, criterios y roles del equipo multidisciplinar de la hospitalización a domicil

Comenzado el	lunes, 16 de marzo de 2026, 09:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 16 de marzo de 2026, 09:13
Tiempo empleado	1 minutos 41 segundos
Puntos	6,00/6,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Información



Insuficiencia cardíaca descompensada en HaD

Situación:

María, 84 años, insuficiencia cardíaca con FEVI 35%. Ingresa por descompensación congestiva.

Tras 72 horas de diurético IV presenta estabilidad hemodinámica, mejoría clínica y función renal estable.

Vive con su hija, cuidadora principal.

Se plantea continuar tratamiento intravenoso y monitorización en Hospitalización a Domicilio.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué condición clínica permite su inclusión en HaD?

- ☐ a. Persistencia de disnea leve con esfuerzo.
- ☒ b. Estabilidad hemodinámica tras fase aguda hospitalaria. ✓
- ☐ c. Edad avanzada con apoyo familiar.
- ☐ d. Necesidad de control cardiológico frecuente.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el principal riesgo en domicilio en este caso?

- ☐ a. Desarrollo súbito de arritmia maligna sin antecedentes.
 - ☒ b. Reagudización por ajuste inadecuado del tratamiento o detección tardía de congestión. ✓
 - ☐ c. Aparición de infección respiratoria hospitalaria.
 - ☐ d. Suspensión voluntaria del tratamiento por parte del paciente.
-

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué intervención enfermera es más relevante para evitar reingresos?

- ☐ a. Administración estricta del diurético IV.
 - ☒ b. Educación y detección precoz de signos de alarma (peso, disnea, edemas). ✓
 - ☐ c. Registro exhaustivo en historia clínica.
 - ☐ d. Derivación precoz ante cualquier síntoma leve.
-

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué situación obligaría a reconsiderar su permanencia en HaD?

- ☐ a. Edemas maleolares leves persistentes.
 - ☐ b. Tos ocasional nocturna.
 - ☒ c. Hipotensión sintomática o deterioro de función renal. ✓
 - ☐ d. Necesidad de reajuste de tratamiento oral.
-

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué tipo de HaD corresponde a este caso?

- ☒ a. HaD sustitutiva tras ingreso convencional. ✓
 - ☐ b. HaD paliativa.
 - ☐ c. HaD ambulatoria de seguimiento.
 - ☐ d. HaD psiquiátrica.
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Qué principio organizativo se aplica especialmente aquí?

- ☐ a. Atención centrada exclusivamente en el médico responsable.
 - ☒ b. Coordinación interdisciplinar con corresponsabilidad clínica. ✓
 - ☐ c. Derivación temprana a Atención Primaria sin seguimiento hospitalario.
 - ☐ d. Reducción de visitas presenciales para fomentar autonomía.
-

Actividad previa

Prueba de conocimientos
Módulo 2

Ir a...