

Comenzado el	lunes, 16 de marzo de 2026, 20:46
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 16 de marzo de 2026, 20:57
Tiempo empleado	11 minutos 2 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Información

Nos encontramos trabajando en la unidad de cardiología, cuando avisan por el paciente de la habitación 311, que ha comenzado a encontrarse mal. Se trata de un paciente de 68 años, hospitalizado tras haber sufrido un síndrome coronario agudo, que precisó de una angioplastia primaria en la que colocaron 3 stents.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A nuestra llegada a la habitación encontramos al paciente que aparentemente no respira, indica que harías a continuación:

- ☐ a. Comenzar a aplicar compresiones torácicas.
- ☐ b. Realizar una cardioversión sincronizada.
- ☐ c. Realizar una desfibrilación.
- ☒ d. Pedir ayuda y valorar la respiración. ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El paciente no respira y no tiene pulso, como actuarías a continuación:

- ☒ a. Comenzar a realizar compresiones y ventilaciones, 30:2. ✓
- ☐ b. Aplicar 5 ventilaciones de rescate.
- ☐ c. Realizar masaje carotídeo.
- ☐ d. Aplicar un golpe precordial.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando traen el monitor desfibrilador y monitorizas al paciente, identificas que presenta una fibrilación ventricular (FV), ¿qué harías a continuación?

- ☐ a. Administrar adrenalina según haya un acceso IV disponible.
- ☐ b. Realizar una cardioversión sincronizada.
- ☒ c. Realizar una desfibrilación. ✓
- ☐ d. Administrar 300 mg de amiodarona, ya que se trata de una arritmia grave.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras la descarga, ¿cómo procedes?

- ☐ a. Compruebas el pulso.
- ☐ b. Realizas un ECG para afinar el diagnóstico.
- ☒ c. Reinicias las compresiones. ✓
- ☐ d. Administras la primera dosis de adrenalina.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras la tercera descarga persiste la FV, indique que sería lo más adecuado:

- ☒ a. Administrar una dosis de amiodarona IV. ✓
- ☐ b. Administrar bicarbonato IV.
- ☐ c. Administrar atropina IV.
- ☐ d. Administrar dopamina IV.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Realizamos un manejo avanzado de la vía aérea y colocamos la medición de la capnografía, que marca < 10 mmHg, ¿qué indica este valor?

- ☐ a. Una buena perfusión.
- ☐ b. Posibilidad de recuperación de la circulación espontánea.
- ☒ c. Mala calidad de la RCP. ✓
- ☐ d. Hiperventilación.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tiempo ideal de las pausas durante la RCP deben ser de:

- ☐ a. Más de 20 segundos.
- ☐ b. Menos de 20 segundos.
- ☐ c. 10-20 segundos.
- ☒ d. Menos de 10 segundos. ✓

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No tenemos VVP, ¿cuál sería la vía más indicada para administrar fármacos en este caso?

- ☐ a. Insistir hasta obtener un acceso IV.
- ☐ b. Endotraqueal.
- ☒ c. Intraósea. ✓
- ☐ d. Intramuscular.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al realizar un manejo avanzado de la vía aérea, ¿cuál sería el ritmo adecuado para ventilar al paciente?

- ☐ a. 30:2.
- ☐ b. 15:2.
- ☐ c. 20 ventilaciones/minuto.
- ☒ d. 10 ventilaciones/minuto. ✓

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras la recuperación de la circulación espontánea indique que acción sería prioritaria:

- ☒ a. Mantener una PAM de 65 mmHg. ✓
- ☐ b. Control de la temperatura.
- ☐ c. Evitar la hiper/hipoglucemia.
- ☐ d. Realizar un TAC.