

<b>Comenzado el</b>	lunes, 13 de abril de 2026, 11:22
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	lunes, 13 de abril de 2026, 11:37
<b>Tiempo empleado</b>	14 minutos 34 segundos
<b>Puntos</b>	18,00/20,00
<b>Calificación</b>	9,00 de 10,00 (90%)
<b>Comentario -</b>	Apto

Pregunta

1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la dosis de Alteplasa que se administraría a un paciente de 130 kg de peso para fibrinólisis de un ictus isquémico?

- a. 100 mg.
- b. 90 mg.
- c. 117 mg. ✘
- d. 120 mg.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué síntoma se considera un factor agravante en el dolor abdominal?

- a. Dolor de instauración gradual.
- b. Dolor de inicio súbito y máximo al inicio. ✔
- c. Dolor que cede con la deambulación.
- d. Dolor tipo cólico de larga evolución.

Pregunta

**3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes indique cual sería un fármaco de primera línea para el tratamiento de la crisis comicial en un paciente con VVP.

- a. Fenitoína.
- b. Ketamina.
- c. Ácido valproico.
- d. Diazepam. ✓

Pregunta

**4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la escala NIHSS, una puntuación  $\geq 25$  indica:

- a. Ictus leve.
- b. Ictus muy grave. ✓
- c. Ictus moderado.
- d. Ictus grave.

Pregunta

**5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo de saturación de oxígeno en el manejo inicial del código ictus?

- a.  $\geq 90$  %.
- b.  $\geq 92$  %.
- c.  $\geq 95$  %. ✓
- d.  $\geq 88$  %.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fármaco se administra 30 minutos antes de una gastroscopia urgente para favorecer el vaciamiento gástrico?

- a. Somatostatina 250 mcg.
- b. Eritromicina 250 mg. ✓
- c. Motilium 10 mg.
- d. Omeprazol 40 mg.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué postura refleja indica lesión neurológica grave con extensión anormal?

- a. Descerebración. ✓
- b. Decorticación.
- c. Mioclónica.
- d. Raquílica.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La hemorragia digestiva alta se localiza anatómicamente por encima de:

- a. El esfínter pilórico.
- b. La Válvula ileocecal.
- c. El ángulo de Treitz. ✓
- d. El cardias.

Pregunta

9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En la escala de Madrid Direct, ¿cuántos puntos se restan si la PAS está en 205 mmHg?

- a. 4 puntos.
- b. 2 puntos. ✘
- c. 1 punto.
- d. 3 puntos.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo es el dolor típicamente característico de la isquemia mesentérica?

- a. Difuso, brusco e intenso. ✔
- b. Localizado, moderado y gradual.
- c. Rápido, sordo y severo.
- d. Cólico, moderado y gradual.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes signos es típico de hemorragia digestiva alta?

- a. Hematoquecia.
- b. Melenas. ✔
- c. Rectorragia.
- d. Heces acólicas.

Pregunta

**12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El patrón respiratorio de Kussmaul es característico de:

- a. Alcalosis respiratoria.
- b. Lesión del bulbo raquídeo.
- c. Obstrucción intestinal.
- d. Acidosis metabólica. ✓

Pregunta

**13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según los criterios ADA 2025, ¿qué valor de HbA1c confirma el diagnóstico de diabetes?

- a.  $\geq 6.5\%$  ✓
- b.  $\geq 6.0\%$
- c.  $\geq 7.0\%$
- d.  $\geq 5.7\%$

Pregunta

**14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente con bajo nivel de conciencia, ¿qué puntuación en la escala de Glasgow indica necesidad de valorar intubación?

- a.  $\leq 12$ .
- b.  $\leq 9$ .
- c.  $\leq 8$ . ✓
- d.  $\leq 6$ .

Pregunta

**15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué situación es característica la aparición de la onda U en el ECG?

- a. Hipokalemia. ✓
- b. Hipocalcemia.
- c. Hiperpotasemia.
- d. Hiponatremia.

Pregunta

**16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el tratamiento de la hiponatremia, se debe evitar una corrección excesivamente rápida para prevenir:

- a. Edema agudo de pulmón.
- b. Hipertensión intracraneal.
- c. Síndrome de desmielinización osmótica. ✓
- d. Crisis comiciales.

Pregunta

**17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para un paciente inconsciente, con hipoglucemia y sin vía venosa, ¿cuál sería la alternativa terapéutica más adecuada?

- a. Hidrocortisona 100 mg IM.
- b. Glucosa 10 g VO.
- c. SG 10% IO.
- d. Glucagón IM. ✓

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué complicación sospecharíamos si un paciente con hipoglucemia no recupera la conciencia en 10-30 minutos tras normalizar la glucemia?

- a. Ictus isquémico asociado.
- b. Edema cerebral. ✓
- c. Estado epiléptico no convulsivo.
- d. Intoxicación por opiáceos.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la cetoacidosis diabética, si el potasio es  $< 3.3$  mEq/L, la actuación correcta sería:

- a. Administrar gluconato cálcico antes de administrar insulina, hay que corregir la hiperpotasemia primero.
- b. Iniciar perfusión de insulina y fluidoterapia sin importar la cifra de potasio.
- c. Administrar K+ antes de iniciar la perfusión de insulina. ✓
- d. No administrar nada y reevaluar en 2 horas.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la escala Madrid Direct, una puntuación de 2 puntos indica:

- a. Vigilancia domiciliaria.
- b. Ingreso en UCI/unidad de ictus.
- c. Ictus hemorrágico.
- d. Traslado a centro con neuro intervencionismo. ✓