

Comenzado el	lunes, 13 de abril de 2026, 11:38
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de abril de 2026, 11:56
Tiempo empleado	17 minutos 54 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Información



Varón de 72 años, traído por familiares por debilidad brusca en hemicuerpo derecho y dificultad para hablar hace 90 minutos. Antecedentes: HTA, FA anticoagulada con Sintrom. Exploración: Consciente, obedece órdenes, desviación de la mirada a la izquierda, parálisis facial derecha, fuerza 0/4 en brazo y pierna derechos. TA 195/105 mmHg.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué escala utilizarías para valorar la gravedad del ictus?

- a. Rankin modificada.
- b. NIHSS. ✓
- c. Madrid Direct.
- d. Glasgow.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con esta información, ¿qué puntuación recibiría en la escala Madrid Direct?

- a. 4 puntos.
- b. 2 puntos. ✓
- c. 5 puntos.
- d. 3 puntos.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sabiendo que el paciente hace vida normal y es independiente, ¿cumple criterios de código ictus?

- a. No, el paciente es mayor de 70 años.
- b. No, el paciente está anticoagulado.
- c. Si, tiene Rankin ≤ 2 . ✓
- d. Solo si la TAS baja de 185 mmHg.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la escala NIHSS, la parálisis completa del brazo derecho y una afasia grave puntuarían:

- a. 11.
- b. 6. ✓
- c. 7.
- d. 5.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería la prueba idónea para realizar diagnóstico?

- a. Eco-Doppler
- b. RNM.
- c. TAC. ✓
- d. PET.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el paciente presenta una crisis comicial durante el traslado, el fármaco de primera línea para su manejo es:

- a. Levetiracetam IV.
- b. Haloperidol IV.
- c. Propofol IV.
- d. Diazepam IV. ✓

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si fuera necesario revertir la anticoagulación, ¿qué fármaco utilizarías?

- a. Idarizumab IV.
- b. Sulfato de protamina IV.
- c. Vitamina K IV. ✓
- d. Tocoferol IV.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué objetivo de glucemia te marcarías en este paciente?

- a. 100-200 mg/dl.
- b. 90-170 mg/dl.
- c. 80-180 mg/dl. ✓
- d. 110-200 mg/dl.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería el fármaco más indicado si decidiéramos únicamente fibrinolizar al paciente?

- a. Tenecteplasa IV.
- b. Estreptoquinasa IV.
- c. Alteplasa IV. ✓
- d. Uroquinasa IV.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con la información obtenida, ¿dónde trasladarías al paciente?

- a. UCI.
- b. Centro con neuro intervencionismo. ✓
- c. Unidad de ictus.
- d. Observación domiciliaria.