

Comenzado el	viernes, 17 de abril de 2026, 08:43
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 17 de abril de 2026, 08:50
Tiempo empleado	6 minutos 45 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un factor que puede provocar errores en la pulsioximetría es:

- a. Frecuencia respiratoria elevada
- b. Baja perfusión periférica ✓
- c. Saturación basal alta
- d. Exceso de hidratación

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un error frecuente con inhaladores presurizados (pMDI) es:

- a. Exhalar antes del disparo
- b. Inhalar lentamente
- c. Falta de coordinación inhalación-pulsación ✓
- d. Mantener la apnea tras inhalar

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El patrón de Gordon relacionado con conocimientos del estoma corresponde a:

- a. Rol-relaciones
 - b. Nutricional-metabólico
 - c. Cognitivo-perceptual ✓
 - d. Eliminación
-

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La pulsioximetría es especialmente útil para el seguimiento de pacientes con:

- a. Hepatopatía crónica
 - b. Anemia
 - c. EPOC ✓
 - d. Hipotiroidismo
-

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tratamiento básico de la úlcera venosa incluye:

- a. Antibióticos sistémicos siempre
 - b. Compresión elástica ✓
 - c. Vendaje rígido permanente
 - d. Mirar la herida sin intervenir
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el cuidado de la piel periestomal, se debe:

- a. Limpiar con alcohol
- b. No secar la piel antes del adhesivo
- c. Usar productos oleosos
- d. Evitar la humedad excesiva para prevenir irritación ✓

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los dispositivos subcutáneos implantables (ports) se indican para:

- a. Terapias repetidas y prolongadas ✓
- b. Terapias de 24 h
- c. Administrar solo fluidos
- d. No tocar nunca el sistema

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la duración recomendada de un catéter venoso periférico (CVP) en HaD?

- a. Menos de 7 días ✓
- b. Entre 7–14 días
- c. Más de 1 mes
- d. Depende del material exclusivamente

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En OTD, un riesgo grave es:

- a. Hipotermia
- b. Fiebre
- c. Incendio por fumar cerca del oxígeno ✓
- d. Hiperglucemia

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para usar bombas de infusión en domicilio, el paciente debe:

- a. Tener soporte familiar o cuidador formado ✓
- b. Estar inconsciente
- c. No disponer de acceso venoso
- d. No tener contacto con enfermería

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las bombas electrónicas destacan por:

- a. No tener alarmas
- b. Carecer de precisión
- c. Permitir programación exacta del flujo ✓
- d. No registrar datos

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la extracción sanguínea, el sitio preferente de punción es:

- a. Fosa antecubital ✓
- b. Región femoral
- c. Dorso de la mano
- d. Vena yugular externa

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La higiene del punto de inserción debe realizarse con:

- a. Agua oxigenada
- b. Agua sola
- c. Antisépticos adecuados (clorhexidina) ✓
- d. Aceites esenciales

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El pie diabético es frecuente debido a:

- a. Hiperestesia
- b. Aumento de perfusión
- c. Neuropatía sensitiva ✓
- d. Piel engrosada y vascularizada

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la colocación de sondaje nasogástrico, un método habitual de comprobación inicial es:

- a. Radiografía torácica obligatoria
- b. Auscultación abdominal sin más
- c. Aspirado de contenido gástrico ✓
- d. Prueba con ultrasonido de cuello

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En sondajes, una causa de infección urinaria es:

- a. Buena hidratación
- b. Malos cuidados de higiene ✓
- c. Catéter bien fijado
- d. Cambio programado

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En heridas complejas, el registro fotográfico permite:

- a. No medir la herida
- b. Evitar nuevas curas
- c. Documentar evolución de forma objetiva ✓
- d. Sustituir la valoración

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La confirmación de posición de un CVC tras su inserción habitualmente requiere:

- a. Gasometría arterial
- b. Ecografía abdominal
- c. Auscultación pulmonar
- d. Prueba radiológica o protocolo equivalente ✓

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una complicación frecuente en urostomías es:

- a. Estreñimiento
- b. Colitis
- c. Infección urinaria ✓
- d. Hemorragia masiva

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La ecografía domiciliaria permite identificar con rapidez:

- a. Aneurismas aórticos
- b. Estenosis carotídea
- c. Derrames pleurales ✓
- d. Tumores sólidos complejos