

# Prueba de conocimientos Módulo 4

## Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el shock séptico, ¿cuál es el objetivo de Presión Arterial Media (PAM) tras la reposición inicial?

- a. 80-90 mmHg.
- b. Mayor de 100 mmHg.
- c. 65-75 mmHg.
- d. 50-60 mmHg.

## Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el tratamiento de elección inicial ante la sospecha de shock anafiláctico?

- a. Metilprednisolona IV.
- b. Adrenalina IM.
- c. Salbutamol nebulizado.
- d. Glucagón IM si el paciente toma betabloqueantes.

## Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El síndrome colinérgico (por ejemplo, intoxicación con insecticidas) se caracteriza por:

- a. Midriasis y piel seca.
- b. Alucinaciones y midriasis.
- c. Hipertensión y agitación.
- d. Miosis, salivación y bradicardia.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué acción está estrictamente contraindicada ante una metrorragia en el tercer trimestre sin diagnóstico previo?

- a. Inspección y palpación abdominal.
- b. Monitorización fetal.
- c. Realizar un tacto vaginal.
- d. Maniobras de Leopold.

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál sería la dosis inicial de Naloxona en intoxicación por opiáceos?

- a. 2 mg IV.
- b. 0,01-0,03 mg/kg IV.
- c. 10 mg en perfusión.
- d. 0,3 mg bolo IV.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el fármaco de elección para prevenir las convulsiones en la preeclampsia?

- a. Diazepam.
- b. Sulfato de Magnesio.
- c. Fenitoína.
- d. Labetalol.

## Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un TCE, ¿qué puntuación de la Escala de Glasgow (GCS) indicaría la necesidad de manejo avanzado de vía aérea?

- a. 8.
- b. 10.
- c. 15 y cefalea severa.
- d. 10-12.

## Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración inicial del trauma (XABCDE), la "X" representa:

- a. Estabilización de fracturas.
- b. Control cervical.
- c. Control de hemorragias.
- d. Manejo de la vía aérea.

## Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el antídoto específico para la intoxicación por benzodiazepinas con riesgo vital?

- a. Naloxona.
- b. Flumazenilo.
- c. Fisostigmina.
- d. Atropina.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la posición recomendada para una gestante de >20 semanas para evitar la compresión de la vena cava?

- a. Trendelenburg.
- b. Decúbito lateral derecho.
- c. Fowler.
- d. Decúbito lateral izquierdo.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fórmula de Parkland para la reposición de líquidos en quemados es:

- a.  $2 \text{ ml} \times \text{kg} \times \% \text{ SCQ}$ .
- b.  $4 \text{ ml} \times \text{kg} \times \% \text{ SCQ}$ .
- c.  $10 \text{ ml} \times \% \text{ SCQ}$ .
- d. 500 ml/h.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los signos típicos del shock neurogénico?

- a. Disminución del nivel de conciencia y palpitaciones.
- b. Disnea y agitación.
- c. Fiebre y taquicardia.
- d. Bradicardia e hipotensión.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La eclampsia se diferencia de la preeclampsia grave por:

- a. La presencia de proteinuria.
- b. Cifras de TA > 160/110 mmHg.
- c. La aparición de convulsiones.
- d. El edema generalizado.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante un prolapso de cordón, la maniobra prioritaria es:

- a. Reintroducir el cordón en el útero.
- b. Colocar a la madre en posición de Fowler.
- c. Inducir el pujo materno.
- d. Rechazar la presentación fetal para aliviar la compresión.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la "Regla de los Nueve", ¿qué porcentaje se asigna a los genitales?

- a. 9%.
- b. 4,5%.
- c. 1%.
- d. 0,5%.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la dosis estándar de Ácido Tranexámico (TXA) en trauma grave?

- a. 1 g en bolo rápido IV o IO
- b. 2 g administrados lentamente IV o IO.
- c. 500 mg cada 8 horas IV.
- d. 10 mg/kg de peso corporal IV.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la atonía uterina, la primera medida farmacológica suele ser:

- a. Oxitocina IV.
- b. Prostaglandinas.
- c. Metilergometrina.
- d. Masaje uterino.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La maniobra de McRoberts se utiliza en:

- a. El parto de nalgas.
- b. La distocia de hombros.
- c. El prolapso de cordón.
- d. El desprendimiento de placenta.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué fármaco antihipertensivo está contraindicado en la gestante?

- a. Labetalol.
- b. IECAs.
- c. Metildopa.
- d. Hidralacina.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paciente con Hemorragia Clase III se caracteriza por:

- a. Frecuencia cardíaca ligeramente aumentada.
- b. Hipoxia.
- c. Disminución de la presión sistólica y confusión.
- d. Presión arterial normal y ansiedad leve.