

# Curso: Agentes biológicos como factores de riesgo profesional de los trabajadores sanitarios

1. [AV.Q072\\_26](#)
2. Curso: Agentes biológicos como factores de riesgo profesional de los trabajadores sanitarios

<b>Comenzado el</b>	domingo, 31 de mayo de 2026, 17:17
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	domingo, 31 de mayo de 2026, 17:23
<b>Tiempo empleado</b>	5 minutos 39 segundos
<b>Puntos</b>	30,00/30,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> )

**Comentario -**

Apto

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué nivel de acción preventiva de la OMS se enmarca la prevención de riesgos laborales?

Pregunta 1 Seleccione una:

a.

Prevención Primaria

b.

Prevención Secundaria

c.

Prevención Terciaria

d.

La Prevención de Riesgos Laborales no se puede enmarcar en ningún nivel de acción preventiva de la OMS

### Retroalimentación

Prevención primaria: aquellas medidas destinadas a disminuir la probabilidad de que ocurra la enfermedad antes de que ésta aparezca. Pretende disminuir la incidencia al reducir el riesgo de aparición de nuevos casos. Entre ellas se encuentran la Prevención de Riesgos Laborales.

La respuesta correcta es: Prevención Primaria

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Los agentes biológicos de Grupo 3 (señale la respuesta correcta)

Pregunta 2 Seleccione una:

a.

Pueden causar enfermedad grave en humanos

b.

Hay riesgo de transmisión por la población

c.

Existe tratamiento efectivo

d.

Todas son correctas

#### Retroalimentación

Todas ellas son características de los AB pertenecientes al Grupo 3

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La mejor forma de prevenir la transmisión de agentes biológicos en el trabajo es:

Pregunta 3 Seleccione una:

a.

Implementar la prevención secundaria

b.

Evitar o minimizar la exposición al agente patógeno

c.

Implementar la prevención secundaria y terciaria

d.

Todas son falsas

#### Retroalimentación

La mejor forma de prevenir la transmisión en el trabajo es evitar o minimizar la exposición al agente patógeno, estas medidas deben tomarse desde el inicio de la exposición frente al AB, pero también en los mecanismos de transmisión y sobre el sujeto receptor (trabajadores en riesgo).

La respuesta correcta es: Evitar o minimizar la exposición al agente patógeno

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Los agentes biológicos pueden ser responsables de:

Pregunta 4 Seleccione una:

a.

Infecciones

b.

Efectos Alérgicos

c.

A y B son correctas

d.

Todas son falsas

### Retroalimentación

Los AB pueden ser responsables de infecciones, efectos alérgicos, tóxicos y cancerígenos

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La evaluación del riesgo biológico (señale la respuesta falsa)

Pregunta 5 Seleccione una:

a.

No requiere la identificación del agente biológico

b.

Debe ser llevada a cabo para salvaguardar la seguridad y salud del trabajador

c.

No influye en nuestra actuación como enfermeros en la Vigilancia de la Salud

d.

Requiere la identificación teórica de los riesgos y la evaluación de los puestos de trabajo con riesgos de los trabajadores expuestos

### Retroalimentación

El riesgo biológico debe ser evaluado y controlado para salvaguardar la seguridad y salud del trabajador, iniciando la identificación del agente responsable

La respuesta correcta es: No requiere la identificación del agente biológico

## Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para prevenir la transmisión de agentes biológicos en el medio laboral, se debe:

Pregunta 6 Seleccione una:

a.

Reducir los riesgos

b.

Gestionar los residuos

c.

Adoptar medidas higiénicas

d.

Todas son correctas

### Retroalimentación

Todas las respuestas son medidas destinadas a prevenir la transmisión de los agentes biológicos en el medio laboral

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Quién debe responsabilizarse del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección?

Pregunta 7 Seleccione una:

a.

El empresario

b.

El trabajador

c.

El empresario o el trabajador

d.  
Ninguna de las anteriores

#### Retroalimentación

El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohibido que el personal se lleve los mismos a su domicilio para tal fin

La respuesta correcta es: El empresario

Pregunta **8**  
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta falsa en relación a la formación e información a los trabajadores en materia preventiva:

Pregunta 8 Seleccione una:



a.

Se impartirá cuando el trabajador se incorpore a un puesto de trabajo con riesgo de exposición a AB, cuando aparezcan nuevos riesgos y deberá repetirse periódicamente, cuando sea necesario



b.

Se impartirá cuando el trabajador se incorpore a un puesto de trabajo con riesgo de exposición a AB y cuando aparezcan nuevos riesgos



c.

Se impartirá solamente durante la incorporación del a un puesto de trabajo con riesgo de exposición a AB y cuando aparezcan nuevos riesgos, sin necesidad de repetirse periódicamente



d.

Se impartirá siempre y cuando sea necesaria

#### Retroalimentación

Formación e información a los trabajadores en materia preventiva: los riesgos potenciales para su salud, las disposiciones en materia de seguridad e higiene, la utilización de los equipos de protección y las medidas que se han de adoptar en caso de incidente/accidente para su prevención. Esta formación se impartirá cuando el trabajador se incorpore a un puesto de trabajo con riesgo de exposición a AB, cuando aparezcan nuevos riesgos y deberá repetirse periódicamente, cuando sea necesario.

La respuesta correcta es: Se impartirá solamente durante la incorporación del a un puesto de trabajo con riesgo de exposición a AB y cuando aparezcan nuevos riesgos, sin necesidad de repetirse periódicamente

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Una de las siguientes opciones no es una precaución standard:

Pregunta 9 Seleccione una:



a.

Lavado de manos



b.

Desinfección, esterilización de materiales



c.

Rotación de personal



d.

Vacunación VHB en sanitarios

### Retroalimentación

La rotación de personal no se encuentra recogida como una precaución standard, pues aumentaría incluso el riesgo de propagación de agentes biológicos en el medio laboral

La respuesta correcta es: Rotación de personal

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La protección respiratoria más idónea en el caso de mecanismos de transmisión aérea es:

Pregunta 10 Seleccione una:



a.

Respirador de partículas



b.

Mascarilla quirúrgica



c.

Mascarilla standard



d.

Gafa nasal

### Retroalimentación

En transmisiones aéreas siempre se recomienda el uso de respirador de partículas

La respuesta correcta es: Respirador de partículas

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Las situaciones al alta médica tras un accidente con riesgo biológico que ha cursado con baja laboral por contingencia profesional son:

Pregunta 11 Seleccione una:

a.  
Sin secuelas

b.  
Lesiones permanentes no invalidantes

c.  
Incapacidad permanente parcial

d.  
Todas son correctas

#### Retroalimentación

Todas ellas son situaciones al alta médica para un trabajador ha recibido su atención médico-sanitaria y rehabilitadora tras contingencia profesional por parte de su entidad gestora

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación falsa en relación a los guantes

Pregunta 12 Seleccione una:

a.  
Los guantes extra-grosos o el doble enguantado pueden estar recomendados para procedimientos en los que se trabaja con material óseo o metálico, se abordan cavidades profundas, espacios confinados y en los que el riesgo de punción, corte o rotura sea alto (cirugía traumatológica/ortopedia) o se trabaje sobre pacientes infecciosos

b.

Sustituyen al lavado de manos



c.

En pacientes infecciosos se recomiendan guantes quirúrgicos sintéticos sin polvo



d.

El tiempo de uso que puede variar en función del material y el tipo de guante

#### Retroalimentación

En ningún caso el uso de guantes puede sustituir al lavado de manos, debiéndose realizar éste antes de su colocación y tras su retirada

La respuesta correcta es: Sustituyen al lavado de manos

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Quiénes son los más sensibles a infectarse tras la exposición al bacilo tuberculoso y también tienen más riesgo de desarrollar la infección?

Pregunta 13 Seleccione una:



a.

Los niños de corta edad.



b.

Los jóvenes



c.

Los adultos.



d.

Las mujeres

#### Retroalimentación

Los niños de corta edad son los más sensibles a infectarse tras la exposición al bacilo tuberculoso y también tienen más riesgo de desarrollar la infección

La respuesta correcta es: Los niños de corta edad.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En los portadores del VIH, para detectar la infección tuberculosa y poder instaurar una pauta de quimioprofilaxis, se recomienda:

Pregunta 14 Seleccione una:

a.

La realización anual de un ECG

b.

La realización anual de un PPD

c.

La vacuna de la BCG

d.

Ninguna de las anteriores

Retroalimentación

La realización anual de un PPD

La respuesta correcta es: La realización anual de un PPD

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El agente de la tuberculosis generalmente es una bacteria del género

Pregunta 15 Seleccione una:

a.

E. Coli

b.

Mycobacteria

c.

Retrovirus

d.

Coronavirus

Retroalimentación

Mycobacteria

La respuesta correcta es: Mycobacteria

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La prueba de la tuberculina mediante la técnica de Mantoux se debe leer:

Pregunta 16 Seleccione una:

a.

Entre las 48- 72 horas

b.

Entre el 4° y 6° día

c.

Al 7° día

d.

A las 12 horas

### Retroalimentación

Entre las 48- 72 horas

La respuesta correcta es: Entre las 48- 72 horas

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Según la clasificación del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, un agente biológico del grupo 2, es:

Pregunta 17 Seleccione una:

a.

Aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.

b.

Aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.

c.

Aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.

d.

Aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.

#### Retroalimentación

Aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.

La respuesta correcta es: Aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.

### Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En relación con la Brucelosis señale la respuesta INCORRECTA:

Pregunta 18 Seleccione una:

a.

La brucella mellitensis es considerada la más peligrosa para la especie humana.

b.

En España es una enfermedad de declaración obligatoria.

c.

Fue declarada enfermedad profesional en 1978.

d.

La principal medida preventiva en actividades laborales con riesgo es la vacunación.

#### Retroalimentación

La principal medida preventiva en actividades laborales con riesgo es la vacunación.

La respuesta correcta es: La principal medida preventiva en actividades laborales con riesgo es la vacunación.

### Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, se entenderá por "agentes biológicos":

Pregunta 19 Seleccione una:



a.

A los microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.



b.

A los virus y las bacterias que provoquen enfermedad en el ser humano.



c.

Solamente a los microorganismos (virus, bacterias y protozoos) que provoquen infección.



d.

A todos los organismos, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de generar infección o cualquier tipo de toxicidad en el hombre y para los que se disponga de vacuna o medida preventiva.

#### Retroalimentación

A los microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

La respuesta correcta es: A los microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La concentración de virus de la Hepatitis B es más alto en:

Pregunta 20 Seleccione una:



a.

El exudado de heridas.



b.

La orina y las heces.



c.

El semen y el fluido vaginal.



d.

La leche materna.

#### Retroalimentación

El exudado de heridas.

La respuesta correcta es: El exudado de heridas.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se entiende por exposición a agentes biológicos

Pregunta 21 Seleccione una:

a.

No usar medidas adecuadas de protección frente a agentes biológicos.

b.

La presencia de estos agentes en el entorno laboral que implica el contacto de dicho agente con el trabajador por cualquiera de las vías de entrada del organismo.

c.

La punción involuntaria con objetos contaminados.

d.

La exposición al agente patógeno por vía aérea en periodos de pandemia

Retroalimentación

La presencia de estos agentes en el entorno laboral que implica el contacto de dicho agente con el trabajador por cualquiera de las vías de entrada del organismo.

La respuesta correcta es: La presencia de estos agentes en el entorno laboral que implica el contacto de dicho agente con el trabajador por cualquiera de las vías de entrada del organismo.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una persona nacida en el año 1965 con respecto al sarampión:

Pregunta 22 Seleccione una:

a.

Se considera inmune.

b.

Se debe realizar una serología de anticuerpos frente al sarampión IgM.

c.  
Se debe realizar una serología de anticuerpos frente al sarampión IgG.



d.  
Se le administrarán 2 dosis de vacuna anti-sarampión.

#### Retroalimentación

Se considera inmune.

La respuesta correcta es: Se considera inmune.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Los trabajadores sanitarios se consideran inmunes frente a Varicela zoster en

Pregunta 23 Seleccione una:



a.  
Recordar haber pasado la enfermedad



b.  
Serología de varicela zoster IgG: Positivo



c.  
Todas son falsas



d.  
Todas son verdaderas

#### Retroalimentación

Todas son verdaderas

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, obliga a almacenar la lista de los trabajadores expuestos y sus historiales médicos. Indique la opción correcta

Pregunta 24 Seleccione una:



a.  
Durante un plazo mínimo de quince años después de finalizada la exposición pudiendo ser ampliado este plazo hasta cuarenta años en determinados casos.



b.  
Durante un plazo mínimo de diez años después de finalizada la exposición pudiendo ser ampliado este plazo hasta treinta años en determinados casos



c.  
Durante un plazo mínimo de diez años después de finalizada la exposición pudiendo ser ampliado este plazo hasta cuarenta años en determinados casos



d.  
Durante un plazo mínimo de quince años después de finalizada la exposición pudiendo ser ampliado este plazo hasta treinta años en determinados casos

#### Retroalimentación

Durante un plazo mínimo de diez años después de finalizada la exposición pudiendo ser ampliado este plazo hasta treinta años en determinados casos

La respuesta correcta es: Durante un plazo mínimo de diez años después de finalizada la exposición pudiendo ser ampliado este plazo hasta cuarenta años en determinados casos

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El tipo de virus de hepatitis que con más frecuencia cronifica y que tiene mayor tendencia a desarrollar cirrosis y/o cáncer es:

Pregunta 25 Seleccione una:



a.  
VHA



b.  
VHB



c.  
VHC



d.  
VHD

#### Retroalimentación

Se estima que en el mundo hay 71 millones de personas con infección crónica por el VHC. Un número considerable de esas personas con infección crónica desarrollarán cirrosis o cáncer de hígado. Cada año mueren unas 399 000 personas debido a la hepatitis C, sobre todo por cirrosis y carcinoma hepatocelular.

La respuesta correcta es: VHC

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Una medida para reducir el riesgo, según el artículo 6 del RD 664/1997, es:

Pregunta 26 Seleccione una:

a.

Disponibilidad de los materiales necesarios para actuar como barrera (guantes, mascarilla, batas y gafas protectoras), así como contenedores de material desechable/no desechable potencialmente contaminado.

b.

Garantizar el asesoramiento y la asistencia las 24 horas del día con disponibilidad de diagnóstico serológico temprano.

c.

Disponer de profesionales encargados de la atención y seguimiento de los casos.

d.

A, B y C son correctas

#### Retroalimentación

Todas son correctas

La respuesta correcta es: A, B y C son correctas

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Alguna de estas actividades no aparece en la lista del anexo I del R.D. 664/1997

Pregunta 27 Seleccione una:

a.

Trabajos en centros de producción de alimentos

b.

Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal.

c.

Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales.



d.

Todas las actividades aparecen en el anexo I del RD 664/1997.

Retroalimentación

Todas las actividades aparecen en el anexo I del RD 664/1997.

La respuesta correcta es: Todas las actividades aparecen en el anexo I del RD 664/1997.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la profilaxis post-exposición de la rubeola está indicado:

Pregunta 28 Seleccione una:



a.

IG sérica



b.

Vacuna TV 1 dosis en las primeras 72 horas



c.

Ninguna de las anteriores



d.

A y B son correctas

Retroalimentación

Vacuna TV 1 dosis en las primeras 72 horas

La respuesta correcta es: Vacuna TV 1 dosis en las primeras 72 horas

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para evitar el contagio de parotiditis, el trabajador deberá protegerse con:

Pregunta 29 Seleccione una:



a.

Mascarilla FFP2



b.

Mascarilla FFP3



c.

Mascarilla quirúrgica



d.

A y B son correctas

#### Retroalimentación

La vía de transmisión de la parotiditis son las secreciones oro-faríngeas, por lo que la Mascarilla quirúrgica es la que está indicada para protegerse del contagio.

La respuesta correcta es: Mascarilla quirúrgica

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La vacunación para sanitarios frente a fiebre amarilla:

Pregunta 30 Seleccione una:



a.

Siempre está indicada



b.

Nunca está indicada



c.

Está indicada en ciertas situaciones



d.

Sólo está indicada para la Profilaxis Post-Exposición

#### Retroalimentación

Las indicaciones de vacunación de cada profesional deben ser individualizadas en función de la susceptibilidad del trabajador a las diferentes enfermedades inmunoprevenibles, de las tareas desempeñadas o de los riesgos a los que esté expuesto según su actividad profesional y de su propia situación de salud.

La respuesta correcta es: Está indicada en ciertas situaciones