

Prueba de conocimientos Módulo 2

IT.Q008_2Ed

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario -

Apto

Pregunta 1

Según la ERC, que objetivo debemos fijarnos para la SpO2 tras la recuperación de la circulación espontánea:

d. 94-98%.

Pregunta 2 Indique cuál de las siguientes limitaciones en las actividades es más característica para un paciente clasificado con un grado cuatro en la escala de disnea MRC:

b. Incapacidad para salir de casa.

Pregunta 3 Indique cuál de las siguientes se considera una causa reversible de la PCR según la AHA:

c. Taponamiento cardíaco.

Pregunta 4 La frecuencia de compresiones torácicas recomendadas para un adulto es:

c. 100-120 lpm.

Pregunta 5: Indique cual sería la acción más adecuada para un paciente que presenta un cuadro de disnea, mareo y sensación de palpitaciones, se objetiva una FC de 180 lpm, un ritmo en el ECG regular con QRS estrecho.

c. Realizar una maniobra vagal.

Pregunta 6: La capnografía durante la RCP nos permite:

C. Confirmar la perfusión y la calidad de la RCP.

Pregunta 7: ¿Cómo se diagnostica un neumotórax a tensión?

d. Mediante un diagnóstico clínico (signos y síntomas).

Pregunta 8: ¿Cuál de los siguientes patrones respiratorios sería más común encontrarlo en un paciente que presenta un cuadro de hiperglucemia grave?

A. Respiración de Kussmaul.

Pregunta 9: En una paciente embarazada con OVACE, realizaremos las siguientes técnicas:

d. Compresiones torácicas.

Pregunta 10: Respecto al manejo y tratamiento del neumotórax a tensión indique la acción prioritaria más adecuada:

c. Descomprimir en el 5º espacio intercostal línea anterior axilar.

Pregunta 11: De las siguientes acciones, ¿cuál sería la primera a realizar ante un paciente inconsciente es?

b. Abrir vía aérea y comprobar respiración.

Pregunta 12: En la PCR intrahospitalaria, según la AHA, el primer eslabón de la cadena de supervivencia es:

d. Reconocimiento precoz del deterioro y activación del equipo.

Pregunta 13: Dentro de las funciones del líder de un equipo de alto rendimiento indique lo incorrecto:

d. Maneja el desfibrilador.

Pregunta 14

Según la AHA, la fracción de compresiones torácicas debe ser de:

a. Mayor que 80%.

Pregunta 15

Indique cual es la relación correcta entre compresiones y ventilaciones para un adulto:

d. 30-2

Pregunta 16

Cuál debería ser nuestra primera acción en caso de presenciar un caso de OVACE y el paciente estar consciente:

c. Animar a toser.

Pregunta 17

La profundidad adecuada de las compresiones torácicas para un adulto es:

d. 5-6 cm.

Pregunta 18 ¿Cuándo debe rotarse el compresor durante una RCP?

c. Todas son correctas.

Pregunta 19 Indique cada cuanto tiempo debe administrarse la adrenalina en caso de una parada cardiorrespiratoria:

c. 3-5 minutos.

Pregunta 20 De entre los siguientes dispositivos, indique cuál es el más indicado para comenzar a ventilar a un paciente:

b. Bolsa mascarilla.