

Comenzado el	jueves, 22 de octubre de 2026, 11:06
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 22 de octubre de 2026, 11:23
Tiempo empleado	17 minutos 16 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El fracaso en coordinación interdisciplinar puede generar:

- ☐ a. Mayor autonomía del paciente.
- ☒ b. Duplicidades, errores y pérdida de continuidad. ✓
- ☐ c. Mejora en resultados clínicos.
- ☐ d. Reducción de eventos adversos.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera de enlace actúa principalmente:

- ☐ a. En todo el proceso longitudinal.
- ☒ b. En momentos concretos de transición asistencial. ✓
- ☐ c. Como sustituta médica.
- ☐ d. Como gestora económica.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El soporte transfusional domiciliario requiere:

- ☐ a. Paciente inestable.
- ☒ b. Circuitos reglados y criterios estrictos de selección. ✓
- ☐ c. Ausencia de hematología.
- ☐ d. Monitorización opcional.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En Salud Mental domiciliaria, la intervención en crisis se fundamenta en:

- ☐ a. Aislamiento terapéutico.
- ☒ b. Seguimiento intensivo y coordinación comunitaria. ✓
- ☐ c. Atención exclusivamente telefónica.
- ☐ d. Eliminación de psicoterapia.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El fracaso en selección de paciente puede conducir a:

- ☐ a. Mejora espontánea.
- ☒ b. Reingreso precoz y eventos adversos. ✓
- ☐ c. Reducción de costes.
- ☐ d. Mayor autonomía.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El consenso Delphi en farmacia hospitalaria en HaD busca:

- ☐ a. Reducir presencia del farmacéutico en domicilio.
- ☒ b. Estandarizar práctica farmacéutica y seguridad terapéutica. ✓
- ☐ c. Eliminar conciliación de medicación.
- ☐ d. Sustituir validación clínica.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IC crónica, el domicilio permite detectar:

- ☐ a. Solo parámetros hemodinámicos.
- ☒ b. Factores reales de incumplimiento terapéutico. ✓
- ☐ c. Exclusivamente datos analíticos.
- ☐ d. Necesidad de UCI.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En HaD de Salud Mental, el enfoque principal es:

- ☐ a. Hospitalización convencional encubierta.
- ☒ b. Intervención intensiva en entorno comunitario. ✓
- ☐ c. Tratamiento exclusivamente farmacológico.
- ☐ d. Seguimiento telefónico aislado.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En endocarditis estable:

- ☐ a. Se evita fase hospitalaria inicial.
- ☒ b. Puede continuarse tratamiento IV en domicilio tras estabilización. ✓
- ☐ c. No requiere seguimiento.
- ☐ d. Se trata exclusivamente por vía oral.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera gestora de casos (EGC) se diferencia porque:

- ☐ a. Actúa solo en urgencias.
- ☒ b. Tiene visión longitudinal y estratégica del proceso. ✓
- ☐ c. Solo gestiona altas administrativas.
- ☐ d. Sustituye a la enfermera HAD.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermería pediátrica en HaD destaca por:

- ☐ a. Delegar educación a Atención Primaria.
- ☒ b. Validar competencias reales de la familia. ✓
- ☐ c. Limitarse a supervisión hospitalaria.
- ☐ d. Reducir seguimiento clínico.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La prevención tromboembólica en domicilio se apoya en:

- ☐ a. Inmovilización protectora.
- ☒ b. Movilización precoz en entorno real. ✓
- ☐ c. Restricción hídrica estricta.
- ☐ d. Supresión de anticoagulación.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El impacto organizativo de HaD incluye:

- ☐ a. Incremento de ocupación hospitalaria.
- ☒ b. Optimización de camas y sostenibilidad del sistema. ✓
- ☐ c. Aumento de fragmentación asistencial.
- ☐ d. Reducción de coordinación.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El criterio de exclusión en IC para HaD sería:

- ☐ a. Paciente con fracción de eyección reducida.
- ☒ b. Shock cardiogénico o arritmias inestables. ✓
- ☐ c. Necesidad de educación sanitaria.
- ☐ d. Riesgo de reingreso precoz.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo integrado descrito por Kodner implica:

- ☐ a. Atención aislada por niveles.
- ☒ b. Conexión estructurada entre dispositivos sanitarios. ✓
- ☐ c. Sustitución del hospital.
- ☐ d. Atención exclusivamente domiciliaria.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La educación sanitaria en HaD debe:

- ☐ a. Limitarse a entrega de información escrita.
- ☒ b. Verificar comprensión y ejecución segura en entorno real. ✓
- ☐ c. Delegarse exclusivamente en AP.
- ☐ d. Aplicarse solo al alta.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En ETV, un paciente candidato a HaD sería:

- ☐ a. EP con inestabilidad hemodinámica.
- ☒ b. EP de bajo riesgo (PESI I–II). ✓
- ☐ c. TVP con shock séptico.
- ☐ d. EP con necesidad de trombólisis urgente.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto de continuidad asistencial implica:

- ☐ a. Seguimiento exclusivo por un profesional.
- ☒ b. Transiciones estructuradas entre niveles sin pérdida de información. ✓
- ☐ c. Alta sin coordinación posterior.
- ☐ d. Derivación automática a urgencias.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La colaboración médico-enfermera en HaD se basa en:

- ☐ a. Segmentación rígida de funciones.
- ☒ b. Co-responsabilidad clínica compartida. ✓
- ☐ c. Jerarquía unilateral.
- ☐ d. Comunicación puntual.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En EPOC avanzada, la intervención enfermera impacta en:

- ☐ a. Eliminación del tratamiento inhalado.
- ☒ b. Reducción de exacerbaciones mediante educación técnica. ✓
- ☐ c. Supresión de oxigenoterapia.
- ☐ d. Disminución automática de mortalidad.