Prueba de conocimientos Módulo 3

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El dispositivo más adecuado para terapias intravenosas prolongadas en domicilio es:

a. CVP
b. PICC ✓
c. CVC femoral
d. Catéter subcutáneo no implantable

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Una recomendación clave en el uso de sondas vesicales es:

a. Colocar siempre calibre grande
b. No lubricar la sonda
c. Realizar cambios diarios
d. Asegurar fijación para evitar tracción ✓

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En el cuidado de la piel periestomal, se debe:

a. Limpiar con alcohol
b. No secar la piel antes del adhesivo
c. Usar productos oleosos
d. Evitar la humedad excesiva para prevenir irritación ✓

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los dispositivos subcutáneos implantables (ports) se indican para:

a. Terapias repetidas y prolongadas ✓
b. Terapias de 24 h
c. Administrar solo fluidos
d. No tocar nunca el sistema

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En ostomías, un diagnóstico NANDA frecuente es:

a. Riesgo de hipovolemia
b. Conocimientos deficientes sobre el manejo del estoma ✓
c. Deterioro de la memoria
d. Estreñimiento crónico

Pregunta
6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Una colostomía se define como:

a. Apertura de estómago al exterior
b. Apertura de yeyuno
c. Apertura del colon al exterior ✓
d. Derivación urinaria por pielonefritis

Pregunta
7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Qué complicación es frecuente en los PICC si no se realiza un mantenimiento adecuado?

a. Neumotórax
b. Lesión arterial
c. Trombosis ✓
d. Atelectasia

Pregunta
8
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La pulsioximetría es especialmente útil para el seguimiento de pacientes con:

a. Hepatopatía crónica
b. Anemia
c. EPOC ✓
d. Hipotiroidismo

Pregunta
9
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la colocación de sondaje nasogástrico, un método habitual de comprobación inicial es:

a. Radiografía torácica obligatoria
b. Auscultación abdominal sin más
c. Aspirado de contenido gástrico ✓
d. Prueba con ultrasonido de cuello

Pregunta
10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La higiene del punto de inserción debe realizarse con:

a. Agua oxigenada
b. Agua sola
c. Antisépticos adecuados (clorhexidina) ✓
d. Aceites esenciales

Pregunta
11
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En oxigenoterapia domiciliaria, un recurso habitual es:

a. Ventilador volumétrico
b. Cilindros de CO_2
c. Concentrador de oxígeno ✓
d. Cámaras de presión positiva

Pregunta
12
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El sistema VAC® se caracteriza por:

a. Ser desechable
b. Tener potencia limitada
c. Ser ideal para heridas profundas o muy exudativas ✓
d. No controlar la presión negativa

Pregunta
13
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Las interfaces nasales en VMNI se recomiendan cuando:

a. Existe respiración predominantemente nasal ✓
b. El paciente tiene claustrofobia
c. Hay lesiones nasales
d. Se necesitan presiones muy altas

Pregunta
14
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El sistema PICO® es especialmente útil porque:

a. Es reutilizable
b. Necesita depósito externo
c. Es portátil y desechable ✓
d. Genera presiones superiores a VAC

Pregunta
15
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En bombas domiciliarias, la seguridad depende en gran parte de:

a. Revisar alarmas, conexiones y flujo programado ✓
b. Dejar el equipo sin supervisión
c. No registrar incidencias
d. No formar al paciente

Pregunta
16
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El sistema PICO® tiene una duración aproximada de:

a. 1 día
b. 3 días
c. 7 días ✓
d. 30 días

Pregunta
17
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En bombas de infusión, un equipo habitual en antibióticos prolongados es:

a. Bomba volumétrica
b. Bomba de jeringa
c. Bomba elastomérica ✓
d. Bomba microinfusora de insulina

Pregunta
18
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En sondajes, una causa de infección urinaria es:

a. Buena hidratación
b. Malos cuidados de higiene ✓
c. Catéter bien fijado
d. Cambio programado

Pregunta
19
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la extracción sanguínea, el sitio preferente de punción es:

a. Fosa antecubital ✓
b. Región femoral
c. Dorso de la mano
d. Vena yugular externa

Pregunta
20
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En ECG domiciliario, un requisito esencial es:

a. No limpiar la piel
b. Colocar electrodos sin orden
c. Minimizar el movimiento ✓
d. Usar electrodos reutilizables siempre