Comenzado el	domingo, 15 de noviembre de 2026, 19:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 15 de noviembre de 2026, 19:10
Tiempo empleado	10 minutos 10 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la duración recomendada de un catéter venoso periférico (CVP) en HaD?

a. Menos de 7 días ✓
b. Entre 7–14 días
c. Más de 1 mes
d. Depende del material exclusivamente

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La confirmación de posición de un CVC tras su inserción habitualmente requiere:

a. Gasometría arterial
b. Ecografía abdominal
c. Auscultación pulmonar
d. Prueba radiológica o protocolo equivalente ✓

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cámaras espaciadoras se recomiendan especialmente en:

a. Pacientes con buena coordinación
b. Adultos jóvenes sin comorbilidades
c. Pacientes tratados solo con corticoides orales
d. Niños, ancianos o personas con poca coordinación ✓

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La extravasación implica:

a. Salida de sangre arterial
b. Salida del fármaco fuera del vaso ✓
c. Entrada de aire en el catéter
d. Presión excesiva del torniquete

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El dispositivo más adecuado para terapias intravenosas prolongadas en domicilio es:

a. CVP
b. PICC ✓
c. CVC femoral
d. Catéter subcutáneo no implantable

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El CVP es ideal para:

a. Terapias prolongadas
b. Quimioterapia
c. Nutrición parenteral
d. Terapias cortas y de bajo riesgo ✓

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el cuidado de la piel periestomal, se debe:

a. Limpiar con alcohol
b. No secar la piel antes del adhesivo
c. Usar productos oleosos
d. Evitar la humedad excesiva para prevenir irritación ✓

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En pacientes con EPOC en OTD, el objetivo de SpO_2 suele ser:

a. 80–85%
b. 88–92% ✓
c. Mayor que 95%
d. 70–75%

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un factor que puede provocar errores en la pulsioximetría es:

a. Frecuencia respiratoria elevada
b. Baja perfusión periférica ✓
c. Saturación basal alta
d. Exceso de hidratación

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema PICO® es especialmente útil porque:

a. Es reutilizable
b. Necesita depósito externo
c. Es portátil y desechable ✓
d. Genera presiones superiores a VAC

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las bombas electrónicas destacan por:

a. No tener alarmas
b. Carecer de precisión
c. Permitir programación exacta del flujo ✓
d. No registrar datos

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En heridas complejas, la terapia de presión negativa favorece:

a. Disminución de tejido de granulación
b. Acúmulo de exudado
c. Aumento del edema
d. Formación de tejido de granulación ✓

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema VAC® se caracteriza por:

a. Ser desechable
b. Tener potencia limitada
c. Ser ideal para heridas profundas o muy exudativas ✓
d. No controlar la presión negativa

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En ecografía POCUS, una limitación importante es que:

a. No sirve para ver tejidos blandos
b. Es operador-dependiente ✓
c. Carece de utilidad en domicilio
d. No permite detectar líquidos

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la colocación de sondaje nasogástrico, un método habitual de comprobación inicial es:

a. Radiografía torácica obligatoria
b. Auscultación abdominal sin más
c. Aspirado de contenido gástrico ✓
d. Prueba con ultrasonido de cuello

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En VMNI, una causa común de mala eficacia terapéutica es:

a. Humidificación excesiva
b. Fugas en la interfaz ✓
c. Uso de mascarilla nasal
d. Exceso de adherencia

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El uso de cámaras espaciadoras reduce:

a. Riesgo de taquicardia
b. Riesgo de candidiasis orofaríngea ✓
c. Eficacia del fármaco
d. Necesidad de inhaladores

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La pulsioximetría es especialmente útil para el seguimiento de pacientes con:

a. Hepatopatía crónica
b. Anemia
c. EPOC ✓
d. Hipotiroidismo

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una complicación frecuente en urostomías es:

a. Estreñimiento
b. Colitis
c. Infección urinaria ✓
d. Hemorragia masiva

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la extracción sanguínea, el sitio preferente de punción es:

a. Fosa antecubital ✓
b. Región femoral
c. Dorso de la mano
d. Vena yugular externa
