

## Soporte vital adulto curso 7 itinerario URGENCIAS FUDEN 2013

**Los pasos de la programación del marcapasos transcutáneo: Seleccione una:**

- ☒ a. Modo a demanda/fijo, frecuencia cardíaca mínima, energía de estimulación ✓

**Señala la opción que es incoherente con sus alternativas: Seleccione una:**

- ☒ d. Traumatismo ✓

**El control de hemorragias se realiza por, señale la respuesta más completa: Seleccione una:**

- ☒ c. Una presión firme, fuerte y prolongada del lugar de sangrado, ayudándonos de telas, pañuelos, vendas, compresas etc. ✓

**Señale la respuesta correcta. Seleccione una:**

- ☒ a. El organismo internacional encargado del consenso, investigación y revisión de los procesos asistenciales en RCP es el ILCOR. ✓

**En el ahogamiento la RCP no difiere gran cosa de lo expuesto en la RCP normal, solo debemos tomar en cuenta algunos puntos de interés, señale la incorrecta: Seleccione una:**

- ☒ d. Se recomienda la aplicación sistemática de drenaje postural o técnicas de desobstrucción de la vía aérea (Heimlich) si no están indicadas. ✓

**En la RCP del ahogado se incluyen las siguientes actuaciones excepto. Seleccione una:**

- ☒ d. Se recomienda la aplicación sistemática de drenaje postural o técnicas de desobstrucción de la vía aérea (Heimlich). ✓

**Entre las medidas de calentamiento del paciente hipotérmico, es incorrecto: Seleccione una:**

- ☒ c. Calentamiento interno pasivo ✓

**Como causas fundamentales que derivan en una PCR de una mujer gestante podemos encontrar las siguientes excepto:**

**Seleccione una:**

- ☒ b. Hemorragias digestivas. ✓

**Pueden ser signos de respuesta adversa del paciente a una arritmia cardíaca: Seleccione una:**

- ☒ d. Todas son correctas ✓

**La energía de descarga del tratamiento de desfibrilación para el paciente adulto es: Seleccione una:**

- ☒ b. 150 J bifásico o 360 monofásico. ✓

**0411 Respuesta de la ventilación mecánica: adulto, es: Seleccione una:**

- ☒ a. Un criterio de resultado ✓

**Dónde no se debe iniciar nunca una RCP, señale la respuesta falsa. Seleccione una:**

- ☒ b. Retraso en el inicio de RCP de más de 4 minutos de evolución salvo casos específicos como hipotermia o ahogados. ✓

**El fármaco de primera elección en la rama de Asistolia y AESP del protocolo de PCR es: Seleccione una:**

- ☒ a. Adrenalina ✓

**Las condiciones que debe cumplir la posición lateral de seguridad son, señale la falsa: Seleccione una:**

- ☐ a. Ser estable y segura, permitir que la persona se voltee por su propio peso. ✓

**La impedancia transtorácica: Seleccione una:**

- ☐ c. Puede condicionar la efectividad de las terapias eléctricas ✓

**¿Cuál es el tiempo máximo de valoración de la respiración en un paciente inconsciente que tiene pulso?, señale la correcta. Seleccione una:**

- ☐ c. 10 segundos. ✓

**Signos característicos para reconocer la presencia de una obstrucción parcial o total de vía aérea son todos menos.**

**Seleccione una:**

- ☐ d. Si la obstrucción es completa la víctima hablará y será capaz de toser y respirar de forma normal. ✓

**La cadena de supervivencia está constituida por todos estos eslabones menos: Seleccione una:**

- ☐ a. Reconocimiento precoz y efectivo de la emergencia, activación de los servicios médicos de emergencias. Teléfono europeo de emergencias 111. ✓

**La cadena de supervivencia está constituido por los siguientes eslabones, señale la correcta: Seleccione una:**

- ☐ c. Reconocimiento precoz y efectivo, RCP-B, Desfibrilación precoz, SVA. ✓

**A los pacientes en estado de hipotermia que presentan un ritmo desfibrilable, solo se les aplicará una descarga eléctrica de desfibrilación mientras mantengan una temperatura por debajo de: Seleccione una:**

- ☐ b. 30 °C ✓

**Todas estas afirmaciones entran en el rango para dejar de realizar y dar por finalizada una RCP excepto. Seleccione una:**

- ☐ a. Fallo cardíaco congestivo, enfermedad crónica, respiratoria avanzada. Sepsis. ✓

**En una situación de PCR diferenciaremos entre dos situaciones dependiendo de las semanas de gestación, señale la correcta: Seleccione una:**

- ☐ a. Antes de las 24 semanas de gestación y después de las 24 semanas de gestación. ✓

**A un paciente que muestra en su registro de EKG una Asistolia con presencia ondas P, está indicado la terapia de eléctrica de: Seleccione una:**

- ☐ a. Estimulación intermitente con marcapasos transcutáneo ✓

**Si no disponemos de esfigmomanómetro, podemos estimar la presión arterial del paciente según la presencia o ausencia de los diferentes pulsos, así: Seleccione una:**

- ☐ c. Ninguna es correcta ✓

**Los cuidados postresucitación: Seleccione una:**

- ☐ a. Se iniciarán en el mismo momento en que el paciente recupera la circulación espontánea ✓

**Si no se dispone de vía venosa periférica, para la administración de fluidos optaremos en primer lugar por: Seleccione una:**

- ☐ c. Vía intraósea ✓

**El recorrido de la corriente eléctrica a través de los tejidos del organismo Con alta mortalidad suele ser: Seleccione una:**

- ☐ a. El recorrido transtorácico horizontal. ✓

**Señale la opción correcta: Seleccione una:**

- ☐ a. Si la temperatura central se encuentra por debajo de 30°C, sólo se podrá hacer un ciclo de descargas con el DESA. ✓

**La ratio compresión-ventilación en el paciente adulto es de, señale la correcta. Seleccione una:**

- ☐ a. 30:2 ✓

**Hay situaciones en las que se puede aceptar la movilización de víctimas precozmente y con rapidez, entre ellas podemos encontrar todas excepto:Seleccione una:**

- ☒ c. Víctima con signos claros de Hemorragia importante. ✓

**Para una oxigenación correcta se recomiendan los siguientes puntos de interés excepto:Seleccione una:**

- ☒ a. Ventilaciones en 2 segundo, evitando que sean demasiado rápidas y demasiado fuertes, viendo la elevación correcta del tórax, en cada insuflación. ✓

**En un paciente, no es indicativo de vía aérea difícil:Seleccione una:**

- ☒ d. Todos son indicativos de que el paciente puede presentar una vía aérea difícil ✓

**En presencia de una taquicardia con QRS ancho, la actitud debe ser:Seleccione una:**

- ☒ d. A y C son correctas. ✓

**Sobre la valoración del paciente en situación crítica:Seleccione una:**

- ☒ d. A y B son correctas ✓

**Señale la respuesta no correcta.Seleccione una:**

- ☒ c. VT de 800-900 son adecuados. Hacer una inspiración mas profunda de lo normal. ✓

**3350 Monitorización respiratoria es:  
Seleccione una:**

- ☒ b. Una intervención enfermera ✓

**A la llegada del DESA, señale la respuesta correcta:  
Seleccione una:**

- ☒ a. Encender y colocar los electrodos. ✓

**Hasta cuándo se debe continuar con las indicaciones del DESA, señale la falsa:  
Seleccione una:**

- ☒ d. El DESA automáticamente indica el fin del proceso asistencial. ✓

**Señale la respuesta falsa de las siguientes afirmaciones en referencia a la técnica de las compresiones torácicas.Seleccione una:**

- ☒ d. Los signos de pulso carotídeo o femoral, deben ser considerados como un índice de flujo arterial efectivo en reanimadores legos. En reanimadores sanitarios comprobar pulso después de 10 ciclos o 4 minutos de RCP. ✓

**La valoración debe orientarse a la detección de alteraciones en las necesidades que puedan suponer un riesgo vital, hablamos de:Seleccione una:**

- ☒ a. Valoración focalizada ✓