

¿Cuánto tiempo tendrá que estar aislado el paciente debido a la presencia de piojos?

Seleccione una:

a. Desde el momento de observarse 10 días ya que su ciclo de reproducción termina.

Incorrecta

b. Se mantendrá aislado hasta que se observen huevos o piojos en la persona afectada.

c. En el momento de utilizar los geles adecuados ya se puede retirar el aislamiento.

d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se mantendrá aislado hasta que se observen huevos o piojos en la persona afectada.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de aislamiento necesitaríamos para el sarampión?

Seleccione una:

a. Aislamiento estricto.

b. Aislamiento protector.

c. Aislamiento aéreo. Correcta

d. Aislamiento contacto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento aéreo.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál puede ser uno de los métodos de control, para erradicar los piojos en el paciente?

Seleccione una:

- a. Higiene personal, retirar la ropa al paciente e introducirla en bolsa para tratamiento y lavado de la misma, tratamiento específico para cuello cabelludo. Correcta
- b. Únicamente colocar gorro ya en su domicilio al alta realizar tratamiento.
- c. Uso de solución hidroalcohólica en nuestras manos para protegernos y sobre el paciente en cuero cabelludo.
- d. Rapar la cabeza.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Higiene personal, retirar la ropa al paciente e introducirla en bolsa para tratamiento y lavado de la misma, tratamiento específico para cuello cabelludo.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El paciente a su ingreso es trasladado a box de aislamiento, ¿qué aislamiento indicarías en este paciente?

Seleccione una:

- a. Aislamiento de contacto y estricto.
- b. Solo vigilar los piojos y no acercarme mucho.
- c. Aislamiento de contacto debido a la presencia de piojos y aislamiento aéreo ya que presenta lesiones compatibles con el virus de la varicela. Correcta
- d. Solo aislamiento estricto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento de contacto debido a la presencia de piojos y aislamiento aéreo ya que presenta lesiones compatibles con el virus de la varicela.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras varios días ingresado se quiere recoger muestra biológica del paciente para descartar tuberculosis bacilífera pulmonar ¿qué tipo de muestra es la idónea para detectar bacilos ácido alcohol resistentes?

Seleccione una:

- a. Exudado nasofaríngeo. Incorrecta
- b. Gastroscopia y recogida de muestra.
- c. Esputo u otros líquidos corporales.
- d. Muestra de orina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esputo u otros líquidos corporales.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Nuestro paciente sufrió una tuberculosis previa, ¿sería necesario realizar aislamiento aéreo?

Seleccione una:

- a. No ya que la enfermedad está resuelta. Correcta
- b. En ámbito hospitalario si, para proteger a otros pacientes.
- c. Si siempre por riesgo de reactivación de la enfermedad.
- d. Únicamente se aislará utilizando mascarilla FFP2 para realizar maniobras invasivas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No ya que la enfermedad está resuelta.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál sería el periodo de incubación para los piojos que presenta el paciente en cuero cabelludo y cuerpo y en pubis?

Seleccione una:

- a. 12 días para piojos de cabeza y cuerpo y 8 días para pubis.
- b. 8 días para piojos de cabeza y cuerpo y 12 días para pubis.
- c. 10 días tanto para cabeza y cuerpo como para pubis.
- d. 18 días para cuerpo y cabeza y 15 días para piojos de pubis. Correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 18 días para cuerpo y cabeza y 15 días para piojos de pubis.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Nuestro paciente ha sufrido una reactivación de la enfermedad de la varicela en forma de herpes zoster, ¿qué porcentaje de la población puede sufrir esta reactivación?

Seleccione una:

- a. 30%.
- b. 20%.
- c. 15%. Correcta
- d. 45%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 15%.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de que este paciente sufriera una reactivación de su tuberculosis pasada ¿qué tipo de aislamiento sería necesario?

Seleccione una:

- a. Aislamiento estricto.
- b. Aislamiento gotas.
- c. Aislamiento aéreo. Correcta
- d. Aislamiento estricto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento aéreo.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuánto tiempo dura el periodo de transmisibilidad de la tuberculosis?

Seleccione una:

- a. Mientras expulsa bacilos tuberculosos, con el tratamiento adecuado la transmisibilidad se elimina de dos a cuatro semanas. Correcta
- b. Desde el momento que se pone tratamiento 1 semana.
- c. Desde el inicio de síntomas hasta seis semanas que es cuando deja de producir bacilos tuberculosos.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mientras expulsa bacilos tuberculosos, con el tratamiento adecuado la transmisibilidad se elimina de dos a cuatro semanas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras confirmar el virus de la varicela por prueba diagnóstica ¿qué tipo de mascarilla utilizarías?

Seleccione una:

- a. Mascarilla quirúrgica.
- b. No es necesario si estoy a menos de un metro.
- c. Mascarilla FFP2. Correcta
- d. Solo es necesaria si existe riesgo de salpicaduras y en este caso es quirúrgica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla FFP2.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En caso de duda de posible tuberculosis activa ¿sería necesario realizar la prueba de mantoux a los convivientes?

Seleccione una:

- a. Si a todos. Correcta
- b. No es necesario.
- c. Solo aquellos que hayan tenido relaciones sexuales con él.
- d. Solo a aquellos que tengan diagnóstico confirmado de VIH.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si a todos.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El periodo de incubación para los piojos es:

Seleccione una:

- a. 18 días para piojos de cuerpo y cabeza, 15 días para piojos de pubis. Correcta
- b. Menos de 12 días.
- c. Más de 20 días tanto en piojos de cuerpo y cabeza y 25 en piojos de pubis.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 18 días para piojos de cuerpo y cabeza, 15 días para piojos de pubis.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles serían los síntomas característicos para reconocer el sarampión que pasó nuestro paciente?

Seleccione una:

- a. Enfermedad vírica aguda, con síntomas de diarrea, vómitos es escopeta y abundantes nauseas.
- b. Enfermedad bacteriana, con aparición de vesículas prominentes en extremidades.
- c. Enfermedad vírica aguda, muy contagiosa con periodos prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y pequeñas manchas con aspecto blanquecino o azulado sobre base eritematosa en mucosa interna de la mejilla. Correcta
- d. Enfermedad bacteriana, con presencia de tos seca y abundantes secreciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Enfermedad vírica aguda, muy contagiosa con periodos prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y pequeñas manchas con aspecto blanquecino o azulado sobre base eritematosa en mucosa interna de la mejilla.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras consultar a las personas convivientes, todos ellos están vacunados frente a la varicela o presentan anticuerpos frente a ella, ¿es necesario vacunarles con la vacuna de la varicela?

Seleccione una:

- a. Si en la serología se observan anticuerpos de varicela, están inmunizados por lo que no es necesario vacunarles. Correcta
- b. Si es necesario vacunarles ya que es un contacto directo.
- c. Deberemos esperar si presentan síntomas de aparición de varicela, si es así se vacunará.
- d. Solo vacunaremos a aquellos que se hayan administrado la vacuna hace más de diez años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si en la serología se observan anticuerpos de varicela, están inmunizados por lo que no es necesario vacunarles.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál sería el periodo de incubación para la tuberculosis?

Seleccione una:

- a. Tres semanas.
- b. Cinco días.
- c. De dos a diez semanas. Correcta
- d. 48-72 horas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De dos a diez semanas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Uno de los principales síntomas es una tos intensa que puede durar:

Seleccione una:

- a. 1 semana.
- b. 3 semanas o más. Correcta
- c. Menos de 5 días.
- d. Más de 5 semanas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3 semanas o más.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles son los nombres que reciben los piojos de cabeza, cuerpo y pubis respectivamente?

Seleccione una:

- a. P. Capitis, P. Corporis, y P. Pubis.
- b. P. Cabellis, P Corporis y P. Genitales.
- c. P Pelus, P cuerpo y P. Pubis.
- d. P. Cabellis, P corporis y P. Pubis. Incorrecta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: P. Capitis, P. Corporis, y P. Pubis.

Información

Marcar pregunta

Texto informativo

Paciente de 38 años, sexo masculino, nacido en Brasil donde residió hasta hace 10 años, que se traslado a España.

Serología positiva para VIH conocida desde 1992.

En 1994 padeció sarampión

En 1995 tuberculosis pulmonar

En 1996 se le encontró serología positiva para hepatitis B y C.

Fue fumador de 10 cigarrillos diarios.

Niega consumo de alcohol y uso de drogas.

No acudió a posteriores controles médicos por lo que nunca recibió tratamiento con antirretrovirales.

Cohabita en casa con cinco infectados por el VIH, penosas condiciones higiénicas en domicilio

En el momento del ingreso fiebre, cefaleas, vómitos y diarrea

Lesiones maculopopulosas compatibles con virus de la varicela

Refiere abundantes picores, irritación en cuero cabello, observándose piojos en cabeza.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de mascarilla sería necesaria para el personal sanitario y familiares?

Seleccione una:

- a. Mascarilla FFP3.
- b. Mascarilla quirúrgica.
- c. Mascarilla FFP2. Correcta
- d. Únicamente quirúrgica a menos de un metro del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla FFP2.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el caso de salida de la habitación, respecto a su aislamiento de contacto ¿qué medida sería muy importante para el control de los piojos?

Seleccione una:

- a. Uso de guantes e higiene de manos.
- b. Colocar un gorro cubriéndole perfectamente todo su pelo y colocarse el personal sanitario que este en contacto con el otro gorro. Correcta
- c. Únicamente colocar mascarilla al tener condiciones higiénicas muy deficientes.
- d. Impregnaremos suavizante en cuero cabello para eliminar piojos y ya podrá salir sin medidas de aislamiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocar un gorro cubriéndole perfectamente todo su pelo y colocarse el personal sanitario que este en contacto con el otro gorro.

Finalizar revisión