

Control y tratamiento de la **Pediculosis**
[Información del curso](#)
[Contenido](#)
[Materiales apoyo](#)
[Examen](#)
[Certificado del curso](#)
[Encuesta de valoración](#)
[Volver a Principal](#)

Comenzado el	miércoles, 24 de agosto de 2016, 20:09
Estado	Terminado
Finalizado en	miércoles, 24 de agosto de 2016, 20:24
Tiempo empleado	15 minutos 20 segundos
Puntos	32,00/34,00
Calificación	de un máximo de

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la morfología y características de los piojos, señale la correcta:

- a. Tienen forma alargada y aplanada, tamaño entre 1-4 mm, siendo de mayor tamaño las hembras.
- b. Su color es parduzco pero puede variar según la cantidad de sangre succionada y el color del cabello de la persona infestada.
- c. Son hematófagos y necesitan alimentarse cada 4-6 horas.
- d. Su supervivencia fuera del huésped es de apenas 1 a 2 días.
- e. Todas las anteriores son correctas. ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a las liendres, señale la respuesta incorrecta:

- a. Tienen forma ovalada y color blanquecino.
- b. Miden aproximadamente 2 cm. ✓
- c. Viven a 1-2 mm de la raíz del cabello.
- d. Están unidas al cabello por un cemento adherente.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a las ninfas, señale la respuesta correcta:

- a. Tienen forma y tamaño similar al piojo adulto.
- b. Sus movimientos son muy limitados en todos los estadios ninfales.
- c. Pueden sobrevivir durante varios días sin alimento.
- d. Las ninfas presentan tres estadios en su desarrollo evolutivo. ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la pediculosis, señale la respuesta correcta:

- a. Infestación producida por piojos vivos, insectos que viven exclusivamente en el ser humano.
- b. La infestación no es autolimitada.
- c. *Pediculus humanus capitis* es el piojo de la cabeza.
- d. *Phthirus pubis* es la comúnmente denominada ladilla.
- e. Todas las anteriores son ciertas. ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La prevalencia de la pediculosis de la cabeza:

- a. 10-20% en todos los casos.
- b. 5% en nuestro país.
- c. Variable dependiendo de estudios y países. ✓
- d. Despreciable.
- e. Superior al 90% durante todo el año.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Son factores de riesgo para padecer la pediculosis de la cabeza:

- a. Tener más hermanos.
- b. Tener el pelo largo.
- c. Edad de 3-12 años.
- d. Sexo femenino.
- e. Todas son correctas. ✓

Pregunta 7**Respecto a la pediculosis, señale la incorrecta:**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

- a. El piojo de la cabeza puede vivir en otras zonas pilosas del cuerpo humano. ✓
- b. Su presencia es constante durante todo el año.
- c. Cualquier ser humano es susceptible de padecer infestación.
- d. No existe preferencia por estratos sociales o económicos.
- e. Su aparición no se asocia a malos hábitos higiénicos.

Pregunta 8

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

El género *Pediculus* incluye:

- a. Piojos de la cabeza.
- b. Piojos del cuerpo.
- c. Ladillas.
- d. a y b. ✗
- e. Todos los anteriores.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los piojos:

- a. Tienen alas durante la etapa de apareamiento, lo que contribuye a su propagación.
- b. No tienen alas y se mueven arrastrándose. ✓
- c. Presentan unas patas traseras fuertes que les permiten saltar varios centímetros.
- d. a y b son ciertas.
- e. Ninguna de las anteriores es cierta.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los piojos pueden arrastrarse hasta:

- a. 23 cm/segundo.
- b. 23 cm/minuto. ✓
- c. 23 cm/hora.
- d. 23 cm/día.
- e. 23 cm a lo largo de su vida.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La hembra pone los huevos (señala la correcta):

- a. Directamente en el cuero cabelludo con ayuda del haustelo.
- b. Los coloca en la raíz del pelo, unidos a él con un firme cemento. ✓
- c. Los pone todos juntos y a la vez para poder protegerlos mejor de las condiciones adversas que puedan surgir.
- d. A través del espiráculo que es el aparato reproductor de la hembra.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta incorrecta:

- a. El tiempo de incubación de las liendres depende de la temperatura corporal del sujeto.
- b. La incubación suele durar entre cinco y diez días.
- c. Las liendres viables se encuentran en la punta del cabello. ✓
- d. Las ninfas necesitan comer sangre rápidamente cuando salen del huevo.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta respecto al piojo adulto:

- a. Tienen el tamaño similar a un guisante.
- b. Realizan unas cinco comidas al día.
- c. Eliminan una saliva anticoagulante que favorece la succión de la sangre.
- d. Las respuestas b y c son correctas. ✓

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a las vías de transmisión de la pediculosis, señale la respuesta correcta:

- a. Las mascotas son una vía de transmisión.
- b. La infestación es autolimitada.
- c. *Pediculus humanus capitis* se trasmite por contacto entre cabezas. ✓
- d. Una vía de transmisión de *Phirus pubis* es compartir cepillos de pelo.
- e. Todas las anteriores son ciertas.

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la respuesta correcta:

- a. La higiene es el factor de riesgo fundamental para la infestación por piojos.

1,00

- b. Los últimos estudios han confirmado que las infestaciones son más frecuentes en niños que en niñas.
- c. El *Pediculus humanus capitis* transmite enfermedades al ser humano como el tífus epidémico.
- d. Los piojos son parásitos que habitan fundamentalmente en países tropicales.
- e. Los piojos se multiplican especialmente en condiciones de hacinamiento, debido al mayor contacto entre personas. ✓

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las características del *Pediculus humanus capitis* no se encuentra:

- a. Las liendres viables se sitúan a unos 6 mm del cuero cabelludo.
- b. Avanza a una velocidad de unos 30 cm/minuto.
- c. Tienen seis patas que salen de la región media.
- d. La hembra pone una media de unos 7-10 huevos al día.
- e. Todas son correctas. ✓

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta correcta:

- a. El piojo es capaz de nadar, facilitando de este modo, su propagación en las piscinas.
- b. Las concentraciones de cloro del agua de las piscinas, son un perfecto insectida, que elimina los piojos de la cabeza.
- c. Gracias a los tres pares de patas que tiene el piojo, éste pueden saltar de un cabello a otro, transmitiéndose así entre una persona y otra.
- d. Los piojos se pueden transmitir al compartir ropa y otros accesorios como gorras y bufandas. ✓

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La zona donde puedo encontrar más fácilmente piojos dentro del cuero cabelludo es:

- a. Región parietal.
- b. En la zona del flequillo.
- c. Zona occipital (Nuca) y coronilla. ✓
- d. En las pestañas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los piojos se desplazan:

- a. Saltando.
- b. Volando.
- c. Trepando. ✓
- d. Nadando.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto al ciclo vital del piojo:

- a. La vida media de un piojo es de 4 meses.
- b. Los piojos pasan por dos estadios en su desarrollo: ninfa y piojo adulto.
- c. El periodo de incubación puede durar hasta 20 días.
- d. El número de adultos por infestación puede ser de hasta 300 piojos. ✓

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto al impacto de la pediculosis en la vida cotidiana señale la respuesta incorrecta:

- a. Como sintomatología en el individuo únicamente producen picor. ✓
- b. Llevan asociado un componente emocional.
- c. Escoriaciones, eccemas y sobreinfección bacteriana pueden ser parte de las complicaciones.
- d. Supone un gasto económico.
- e. La presencia de piojos llevan asociado un marcado componente social.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no sería una complicación?:

- a. Eccema.
- b. Dolores musculares. ✓
- c. Sobreinfección bacteriana por rascado.
- d. Prurito.
- e. Malestar o irritabilidad.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la lendreras señale lo incorrecto:

- a. Han mostrado tal grado de utilidad que en la actualidad siguen utilizándose.
- b. Debe constar de un número elevado de finas y alargadas púas metálicas.

- c. Se debe pasar de forma tangencial al cuero cabelludo.
- d. Las lendreras más utilizadas son las de metal.
- e. Todas son correctas. ✓

Pregunta 24

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se considera criterio diagnóstico de pediculosis:

- a. Presencia de al menos 1 piojo vivo.
- b. > 5 huevos a menos de 6 mm del cuero cabelludo.
- c. Presencia de al menos 2 piojos vivos.
- d. a y b son correctas. ✓
- e. Todas son incorrectas.

Pregunta 25

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el uso de la permetrina es falsa?

- a. No se han descrito resistencias. ✓
- b. Posee una gran eficacia en la primera dosis de administración.
- c. Tiene actividad acaricida cuando se aumenta la dosis.
- d. Tiempo de aplicación breve.

Pregunta 26

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

La forma de administración más empleada de la permetrina es:

- a. Champú.
- b. Spray.
- c. Loción. ✓
- d. Crema.

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

En caso de aparición de resistencia frente a permetrina la principal alternativa será:

- a. Aumentar la dosis del 1% al 5%.
- b. Cambiar la permetrina por tetrametrina.
- c. Utilizar agentes pediculicidas que produzcan la asfixia del piojo. ✓
- d. Todas las anteriores alternativas son eficaces.

Pregunta 28

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sustancia ayuda a evitar la aparición de resistencias y a potenciar la eficacia de la permetrina?

- a. Miristrato de isopropilo.
- b. Isopropanol.
- c. Alcohol bencílico.
- d. Butóxido de piperonilo. ✓

Pregunta 29

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale los principales inconvenientes del uso de malatión como pediculicida:

- a. El tratamiento requiere un período prolongado de aplicación que oscila de 8 a 12 horas.
- b. El tratamiento puede ser irritante para la piel debido al isopropanol que contiene.
- c. Olor desagradable tras la aplicación.
- d. Todos los anteriores. ✓

Pregunta 30

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas sustancias produce la muerte del piojo por asfixia?

- a. Spinosad. ✗
- b. Dimeticona.
- c. Vinagre.
- d. Lindano.

Pregunta 31

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto al mecanismo de actuación del alcohol bencílico con el aceite mineral, señale lo correcto:

- a. El alcohol bencílico impide que se cierren los espiráculos respiratorios.
- b. El aceite penetra en el interior del piojo causando la muerte por asfixia.
- c. Por el tipo de mecanismo de actuación que tiene es muy difícil la aparición de resistencias.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 32

Correcta

Una de las siguientes afirmaciones es verdadera:

Puntúa 1,00 sobre 1,00

- a. El alcohol bencílico es apto en España en niños a partir de 1 mes.
- b. La formulación de dimeticona al 92% posee un efecto ovicida menor que dimeticona al 4%.
- c. La aplicación de malatión oscila entre 10 y 30 minutos.
- d. No existen resistencias frente a insecticidas oclusivos. ✓

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El tratamiento de elección en una infestación de piojos en el cuerpo es:

- a. Permetrina al 5%.
- b. Permetrina al 1%.
- c. Permetrina al 1% con butóxido de piperonilo al 4%. ✓
- d. Malatión al 0,5%.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto al uso de repelentes, señale la incorrecta:

- a. Se trata de sustancias que quedan residualmente en los ejes del pelo con el objetivo de impedir la infestación y evitar el tratamiento.
- b. Son una potencial estrategia para el control de infestaciones masivas.
- c. El IR-3535 se debe aplicar sobre el cabello húmedo. ✓
- d. La sustancia más empleada es el IR-3535.

[Finalizar revisión](#)