



## Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

[Terminar intento...](#)

**Pregunta 1**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

¿Coincidiendo con qué suceso podría presentar clínica un neonato afectado por una coartación de aorta que no dispone diagnóstico prenatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Cierre del foramen oval.
- ☐ b. Cierre del ductus venoso.
- ☐ c. Cierre del ductus arterial.
- ☐ d. Todas son correctas.

**Pregunta 2**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Si durante la reanimación de recién nacido a término al tercer minuto de vida, valoramos que presenta respiración espo con ligera dificultad y la FC inferior a 100 lpm, ¿Cuál de las siguientes acciones sería la correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar contacto piel con piel y realizar cuidados de rutina.
- ☐ b. Administrar oxígeno indirecto.
- ☐ c. Colocar pulsioxímetro y valorar colocar CPAP.
- ☐ d. Colocar pulsioxímetro y realizar ventilaciones con presión positiva intermitente.

**Pregunta 3**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

¿En cuál de las siguientes situaciones se debería valorar la intubación traqueal de inicio durante la reanimación neonatal

Seleccione una:

- ☐ a. Recién nacido con líquido teñido de meconio no vigoroso.
- ☐ b. Recién nacido con hernia diafragmática no vigoroso.
- ☐ c. Recién nacido pretérmino no vigoroso.
- ☐ d. Todas son correctas.

**Pregunta 4**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a las características anatomofisiológicas del recién nacido sano:

Seleccione una:

- ☐ a. Peso (2.500-4.000grs), talla (45-53 cm) y perímetro craneal (33-38 cm).
- ☐ b. El cordón umbilical debe tener dos venas y una arteria, rodeadas de gelatina de Wharton.
- ☐ c. Presenta flexión de las cuatro extremidades con resistencia a su extensión pasiva y ligera abducción de caderas.
- ☐ d. Puede presentar acabalgamiento de suturas.

**Pregunta 5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Señala la respuesta correcta con respecto a la ventilación con presión positiva intermitente (VPPI) del neonato en parito

Seleccione una:

- ☐ a. Si tras 30 segundos de ventilación eficaz la frecuencia cardíaca no mejora, revisaremos la técnica de ventilación proporcionada y valoraremos la intubación orotraqueal.
- ☐ b. La VPPI será necesaria cuando, a los 30 segundos de vida, la frecuencia cardíaca sea menor de 100 latidos por min el recién nacido tenga movimientos de gasping o esté en apnea.
- ☐ c. Si tras 30 segundos de ventilación eficaz, aumenta la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto y consigue una respiración espontánea y eficaz, suspenderemos gradualmente la asistencia respiratoria.
- ☐ d. Todas son correctas.

**Pregunta 6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Para realizar una correcta ventilación con mascarillas debemos abrir la vía aérea. ¿Cuál de las siguientes acciones es cor

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar un sellado boca-nariz
- ☐ b. Colocaremos la cabeza en posición neutra o hiperextensión.
- ☐ c. Mantendremos la boca cerrada ya que los neonatos son respiradores nasales.
- ☐ d. Todas son correctas.

**Pregunta 7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

En relación al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. Exige la presencia de temperatura rectal  $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$  o inferior a  $36^{\circ}\text{C}$ .
- ☐ b. Es una respuesta del organismo frente a un agente agresor.
- ☐ c. A y B son falsas.
- ☐ d. A y B son ciertas.

**Pregunta 8**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un signo característico de la piel de un RN?

Seleccione una:

- ☐ a. Presencia de vernix caseosa.
- ☐ b. Mancha mongólica o de Baltz.

- ☐ c. Millium facial.
- ☐ d. Todos son signos característicos de la piel de un RN.

**Pregunta 9**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

Recién nacido a término, que al minuto de vida presenta: extremidades cianóticas, frecuencia cardíaca mayor de 100 lal minuto, respiración lenta e irregular, se queja y presenta pobre tono muscular. ¿Qué puntuación tendría en el test de Ap minuto de vida?

Seleccione una:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 6
- ☐ c. 7
- ☐ d. 8

**Pregunta 10**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál de estos cambios fisiológicos en el neonato es incorrecto con respecto a la etapa de transición a la vida extrauteri

Seleccione una:

- ☐ a. Aumento de la perfusión pulmonar producido por la entrada de aire a los alvéolos (llenos de líquido en la etapa fet por consiguiente, vasodilatación arterial.
- ☐ b. Cierre del ductus arterioso.
- ☐ c. Cierre del foramen oval.
- ☐ d. Aumento de las resistencias pulmonares debido a la vasodilatación alveolar.

**Pregunta 11**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto al test de Apgar:

Seleccione una:

- ☐ a. Se realiza al minuto y a los cinco minutos de vida del recién nacido.
- ☐ b. Posteriormente, se puede realizar cada cinco minutos hasta los quince minutos de vida.
- ☐ c. Lo puede realizar un médico.
- ☐ d. Lo puede realizar una enfermera.

**Pregunta 12**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes premisas es incorrecta con respecto al líquido amniótico teñido de meconio?

Seleccione una:

- ☐ a. El estrés hipóxico fetal estimula la expulsión de meconio y los movimientos de gasping producen su aspiración intr
- ☐ b. No se conocen exactamente las causas por las cuales el meconio pasa al líquido amniótico.
- ☐ c. La presencia de líquido amniótico teñido de meconio indica que se ha producido un síndrome de aspiración meconi
- ☐ d. Todas son incorrectas.

**Pregunta 13**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe reevaluar al neonato cada 30 segundos.
- ☐ b. Se debe mantener una temperatura corporal comprendida entre 36 y 37°C.
- ☐ c. En recién nacidos a término se recomienda comenzar las maniobras de reanimación con una FiO2 del 21%.
- ☐ d. La aspiración de secreciones se realizará solamente si es estrictamente necesario.

**Pregunta 14**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes no representa un factor de riesgo prenatal?

Seleccione una:

- ☐ a. Malformaciones fetales.
- ☐ b. Gestación posttérmino.
- ☐ c. Disminución de los movimientos fetales.
- ☐ d. Todas son ciertas

**Pregunta 15**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

Señala la respuesta incorrecta con respecto a los cuidados básicos del recién nacido sano:

Seleccione una:

- ☐ a. Es recomendable, tras el nacimiento, la administración de una dosis única de 1 mg de Vitamina K intramuscular.
- ☐ b. El contacto piel con piel del neonato con su madre se recomienda iniciarlo inmediatamente después del parto en R sanos, manteniéndolo, al menos, 50-60 minutos de manera ininterrumpida.
- ☐ c. La asociación española de Pediatría (AEP) recomienda la vacunación universal frente al virus de la hepatitis B, habitualmente con una primera dosis dentro de las primeras 48 horas de vida.
- ☐ d. La identificación del RN se realizará inmediatamente tras el nacimiento.

**Pregunta 16**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

Señala la respuesta correcta con respecto a la reanimación del neonato en paritorio:

Seleccione una:

- ☐ a. En la valoración inicial evaluaremos el estado del bebé por medio de dos preguntas clave.
- ☐ b. En la evaluación inicial de la reanimación valoraremos dos parámetros que son la frecuencia cardíaca y la respiraci
- ☐ c. Tomaremos el pulso en la base del cordón umbilical.
- ☐ d. Colocaremos el pulsioxímetro en la mano izquierda (preductal)

**Pregunta 17**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

Señala la respuesta correcta. Durante la etapa fetal, la sangre procedente de la placenta regresa al cuerpo fetal a través

Seleccione una:

- ☐ a. La arteria umbilical conectada a la vena cava inferior.
- ☐ b. Las arterias umbilicales conectadas a las arterias femorales.
- ☐ c. Las venas umbilicales conectadas a las arterias femorales.
- ☐ d. La vena umbilical conectada a la vena cava inferior.

**Pregunta 18**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

¿Con qué otro término podemos definir la restricción del crecimiento intrauterino tipo I? Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Simétrico.
- ☐ b. Asimétrico.
- ☐ c. Armónico.
- ☐ d. A y C son correctas.

**Pregunta 19**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

De las siguientes cardiopatías congénitas, ¿cuál de ellas podría cursar con una cianosis severa?

Seleccione una:

- ☐ a. Coartación de aorta.
- ☐ b. Estenosis pulmonar.
- ☐ c. Ductus arterioso persistente.
- ☐ d. Todas son correctas.

**Pregunta 20**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

 Marcar pregunta

Señala la respuesta incorrecta en lo que refiere a las medidas para la prevención de las infecciones nosocomiales.

Seleccione una:

- ☐ a. Vacunación del personal sanitario.
- ☐ b. La lactancia materna no influye en la prevención de la infección nosocomial.
- ☐ c. Lavado de manos con soluciones alcohólicas.
- ☐ d. Proyecto Bacteriemia 0.

[Siguiente](#)