Información Marcar pregunta Texto informativo Julián Contreras tiene 57 años y asiste semanalmente al CSM de Miraflores (Alcobendas) para rellenar el pastillero y seguimiento de las ideas autolíticas. Es autónomo y maneja de forma adecuada su tratamiento en su hogar, el cual comparte con sus dos hermanos. Sin embargo, continúa rellenando el pastillero en la consulta de enfermería porque "prefiero no tener en casa pastillas por si me entran las ideas de tomarlas". Su tratamiento se compone de: Citalopram 20mg (0 - 1 - 0)Litio 400 mg (1 - 0 - 1'5)(0 - 0 - 1)Quetiapina 300 mg (0 - 2 - 0)Quetiapina 200 mg Ácido Valproico 500 mg (1 - 0 - 2)Aripiprazol 15 mg (1 - 0 - 1)Lorazepam 1 mg (0 - 0 - 1)Lormetazepam 2 mg (0 - 0 - 1)En base a lo anterior, responda a las siguientes preguntas: Pregunta 1 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Texto de la pregunta El citalopram es un fármaco de la clase: Seleccione una: a. Antidepresivo tricíclico. b. Antipsicótico de primera generación. c. Antidepresivo ISRS. d. Estabilizador del ánimo. Pregunta 2

Sin responder aún Puntúa como 1,00

Marcar pregunta
Texto de la pregunta
El litio es un fármaco de la clase:
Seleccione una: a. Estabilizador del ánimo. b. Antidepresivo ISRS. c. Antidepresivo tricíclico. d. Antidepresivo IRSN.
Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00
Marcar pregunta
Texto de la pregunta
¿Cuál es el riesgo potencial de la administración de litio y citalopram?:
a. Extrapiramidalismo. b. Toxicidad por litio. c. Síndrome neuroléptico maligno. d. Temblores.
Pregunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Marcar pregunta
Texto de la pregunta
Si el paciente nunca ha presentado episodios de ansiedad, ¿cuál es la razón de la pauta de lorazepam?:
Seleccione una:
a. Tratamiento de las alucinaciones hipnagógicas.
b. Potenciador del efecto de los antidepresivos.

c. Error del prescriptor, deberíamos avisar.
d. Tratamiento del insomnio.
Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00
Marcar pregunta
Texto de la pregunta
Respecto a la quetiapina, en relación con el resto del tratamiento puede provocar:
Seleccione una: a. Neurotoxicidad. b. Toxicidad por quetiapina. c. Sedación y somnolencia. d. Todas son correctas.
Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Marcar pregunta
Texto de la pregunta
Según la dosis de ácido valproico pautada (1'5 gramos/día) cuál es el efecto que se está buscando:
Seleccione una:
a. Prevención de la epilepsia.
b. Tratamiento de mantenimiento de las fases de manía. c. Migraña.
d. No esta indicada esa dosis por riesgo de intoxicación.
Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Marcar pregunta
Texto de la pregunta

Si realizase una sobreingesta sólo de aripiprazol, ¿cómo podríamos detectarlo?:
Seleccione una:
a. Aumento de la sedación y presencia de vómitos.
b. No se detecta.
c. Fallece instantáneamente.
d. Tono azulado de la piel.
Pregunta 8 Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta
Texto de la pregunta
El lorazepam presenta una duración de su efecto:
Seleccione una:
a. Corta.
b. Intermedia.
c. Larga.
d. No tiene efecto, actúa como un placebo si no se administra junto con otra benzodiazepina.
Pregunta 9
Sin responder aún Puntúa como 1,00
Marcar pregunta
Texto de la pregunta
Si cuando el paciente asiste a la farmacia le venden Noctamid® en vez de lormetazepam, ¿puede tomarlo?:
Seleccione una:
a. No porque es un fármaco completamente distinto.
b. No porque tiene más riesgos de efectos secundarios que la marca genérica.
c. No, siempre debe comprar lo que se pauta en la hoja de prescripción.
d. Sí porque es el nombre comercial del mismo fármaco.
Pregunta 10
Sin responder aún Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A la vista del tratamiento, ¿cuál cree que es el diagnóstico del paciente?:

Seleccione una:

a. Esquizofrenia residual.

b. Trastorno de personalidad clúster B.

c. Trastorno bipolar.

d. Trastorno de ansiedad.

<u>S</u>iguiente