

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un OVACE en v íctima consciente al que se le han administrado 5 golpes interescapulares no siendo efectivos, Cu ál ser á la siguiente actuaci ón

Seleccione una:

- ☐ a. RCP
- ☒ b. Compresiones abdominales
- ☐ c. Animar a toser
- ☐ d. Uso de mascarilla ventimask

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Compresiones abdominales

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una v íctima de PCR, de los dispositivos que se exponen a continuaci ón cu ál se utilizar ía

Seleccione una:

- ☐ a. B. Bal ón autoinflable - v álvula- bolsa de reservorio (B-M-V)
- ☒ b. B y C son correctas
- ☐ c. A. Mascarilla ventimask
- ☐ d. C. C ánula de Guedel

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta **3**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Calcula la autonomía de una botella de oxígeno con los datos que se aportan
capacidad 6 L presión 250b Flujo a suministrar 15L7min

Seleccione una:

- ☐ a. 150 min
- ☐ b. 15 min
- ☒ c. 100 min
- ☐ d. 60 min

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 min

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El dispositivo B-V-M puede utilizarse

Seleccione una:

- ☐ a. C. Conectada a bolsa de reservorio y a una fuente de oxígeno para alcanzar concentraciones de O₂ superiores
- ☐ b. A. Sin conectar a fuente de oxígeno
- ☒ c. A y C son correctas
- ☐ d. B. Es imprescindible para su funcionamiento que sea conectada a fuente de oxígeno

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **5**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El siguiente paso, tras animarle a toser, en un paciente con obstrucción de la vía consciente con tos no efectiva

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son incorrectas
- ☐ b. Compresiones abdominales
- ☐ c. Maniobra de Heimlich
- ☐ d. Animarle a toser

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso de la cánula orofaríngea está indicado en todas las siguientes situaciones, excepto

Seleccione una:

- ☐ a. Ante un paciente con crisis convulsiva
- ☐ b. Paciente inconsciente que respira de manera espontánea
- ☐ c. Durante la aspiración de secreciones faríngeas al paciente inconsciente
- ☒ d. Ante un paciente inconsciente con reflejo nauseoso conservado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ante un paciente inconsciente con reflejo nauseoso conservado

Pregunta **7**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la desfibrilación, se ñala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☒ a. Es útil para bradicardias
- ☐ b. En la cadena de supervivencia se contempla la desfibrilación precoz en su tercer eslabón
- ☐ c. Su utilidad se basa en la despolarización de las células cardiacas
- ☐ d. Es el tratamiento definitivo de la FV y la TVSP

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es útil para bradicardias

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a las cánulas orofaríngeas, se ñala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Facilitan la aspiración de secreciones en faringe
- ☐ b. Permeabilizan la vía aérea pero no la aíslan
- ☒ c. Permiten abandonar la tracción mandibular y la extensión
- ☐ d. Facilita la ventilación con el uso del dispositivo B-V-M

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Permiten abandonar la tracción mandibular y la extensión

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al DESA una de las posiciones de colocación de los electrodos que se exponen a continuación es correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Uno infraclavicular derecha, otro infraclavicular izquierda
- ☐ b. Uno infraclavicular izquierda, otro bajo mamila derecha
- ☐ c. Uno bajo mamila derecha, otro bajo mamila izquierda
- ☒ d. Uno infraclavicular derecha, otro bajo la mamila izquierda

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Uno infraclavicular derecha, otro bajo la mamila izquierda

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al dispositivo B-V-M señala la afirmación incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Debe proporcionar un sellado hermetico
- ☐ b. En adultos la forma de la mascarilla es triangular
- ☐ c. El volumen de la bolsa en adultos es de 1500cc
- ☒ d. Alcanzan niveles de FiO2 entre 26 - 50 por ciento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alcanzan niveles de FiO2 entre 26 - 50 por ciento

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación al uso de DESA

Seleccione una:

- ☒ a. La descarga no es administrada hasta que el operador no presiona el botón de descarga
- ☐ b. Se requiere analizar el ritmo y detectar FV en la pantalla del monitor
- ☐ c. Deben ser utilizados únicamente por personal sanitario
- ☐ d. Todas las anteriores son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La descarga no es administrada hasta que el operador no presiona el botón de descarga

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las características de la mascarilla ventimask es cierto que

Seleccione una:

- ☐ a. Facilita la expectoración
- ☐ b. Todas son correctas
- ☐ c. Suelen ser bien toleradas por el paciente
- ☒ d. Dificulta la comunicación con el paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dificulta la comunicación con el paciente

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un ritmo candidato a desfibrilación

Seleccione una:

- ☐ a. AESP
- ☐ b. Asistolia
- ☐ c. Bloqueo de rama derecha
- ☒ d. FV

Retroalimentación

La respuesta correcta es: FV

Pregunta **14**

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La actuación más inmediata tras la administración de la descarga autorizada por el DESA es

Seleccione una:

- ☐ a. Comprobar respuesta mediante regla AVDN
- ☒ b. Reiniciar RCP
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☐ d. Detectar pulso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reiniciar RCP

Pregunta **15**

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La administración de ventilaciones con el dispositivo B-M-V sin conexión a O₂

Seleccione una:

- ☐ a. FiO₂ del 60 por ciento
- ☐ b. FiO₂ del por ciento
- ☒ c. FiO₂ del 20,94 por ciento
- ☐ d. FiO₂ del 100 por ciento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: FiO₂ del 20,94 por ciento

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La FiO₂ máxima que puede alcanzarse con la mascarilla ventimask es de

Seleccione una:

- ☒ a. 50 por ciento
- ☐ b. 35 por ciento
- ☐ c. 45 por ciento
- ☐ d. 26 por ciento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 50 por ciento

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La primera actuación a realizar ante una víctima consciente con obstrucción de la vía aérea por alimento

Seleccione una:

- ☐ a. Iniciar RCP
- ☐ b. Compresiones torácicas
- ☒ c. Animar a toser
- ☐ d. Maniobra de Heimlich

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Animar a toser

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Paciente en PCR al que se le administra O₂ mediante B-V-M con un flujo de 15 L/min. La botella de la que se dispone tiene una capacidad de 13,5L. Al abrir, el manómetro indica 150. Cuál será la autonomía en esta situación

Seleccione una:

- ☐ a. 150min
- ☐ b. 15 min
- ☐ c. 35 min
- ☒ d. 135 min

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 135 min

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la cáñula orofaríngea, se ñala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Previenen la broncoaspiración
- ☐ b. Entre sus funciones se encuentra aislar la vía aérea
- ☒ c. Todas las anteriores son incorrectas
- ☐ d. Se utilizará en pacientes inconscientes con reflejo nauseoso conservado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son incorrectas

Pregunta **20**

Correcta

Puntuá 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se ñala la afirmación correcta en relación al uso de oxigenoterapia

Seleccione una:

- ☐ a. El flujo corresponde a la proporción de oxígeno contenido en el gas suministrado
- ☒ b. El flujo se expresa en litros/ minute
- ☐ c. La FiO2 es la cantidad de gas suministrada
- ☐ d. El flujo es expresado en % o sobre 1

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El flujo se expresa en litros/ minute