

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A través de una vía intra ósea pueden administrarse

Seleccione una:

- ☐ a. A. Sueroterapia
- ☒ b. A y B son correctas
- ☐ c. C. Está contraindicado el uso de esta vía para la administración de fibrinolíticos
- ☐ d. B. Componentes sanguíneos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la adrenalina, señale la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☐ a. B. Se administrará vía endotraqueal como primera opción quedando relegado la vía intra ósea como última opción
- ☐ b. A. Ante una PCR y en ritmos desfibrilables se administrará adrenalina tras la segunda o tercera desfibrilación
- ☐ c. C. Se administrará 1 mg (1 ampolla cada 3 - 5 min)
- ☒ d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a los dispositivos supraglóticos, se ñala la afirmaci3n correcta

Seleccione una:

- ☐ a. A. Con la ML clásica se debe realizar la hiperextensi3n del cuello
- ☐ b. C. La ML Fastrach tiene incorporado un tubo de drenaje que permite el drenaje del contenido gástrico
- ☐ c. B. Con la ML Fastrach no se requiere la movilizaci3n de la cabeza
- ☒ d. A y B son correctas

Retroalimentaci3n

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relaci3n al decálogo de atenci3n prehospitalaria, se ñala la afirmaci3n incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Las ambulancias de clase C son las destinadas a proporcionar SVA.
- ☐ b. La densidad del tráfico es un factor condicionante en la elecci3n del medio de transporte
- ☐ c. Para distancias de 200km se utilizará el helicóptero sanitario como primera elecci3n para el transporte.
- ☒ d. La fase de alerta es una etapa pasiva.

Retroalimentaci3n

La respuesta correcta es: La fase de alerta es una etapa pasiva.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es incorrecto con respecto a la utilización del dispositivo Airtraq

Seleccione una:

- ☐ a. Requiere la alineación de los ejes oral, faríngeo y laríngeo
- ☒ b. Todas son incorrectas
- ☐ c. Entre sus inconvenientes destaca que no permite la colocación de tubos endotraqueales de todos los tamaños
- ☐ d. Se trata de un dispositivo supraglótico utilizado en el manejo de la vía aérea difícil

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son incorrectas

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para garantizar la continuidad asistencial del paciente es necesario una correcta transferencia entre profesionales. Un modelo estandarizado de transferencia es el

Seleccione una:

- ☒ a. ISOBAR
- ☐ b. Ninguna es correcta
- ☐ c. ALEC
- ☐ d. OPUMA

Retroalimentación

La respuesta correcta es: ISOBAR

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. Valores por encima de 25 mmHg predicen, en un alto porcentaje, la recuperación del pulso.
- ☒ c. La elevación súbita y sostenida del EtCO<sub>2</sub> es una alerta precoz de recuperación de la circulación espontánea.
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La elevación súbita y sostenida del EtCO<sub>2</sub> es una alerta precoz de recuperación de la circulación espontánea.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☒ a. La torsades de Pointes es un tipo de taquicardia ventricular
- ☐ b. La asistolia es el ritmo más frecuente de la PCR en el adulto
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☐ d. La AESP se caracteriza por una actividad ventricular rápida y desorganizada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La torsades de Pointes es un tipo de taquicardia ventricular

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☐ a. La toracocentesis con la colocación de un tubo de drenaje pleural es el tratamiento definitivo al neumotórax a tensión.
- ☐ b. Hay evidencia clara de los beneficios del uso de la fibrinólisis como tratamiento del tromboembolismo pulmonar
- ☒ c. El ERC considera la administración de Naloxona IM o IN incluso por testigos legos.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El ERC considera la administración de Naloxona IM o IN incluso por testigos legos.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación correcta con respecto a la intubación endotraquea

Seleccione una:

- ☐ a. Se fija como ideal realizar la intubación sin interrumpir las compresiones torácicas
- ☐ b. La intubación traqueal no debe demorar la desfibrilación
- ☒ c. Todas son correctas



d. Cada intento de intubación no debe superar los 30 sg.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación incorrecta

Seleccione una:



a. No se recomienda el uso de Atropina en asistolia o AESP



b. El sulfato de magnesio se encuentra indicado ante torsades de pointes



c. Se puede sustituir la amiodarona por vasopresina



d. Se administrarán 300 mg de amiodarona si tras tres descargas persiste la FV/TVSP

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se puede sustituir la amiodarona por vasopresina

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación incorrecta en relación a la mascarilla laríngea clásica

Seleccione una:



a. A. Los números de ML correspondiente a adultos van del 4 al 6.



b. B. El tamaño se selecciona con el peso del paciente



c. C. Ante la duda para la elección de tamaño se seleccionará aquel más pequeño



d. A y C son incorrectas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son incorrectas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se considera hiperpotasemia leve a cifras Potasio sérico

Seleccione una:

- ☐ a. 7-8 mEq/l
- ☐ b. Ninguna de las anteriores es correcta
- ☒ c. Menor que 6,5 mEq/l
- ☐ d. 6.5-7mEq/l

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Menor que 6,5 mEq/l

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Seg ún el test Mallampati, Samsoon y Young, Qu é clase se le asigna cuando se puede visualizar el paladar blando y la base de la úvula

Seleccione una:

- ☐ a. Clase II
- ☐ b. Clase I
- ☐ c. Clase IV
- ☒ d. Clase III

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Clase III

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la clasificación de Cormack-Lehane, el grado IV corresponde a

Seleccione una:

- ☒ a. No se observa epiglotis ni glotis
- ☐ b. Se observa la glotis, incluyendo comisura anterior y posterior
- ☐ c. La glotis puede estar expuesta
- ☐ d. Puede verse únicamente la epiglotis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No se observa epiglotis ni glotis

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si se tienen dudas si FV fina o asistolia

Seleccione una:

- ☒ a. Se analizar á nuevamente el ritmo, ya que es dif ícil no distinguir entre estas dos arritmias
- ☐ b. Se desfibrilar á
- ☐ c. Se realizar á una cardioversi ón
- ☐ d. Se realizar á RCP CV 30:2

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realizar á RCP CV 30:2



Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son causas potencialmente reversibles de la PCR todas las siguientes, except

Seleccione una:

- ☐ a. Tromboembolismo pulmonar
- ☒ b. Hipertensi ón
- ☐ c. Hipotermia
- ☐ d. Hipovolemia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipertensi ón