

Principio del formulario

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:



a. Los hipnóticos son fármacos inductores del sueño que producen sedación y anestesia



b. Los hipnóticos poseen escasos efectos secundario entre ellos destaca la amnesia y la anestesia



c. Los hipnóticos son fármacos inductores del sueño que producen como efecto adverso tolerancia, amnesia y efecto rebote o paradójico ✓



d. Los hipnóticos poseen los mismo efectos adversos que los ansiolíticos

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta



¿Qué fármaco se utiliza por vía rectal para las crisis de los niños?

Seleccione una:



a. Fenitoína



b. Valproato

☐ c. Fenobarbital

☐ d. Diazepam ✓

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



¿Cuál es la herramienta fundamental que debería usar la enfermera de salud mental en la entrevista para valorar la ansiedad?

Seleccione una:

☐ a. La empatía

☐ b. La calidez y el respeto ✗

☐ c. La observación y el respeto

☐ d. La priorización

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



Señale cuál de estas frases es correcta con respecto a los antidepresivos:

Seleccione una:

☐ a. Todos los antidepresivos tienen la misma eficacia, distinguiéndose solamente por su perfil de efectos adversos y toxicidad. ✓

☐ b. La administración de un ISRS junto con otro agente serotoninérgico puede dar lugar a crisis hipertensivas graves.

☐ c. Los IMAOs se administran como tratamiento de elección de depresiones en la tercera edad.

☐ d. Durante el tratamiento con antidepresivos y, habiendo transcurrido un mínimo de 2 meses desde el inicio del fármaco, se permite la conducción y el uso de maquinaria pesada.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



Una mujer de 84 años, consulta por insomnio de conciliación. Tras fracasar a medidas de higiene del sueño, se decide iniciar tratamiento farmacológico. ¿Cuál de los siguientes fármacos seleccionaría para la paciente?

Seleccione una:

☐ a. Dlacepam

☐ b. Lormetacepam ✓

☐ c. Fenobarbital

☐ d. Clordiacepóxido

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



Cuando un paciente está a tratamiento con antidepresivos hay que advertirle de que:

Seleccione una:

- ☐ a. Vigile la aparición de hematomas o hemorragias anómalas
- ☐ b. Reduzca la cantidad de sodio de la dieta
- ☒ c. El efecto terapéutico suele aparecer a las 2-3 semanas ✓
- ☐ d. Aumente la ingesta de agua

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



El uso de hipnóticos en poblaciones específicas como pueden ser los ancianos, ¿a qué debemos prestar principal atención?

Seleccione una:

- ☐ a. Control de diuresis
- ☒ b. Nivel de conciencia ✓
- ☐ c. Alteraciones a nivel renal
- ☐ d. Control de ingestas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



¿Qué información le daría a un paciente que lleva 7 meses tomando amitriptilina y quiere abandonar el tratamiento?

Seleccione una:

- ☐ a. El fármaco tarda en presentar el efecto terapéutico total de 7 a 8 meses, por lo que deberá ser paciente
- ☒ b. La suspensión brusca del fármaco puede provocar un síndrome de abstinencia, por lo que deberá hacerse de forma escalonada. ✓
- ☐ c. Este fármaco ya no existe en el mercado farmacéutico español
- ☐ d. Deberá esperar a que transcurran 3 años para suspender el tratamiento

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta

☐

¿Cuál sería el fármaco indicado para la intoxicación por benzodiacepinas?

Seleccione una:

- ☐ a. Alprazolam
- ☐ b. Dobutamina
- ☐ c. Naloxona
- ☒ d. Flumacénilo ✓

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



Los inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) interaccionan con los alimentos ricos en tiramina (chocolate, queso curado, etc) pudiendo provocar...

Seleccione una:



a. Hipotensión



b. Crisis hipertensivas ✓



c. Alteraciones en la coagulación



d. Aumento de la presión intraocular

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta



La dependencia de las benzodiacepinas es una patología grave a la que el profesional de enfermería debe estar atento. Suele ocurrir al suspender bruscamente estos medicamentos y se acompaña de los siguientes efectos menos uno de ellos:

Seleccione una:



a. Síntomas psicológicos de ansiedad (insomnio, irritabilidad, distrofia)



b. Síntomas somáticos de ansiedad (temblor, palpitaciones, vértigo, sudoración, espasmos musculares)



c. Trastornos cardíacos e hipotensión ortostática ✓



d. Trastornos de la percepción (intolerancia al ruido y a la luz, sensación de movimiento, sabor metálico)

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta



¿Qué fármaco presenta la siguiente indicación?: Su principal acción farmacológica es ansiolítica como ya hemos mencionado y antidepresiva.

Seleccione una:



a. Bromacepam



b. Loracepam



c. Buspirona ✓



d. Antidepresivos tricíclicos

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta



En la intoxicación por antidepresivos, la afirmación correcta es:

Seleccione una:



a. Los antidepresivos tricíclicos pueden producir cardiotoxicidad debido al bloqueo de los canales de potasio.



b. El síndrome serotoninérgico puede desencadenarse tras la administración de un ISRS junto con un IMAO. ✓



c. En la intoxicación por antidepresivos tricíclicos, la primera medida será provocar el vómito y estabilizar hemodinámicamente al paciente.

☐ d. La presencia de al menos uno de los siguientes signos obligará a la hospitalización del paciente al menos durante 24 horas: QRS > 100mseg, compromiso del nivel de conciencia o hipertensión.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



¿Cuál de las siguientes actividades consideras recomendaciones positivas para el paciente con sintomatología ansiosa?

Seleccione una:



a. Ejercicios de relajación



b. Baños calientes



c. Actividades recreativas



d. Cualquiera de las anteriores ✓

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



La dependencia de las benzodiacepinas es una patología grave a la que el profesional de enfermería debe estar atento. Suele ocurrir al suspender bruscamente estos medicamentos y se acompaña de los siguientes efectos menos uno de ellos:

Seleccione una:



a. Síntomas psicológicos de ansiedad (insomnio, irritabilidad, distrofia)

☐ b. Síntomas somáticos de ansiedad (temblor, palpitaciones, vértigo, sudoración, espasmos musculares) ❌

☐ c. Trastornos cardíacos e hipotensión ortostática

☐ d. Trastornos de la percepción (intolerancia al ruido y a la luz, sensación de movimiento, sabor metálico)

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



Los hipnóticos son fármacos que producen efectos adversos como la reacción paradójica, ¿en qué consiste?

Seleccione una:

☐ a. Sedación

☐ b. Somnolencia

☐ c. Estado de disforia

☐ d. Ansiedad e inquietude ✔️

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



Durante la administración de IMAOs, es muy importante recordarle al paciente que debe evitar consumir alimentos ricos en tiramina, entre los no se incluyen:

Seleccione una:



a. Chocolate



b. Plátano



c. Queso fresco ✓



d. Embutidos

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta



De entre los siguientes hipnóticos ¿cual tiene una duración de efecto más corta?

Seleccione una:



a. Temazepam



b. Flurazepam



c. Zopiclona



d. Triazolam ✓

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta



En el tratamiento de antidepresivos, es falso que...

Seleccione una:

- ☐ a. Se deberán explorar las ideas de suicidio en pacientes que empiezan con tratamiento antidepresivo
- ☐ b. Lo efectos secundarios más comunes son los anticolinérgicos
- ☐ c. Su administración es fundamentalmente vía oral
- ☐ d. Los antidepresivos tienen el mismo mecanismo de acción ✓

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

☐ ☐ ☐ ☐ Marcar pregunta

Texto de la pregunta



¿Qué recomendaciones le darías a un paciente que inicia un tratamiento con sertralina?

Seleccione una:

- ☐ a. Los efectos secundarios graves aparecen a las pocas semanas, pero disminuyen en gravedad con el paso del tiempo.
- ☐ b. Su combinación con otro eutimizante puede dar lugar al síndrome serotoninérgico.
- ☐ c. El efecto antidepresivo se hace evidente a los 2-3 días del comienzo del tratamiento
- ☐ d. Puede provocar disminución del apetito y una consecuente pérdida de peso. ✓



Final del formulario

Finalizar revisión