



Navegación por el
cuestionario



[Terminar intento...](#)

Pregunta 1

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

La priorización territorial en la donación de órganos se realiza con el siguiente orden:

Seleccione una:

- a. Territorio nacional>Zona>Comunidad Autónoma>Ciudad>Hospital.
- b. Territorio nacional>Comunidad Autónoma>Zona>Ciudad>Hospital.
- c. Hospital>Ciudad>Comunidad Autónoma>Zona>Territorio nacional.
- d. Hospital>Ciudad>Zona>Comunidad Autónoma>Territorio nacional.

Pregunta 2

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Los criterios que establece la ONT sobre la distribución de los órganos para su donación son actualmente:

Seleccione una:

- a. Tiempo en la lista de espera.
- b. Clínicos y territoriales.
- c. Compatibilidad inmunológica exclusivamente.
- d. Cercanía del receptor exclusivamente.

Pregunta 3

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

La Enfermedad Injerto Contra huésped (EICH) es más probable que se produzca (entre los trasplantes de órgano) en el trasplante:

Seleccione una:

- a. Cardíaco.
- b. Hepático aislado.
- c. Pulmonar.
- d. Intestinal.

Pregunta 4

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Con respecto a los cuidados del paciente diagnosticado de muerte encefálica y posible donante de órganos, es prioritaria la opción falsa):

Seleccione una:

- a. Estabilidad hemodinámica.
- b. Estabilidad ventilatoria.
- c. Cambios posturales.
- d. Presión de perfusión adecuada.

Pregunta 5

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Los principios en los que se basa la ONT son:

Seleccione una:

- a. Voluntariedad, altruismo, gratuidad, ausencia de ánimo de lucro y anonimato.
- b. Voluntariedad, gratuidad y anonimato.
- c. Altruismo, ausencia de ánimo de lucro y anonimato.
- d. Voluntariedad, ausencia de ánimo de lucro y anonimato.

Pregunta 6

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Entre los siguientes prerequisites clínicos para poder diagnosticar la muerte encefálica de un paciente hay una opción falsa señale cuál es:

Seleccione una:

- a. Adecuada oxigenación del paciente.
- b. Causa del coma desconocida.
- c. Adecuada ventilación del paciente.
- d. Estabilidad hemodinámica del paciente.

Pregunta 7

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Con respecto al trasplante renal, señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Es habitual que los pacientes porten dos sondas (vesical y tutor).
- b. Se valora la diuresis una vez al turno.
- c. Es vital para la viabilidad del injerto que no se obstruyan las sondas, principalmente la tutor.
- d. De forma general, en las primeras 24h, se suele reponer el 100% del volumen de la diuresis total de forma horaria

Pregunta 8

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

En España un menor de edad puede donar in vivo:

Seleccione una:

- a. A receptores genéticamente relacionados y no relacionados.
- b. Puede donar cualquier órgano o tejido compatible con la vida.
- c. Solo con el consentimiento del tutor legal es suficiente.
- d. Ha de escucharse y tener en cuenta siempre la opinión del menor.

Pregunta 9

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

El diagnóstico de muerte encefálica es médico y se basa en tres criterios, señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Coma de etiología conocida y de carácter irreversible.
- b. Ausencia de reflejos cerebelosos.
- c. Ausencia de reflejos tronco encefálicos.
- d. Un período de observación.

Pregunta 10

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

El trasplante donde el donante y el receptor son de la misma especie pero no son genéticamente idénticos, recibe el nombre de:

Seleccione una:

- a. Autoinjerto.
- b. Aloinjerto.
- c. Isoinjerto.
- d. Xenoinjerto.

Pregunta 11

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

Con respecto a la herida quirúrgica del trasplante hepático y/o intestinal, señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Suele ser por cierre diferido.
- b. El cierre diferido disminuye la cavidad abdominal.
- c. Se cierra en diferentes etapas.
- d. Se cierra en función del flujo de la Porta y de la función respiratoria.

Pregunta 12

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

La principal causa de morbilidad en los pacientes trasplantados es:

Seleccione una:

- a. Rechazo.
- b. EICH.
- c. Infección.
- d. Enfermedad linfoproliferativa.

Pregunta 13

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

Con respecto a las vacunas en el paciente trasplantado, señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Se inicia la vacunación tras la reducción de la inmunosupresión.
- b. No se puede poner vacunas vivas atenuadas.
- c. Se vacuna de gripe de forma anual.
- d. Si es menor de 24 meses, se vacuna ante el VRS.

Pregunta 14

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

¿A qué se debe, que en el trasplante cardíaco no se aumente la FC ante una situación de estrés?

Seleccione una:

- a. Al edema post-cirugía.
- b. A la hipertensión pulmonar previa al trasplante.
- c. A la insuficiencia cardíaca grave previa al trasplante.
- d. A que el nuevo injerto se encuentra denervado.

Pregunta 15

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

La legislación española, referente al diagnóstico de muerte cerebral en los niños, dictamina que (señale la falsa):

Seleccione una:

- a. En los recién nacidos a término y hasta los dos meses de edad, se debe realizar 2 exploraciones clínicas y dos EEG separados por al menos 48h.
- b. La legislación española no especifica los criterios necesarios para la población infantil.
- c. Este tiempo se puede acortar si se demuestra ausencia de flujo cerebral.
- d. Desde los 2 meses al año de edad, sigue los mismo criterios anteriores pero el tiempo de observación mínimo exigido es de 24h.

Pregunta 16

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes, es el trasplante en el que es vital una adecuada preparación del puesto antes de su ingreso en el receptor?

Seleccione una:

- a. Cardíaco.
- b. Hepático.
- c. Renal.
- d. Intestinal.

Pregunta 17

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

La ONT, nace con el objetivo de coordinar y fomentar la donación y trasplante de:

Seleccione una:

- a. Órganos.
- b. Tejidos.

▼ Marcar pregunta

- c. Células.
- d. Órganos, tejidos y células.

Pregunta 18

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

Con respecto al trasplante intestinal y hepático, ¿qué situación es la más habitual?

Seleccione una:

- a. Son pacientes que se mantienen intubados durante un período e tiempo largo.
- b. Son pacientes que suelen ingresar con gafas nasales.
- c. Son pacientes que suelen ingresar intubados pero se intenta una extubación precoz.
- d. Son pacientes que suelen ingresar en CPAP.

Pregunta 19

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

La situación en la que el sistema HLA reconoce como extrañas a las células del órgano o componente anatómico del don como consecuencia, activa los mecanismos de defensa inmunológicos del receptor, recibe el nombre de:

Seleccione una:

- a. EICH.
- b. Rechazo.
- c. EIHC.
- d. HLA.

Pregunta 20

Respuesta guardada
Puntúa como 1,00

▼ Marcar pregunta

La situación prioritaria donde el receptor potencial se encuentra en una situación de urgencia vital, se clasifica según los criterios de la ONT como:

Seleccione una:

- a. Urgencia Vital.
- b. Urgencia 0.
- c. Urgencia no 0.
- d. Trasplante selectivo.

[Siguiente](#)